

**КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
КЪМ РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ТЪРГОВИЯ № 0022-3124**

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ

INSECTAL COLLAR

2. КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ

Активни субстанции в нашийник:

Insectal collar 40 cm съдържа:

Fipronil 0,73 g

Pyriproxyfen 0,29 g

Insectal collar 65 cm съдържа:

Fipronil 1,29 g

Pyriproxyfen 0,52 g

Insectal collar 75 cm съдържа:

Fipronil 2,59 g

Pyriproxyfen 1,03 g

Експципенти:

За пълния списък на експципентите, виж т. 6.1.

3. ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА

Лечебен нашийник.

Златист, седефен полимерен нашийник със закопчалка.

4. КЛИНИЧНИ ДАННИ

4.1 Видове животни, за които е предназначен ВМП

Кучета и котки.

4.2 Терапевтични показания, определени за отделните видове животни

Контрол на инвазии със зрели и ларвни стадии на развитие на бълхи (*Ctenocephalides canis*, *Ctenocephalides felis*), смучещи въшки (*Linognathus setotus*), въшки (*Trichodectes canis*, *Felicola subrostratus*), иксодидни кърлежи (*Ixodidae*) при кучета и котки.

4.3 Противопоказания

Да не се използва при свръхчувствителност към активните субстанции или към някой от експципентите.

Да не се използва при отслабнали, болни и възстановяващи се животни.

4.4 Специални предпазни мерки за всеки вид животни, за които е предназначен ВМП

Няма.

4.5 Специални предпазни мерки при употреба

Специални предпазни мерки за животните при употребата на продукта

В случай на кожни лезии отстранете нашийника, докато симптомите отшумят.

Специални предпазни мерки за лицата, прилагащи ветеринарномедицинския продукт на животните

При работа с INSECTAL COLLAR, трябва да се спазват общите правила за лична хигиена и безопасност. След приключване на работата внимателно измийте ръцете си със сапун и топла вода.

Не позволявайте на животно с поставен нашийник да се доближава до малки деца.

Хора с установена свръхчувствителност към фипронил и/или пирипроксифен трябва да избягват контакт с ветеринарномедицинския продукт.

При случаен контакт на продукта с кожата или лигавиците на очите, измийте с обилно количество вода.

При случайно поглъщане или в случай на алергична реакция, незабавно да се потърси медицински съвет, като на лекаря се предостави листовката или етикета на продукта.

4.6 Неблагоприятни реакции (честота и важност)

Не се наблюдават неблагоприятни реакции и усложнения след прилагане на INSECTAL COLLAR в съответствие с инструкциите за употреба. При свръхчувствителност към фипронил и/или пирипроксифен могат да се появят индивидуални реакции (прекомерно слюноотделяне, сълзене, признаци на кожно дразнене). В тези случаи отстранете нашийника, измийте животно със сапун и изплакнете козината с обилно количество течаща вода и, ако е необходимо, приложете антихистаминова и симптоматична терапия.

4.7 Употреба по време на бременност, лактация или яйценосене

Не се прилага по време на бременност и лактация.


Не се прилага при кученца и котенца на възраст под 2 месеца.

4.8 Взаимодействие с други ветеринарномедицински продукти и други форми на взаимодействие

Не прилагайте INSECTAL COLLAR заедно с други инсектицидни и акарицидни продукти.

4.9 Доза и начин на приложение

След отваряне на опаковката разгънете нашийника със съответния размер и го поставете върху врата на животното, по такъв начин, че между шията на животното и нашийника да остане разстояние между 1,0 и 1,5 cm, след това фиксирайте закопчалката и отрежете излишната част от нашийника.



Постоянното носене на нашийника осигурява защита на кучетата и котките от насекоми за 5 месеца и от иксодови кърлежи за 4 месеца.

Поставете нашийника на животно 2-3 дни преди очакван контакт с паразити.

В случай на тежко опаразитяване, преди употреба на INSECTAL COLLAR измийте животното с инсектициден шампоан и обработете постелките с инсектицид в съответствие с инструкциите за употреба.

4.10 Предозиране (симптоми, спешни мерки, антидоти), ако е необходимо

Няма симптоми на предозиране след прилагане на продукта.

4.11 Карентен срок

Не е приложимо.

5. ФАРМАКОЛОГИЧНИ ОСОБЕНОСТИ

Фармакотерапевтична група: ектопаразитициди за локално приложение, вкл. инсектициди, други ектопаразитициди за локално приложение.

Ветеринарномедицински Анатомо-Терапевтичен Код: QP53AX65

5.1 Фармакодинамични свойства

Фипронилът е инсектоакарицид от групата на фенилпиразолите. Начинът му на действие е блокиране на гама-аминомаслената киселина (ГАБА)-зависимите рецептори на ектопаразитите, което нарушава предаването на нервните импулси и води до парализа и смърт на насекоми и кърлежи.

Пирипроксифенът е аналог на естествения ювенилен хормон, който регулира растежа и развитието на насекомите. Механизмът на действието му е да наруши синтеза на хитин и отделянето на ларви, да предотврати развитието на зрели какавиди и да причини смъртта на насекомите в преимагиналните етапи на развитие, което води до прекратяване на възстановяването на популацията.

5.2 Фармакокинетични особености

Активните субстанции в състава на полимерния нашийник постепенно се отделят върху повърхността на кожата, разпространяват се по цялата повърхност на тялото и се натрупват в себума, мастните жлези и космените луковичи. Мастните жлези служат като резервоар; непрекъснато отделят активните субстанции със себума, образувайки слой върху кожата и козината на животното.

След локално приложение на продукта, резорбцията на фипронил през кожата е слаба. В плазмата могат да бъдат открити ниски нива на фипронил с много голяма вариабилност между видовете. Фипронилът се метаболизира основно до неговото сулфоново производно, което също притежава инсектицидни и акарицидни свойства.

Пирипроксифенът практически не се резорбира в кръвообращението. Установяват се само следи от пирипроксифен, близки до границата на откриване на метода. В същото време наличието на тази субстанция в кръвта няма терапевтична стойност, тъй като пирипроксифенът има ефект върху ектопаразити.

6. ФАРМАЦЕВТИЧНИ ОСОБЕНОСТИ

6.1 Списък на ексципиентите

Di-(2-ethylhexyl)-phthalate (DEHP)

PVC-C-70-59-M

Epoxidized soybean oil

Liquid golden pearl concentrate BASKO

Methyl tin stabilizer SW-977

6.2 Основни несъвместимости

Не прилагайте INSECTAL COLLAR заедно с други инсектицидни и акарицидни продукти.

6.3 Срок на годност

Срок на годност на крайния ветеринарномедицински продукт: 3 години.

6.4. Специални условия за съхранение на продукта

Да се съхранява при температура под 30 °C.

Да се пази от пряка слънчева светлина.

6.5 Вид и състав на първичната опаковка

Нашийникът се предлага с дължина: 65 cm и 75 cm (за средни и големи кучета), 40 cm (за котки и малки кучета) в индивидуални запечатани опаковки от комбиниран материал, базиран на алуминиево фолио, поставени в индивидуални картонени кутии заедно с листовката.

6.6 Специални мерки за унищожаване на неизползван продукт или остатъци от него

Всеки неизползван ветеринарномедицински продукт или остатъци от него трябва да бъдат унищожени в съответствие с изискванията на местното законодателство.

7. ПРИТЕЖАТЕЛ НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА

“ВЕТ ПРО КОМЕРС” ООД

гр. Пловдив 4000, ж.к. Тракия, бл. 189, вх. В, ап.2

Р. България

Телефон: 0897 84 39 18

Електронна поща: info@verco.bg

8. НОМЕР НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА

0022-3124

9. ДАТА НА ПЪРВОТО ИЗДАВАНЕ/ПОДНОВЯВАНЕ НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА

Дата на първото издаване на лиценз за употреба: 27/05/2022

10. ДАТА НА ПОСЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ НА ТЕКСТА

05/2022

ЗАБРАНА ЗА ПРОДАЖБА, СНАБДЯВАНЕ И/ИЛИ УПОТРЕБА

Не е приложимо.

ПРОФ. Д-Р ХРИСТО ДАСКАЛОВ, ДВМ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР