

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
V/NRP/18/0026
Glucosol 400 mg/ml šķīdums infūzijām liellopiem un aitām

1. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA UN RAŽOŠANAS LICENCES TURĒTĀJA, KURŠ ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI, NOSAUKUMS UN ADRESE, JA DAŽĀDI

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un par sērijas izlaidi atbildīgais ražotājs:

Bela-Pharm GmbH & Co. KG

Lohner Str. 19

49377 Vechta

Vācija

2. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Glucosol 400 mg/ml šķīdums infūzijām liellopiem un aitām

Glucose

3. AKTĪVO VIELU UN CITU VIELU NOSAUKUMS

1 ml satur:

Aktīvā viela:

Glikoze, bezūdens 400,0 mg

(atbilst 440 mg glikozes monohidrātam)

Dzidrs, bezkrāsains šķīdums.

4. INDIKĀCIJA(-S)

Liellopiem:

Kā papildterapija primārās un sekundārās hipoglikēmijas un acetonēmijas ārstēšanai.

Aitām:

Kā papildterapija grūsnības toksēmijas/toksikozes ārstēšanai.

5. KONTRINDIKĀCIJAS

Nelietot sekojošos gadījumos:

Hiperglikēmija, hipokaliēmija, nieru mazspēja (oligūrija vai anūrija), metabolā acidoze, hiperhidratācija, hipotoniska dehidratācija.

Nelietot subkutāni.

6. IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS

Hiperglikēmija, elektrolītu līdzsvara traucējumi (hipokaliēmija, hipomagniēmija vai hipofosfatēmija), ūdens balanss traucējumi (hipervolemija).

Nepareiza infūzija var izraisīt ekstravazāciju, infekciju injekcijas vietā, lokālas sāpes, venozu kairinājumu vai flebītu, kas var rasties ārpus injekcijas vietas, vai trombozi.

Tiklīdz rodas blakusparādības, nekavējoties pārtraukt infūziju.

Ja novērojat jebkuras būtiskas blakusparādības vai citu iedarbību, kas nav minētas šajā lietošanas instrukcijā, lūdzu, informējiet par tām savu veterinārārstu.

7. MĒRĶA SUGAS

Liellopi, aitas.

8. DEVAS ATKARĪBĀ NO DZĪVNIEKU SUGAS, LIETOŠANAS VEIDA UN METODES

Intravenozai lietošanai.

Lēnām intravenozām infūzijām, nepārsniedzot infūzijas ātrumu 0,5 ml/kg ķermeņa svara/ stundā.

Pirms infūzijas šķīdumu sasildīt līdz ķermeņa temperatūrai.

Liellopiem: 200 – 400 g glikozes (atbilst 500 – 1000 ml uz dzīvnieku) katras 24 stundas.

Aitām: 48 – 80 g glikozes (atbilst 120 – 200 ml uz dzīvnieku) katras 24 stundas.

Deva jāpielāgo individuālajām kaloriju un šķidruma prasībām.

Ieteicams kopējo devu sadalīt vairākās ievadīšanas reizēs dienas laikā.

9. IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI

Intravenozā infūzija jāveic lēnām.

10. IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Nulle dienas.

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Šīm veterinārajām zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi.

Pēc pirmās tiešā iepakojuma atvēršanas izlietot nekavējoties.

Neizlietotais šķīduma daudzums jāiznīcina. Lietot tikai dzidru šķīdumu neatvērtā oriģinālajā iepakojumā.

12. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI

Īpaši brīdinājumi katrai dzīvnieku sugai:

Nav.

Īpaši piesardzības pasākumi, lietojot dzīvniekiem:

Regulāri pārbaudīt glikozes līmeni asinīs, elektrolītu un šķidruma līdzsvaru.

Lietojot lielās devās, pēc nepieciešamības pievienot kāliju un fosfātu.

Strauja hipertonisko šķīdumu intravenoza ievadīšana var izraisīt flebītu vai trombu veidošanos injekcijas vietā.

Īpaši piesardzības pasākumi, kas jāievēro personai, kura lieto veterinārās zāles dzīvnieku ārstēšanai:

Uzmanīties, lai izvairītos no nejaušas (gadījuma rakstura) pašinjicēšanas, jo tas var izraisīt lokālu kairinājumu injekcijas vietā. Ja notikusi nejauša pašinjicēšana, nekavējoties meklēt medicīnisko palīdzību un uzrādīt lietošanas instrukciju vai iepakojuma marķējumu ārstam.

Grūsnība un laktācija:

Drīkst lietot grūsnības un laktācijas laikā.

Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi:

Nav zināma.

Pārdozēšana (simptomi, rīcība ārkārtas situācijā, antidoti):

Pārmērīga glikozes lietošana var radīt hiperglikēmiju, glikozūriju un poliūriju.

Nesaderība:

Nav zināma.

13. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTU VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU IZNĪCINĀŠANAI

Jebkuras neizlietotas veterinārās zāles vai to atkritumi jāiznīcina saskaņā ar nacionālajiem tiesību aktiem.

14. DATUMS, KAD LIETOŠANAS INSTRUKCIJA PĒDĒJO REIZI TIKA APSTIPRINĀTA

08/2021

15. CITA INFORMĀCIJA

Recepšu veterinārās zāles. Lietošanai dzīvniekiem.

Iepakojuma izmēri:

500 ml

750 ml

12 x 500 ml

12 x 750 ml

Ne visi iepakojuma izmēri var tikt izplatīti.

Lai iegūtu papildu informāciju par šīm veterinārajām zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas apliecības īpašnieka vietējo pārstāvi:

SIA „Bebra Serviss”

„Doktorāts”, Bebrene pagasts

Ilūkstes novads

LV-5439, Latvija