

## ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG

### FALTSCHACHTEL

#### 1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Traumato ReVet RV 25 - Globuli für Tiere

#### 2. WIRKSTOFFE

1 g Globuli enthält:

1,43 mg Arnica montana ex planta tota C6, 1,43 mg Hypericum perforatum C6, 1,43 mg Ledum palustre C6, 1,43 mg Rhus toxicodendron C6, 1,43 mg Ruta graveolens C6, 1,43 mg Strychnos nux-vomica C6, 1,43 mg Symphytum officinale C6.

#### 3. DARREICHUNGSFORM

Streukügelchen (Globuli)

Homöopathische Arzneispezialität

#### 4. PACKUNGSGRÖSSE(N)

10g (bzw 42 g)

#### 5. ZIELTIERARTEN

Pferde, Rinder, Schafe, Ziegen, Schweine, Hunde, Katzen, Ziervögel, Tauben, Hühner, Puten, Gänse, Enten, Kaninchen, Kleinnager, Frettchen, Reptilien.

#### 6. ANWENDUNGSGEBIETE

Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Für dieses Arzneimittel sind folgende Anwendungsgebiete zugelassen:

- Wunden und Verletzungen aller Art,
- zur Abschwellung, Schmerzlinderung und Regeneration geschädigter Gewebe,
- Blutungen, Hämatome und unterstützend bei Frakturen,
- akute und chronisch degenerative Gelenkserkrankungen des Pferdes (z.B. Hufrollenerkrankung, Spat), akute und chronische Tendinitis, akute und chronische Hufrehe, Schienbeinerkrankung, Nageltritt, Satteldruck,
- Erstversorgung nach Unfällen,
- unterstützende, symptomatische Behandlung bei Tetanus sowie zur homöopathischen Tetanusprophylaxe im Verletzungsfall,
- akute und chronische Verletzungs- und Unfallfolgen,
- Schock und Lähmungen bei allen Zieltierarten,
- Hüftgelenksdysplasie und Cauda-Equina-Syndrom bei Hunden, Dackellähme-Syndrom,
- Zitzenverletzungen, Horn- und Klauenverletzungen bei Kühen, nach Schweregeburten und Kaiserschnitten,

- Tarsitis der Mastschweine, innerartliche Aggression nach Zusammenlegung und Umstallung bei Ferkeln und Läufer Schweinen,
- innerartliche Aggression (Federpicken, Kannibalismus), Verletzungen und Tarsitis (Drucknekrosen) beim Geflügel,
- Folgen von Verletzungen und Überanstrengung bei Reisetauben.

## **7. ART DER ANWENDUNG**

Zum Eingeben

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

## **8. WARTEZEIT**

Essbare Gewebe: Null Tage.

Eier: Null Tage

Nicht bei Tieren anwenden, deren Milch für den menschlichen Verzehr vorgesehen ist.

## **9. BESONDERE WARNHINWEISE, SOWEIT ERFORDERLICH**

## **10. VERFALLDATUM**

Verwendbar bis {MM/JJJJ}

## **11. BESONDERE LAGERUNGSBEDINGUNGEN**

Nicht über 25°C lagern.

Vor Wärme und Feuchtigkeit schützen.

## **12. BESONDERE VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DIE ENTSORGUNG VON NICHT VERWENDETEN ARZNEIMITTELN ODER VON ABFALLMATERIALIEN, SOFERN ERFORDERLICH**

Entsorgung: Siehe Packungsbeilage.

## **13. VERMERK „FÜR TIERE“ SOWIE BEDINGUNGEN ODER BESCHRÄNKUNGEN FÜR EINE SICHERE UND WIRKSAME ANWENDUNG DES TIERARZNEIMITTELS, SOFERN ZUTREFFEND**

Für Tiere

Apothekenpflichtig

## **14. KINDERWARNHINWEIS "ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN"**

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

**15. NAME UND ANSCHRIFT DES ZULASSUNGSINHABERS**

Zulassungsinhaber/Hersteller:

Pharmazeutische Fabrik Dr. Reckeweg & Co. GmbH

Berliner Ring 32 ▪ 64625 Bensheim ▪ Germany

Vertrieb in Österreich:

JACOBY GM PHARMA GMBH ▪ A-5400 Hallein

**16. ZULASSUNGSNUMMER**

Zul. Nr.: 8-30105

**17. CHARGENBEZEICHNUNG DES HERSTELLERS**

Ch.-B. {Nummer}

## ANGABEN AUF DEM BEHÄLTNIS

### ETIKETT

## 18. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Traumato ReVet RV 25 - Globuli für Tiere

## 19. WIRKSTOFFE

1 g Globuli enthält:

1,43 mg Arnica montana ex planta tota C6, 1,43 mg Hypericum perforatum C6, 1,43 mg Ledum palustre C6, 1,43 mg Rhus toxicodendron C6, 1,43 mg Ruta graveolens C6, 1,43 mg Strychnos nuxvomica C6, 1,43 mg Symphytum officinale C6.

## 20. DARREICHUNGSFORM

Streukügelchen (Globuli)

Homöopathische Arzneispezialität

## 21. PACKUNGSGRÖSSE

10g (bzw. 42 g)

## 22. ZIELTIERARTEN

Pferde, Rinder, Schafe, Ziegen, Schweine, Hunde, Katzen, Ziervögel, Tauben, Hühner, Puten, Gänse, Enten, Kaninchen, Kleinnager, Frettchen, Reptilien.

## 23. ANWENDUNGSGEBIETE

## 24. ART DER ANWENDUNG

Zum Eingeben

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

## 25. WARTEZEIT

Wartezeit: Essbare Gewebe: Null Tage. Eier: Null Tage

Nicht bei Tieren anwenden, deren Milch für den menschlichen Verzehr vorgesehen ist.

**26. BESONDERE WARNHINWEISE, SOWEIT ERFORDERLICH**

**27. VERFALLDATUM**

Verwendbar bis {MM/JJJJ}

**28. BESONDERE LAGERUNGSBEDINGUNGEN**

Nicht über 25°C lagern.  
Vor Wärme und Feuchtigkeit schützen.

**29. BESONDERE VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DIE ENTSORGUNG VON NICHT VERWENDETEN ARZNEIMITTELN ODER VON ABFALLMATERIALIEN, SOFERN ERFORDERLICH**

Entsorgung: Siehe Packungsbeilage.

**30. VERMERK „FÜR TIERE“ SOWIE BEDINGUNGEN ODER BESCHRÄNKUNGEN FÜR EINE SICHERE UND WIRKSAME ANWENDUNG DES TIERARZNEIMITTELS, SOFERN ZUTREFFEND**

Für Tiere

Apothekenpflichtig

**31. KINDERWARNHINWEIS "ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN"**

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

**32. NAME UND ANSCHRIFT DES ZULASSUNGSINHABERS**

Zulassungsinhaber/Hersteller:

Pharmazeutische Fabrik Dr. Reckeweg & Co. GmbH

Berliner Ring 32 ▪ 64625 Bensheim ▪ Germany

Vertrieb in Österreich:

JACOBY GM PHARMA GMBH ▪ A-5400 Hallein

**33. ZULASSUNGSNUMMER(N)**

Zul. Nr.: 8-30105

**34. CHARGENBEZEICHNUNG DES HERSTELLERS**

Ch.-B. {Nummer}