

VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS

1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

E-SELENSOL 70/1 mg/ml, injekcinė emulsija galvijams, avims ir kiaulėms

2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS

Vieno ml sudėtyje yra:

veikliųjų medžiagų:

visų racematų- α -tokoferilio acetato (vitamino E).....	70 mg,
seleno (atitinka 2,20 mg natrio selenito)	1 mg;

pagalbinių medžiagų:

benzilo alkoholio (E1519)	20 mg.
---------------------------------	--------

Išsamų pagalbinių medžiagų sąrašą žr. 6.1 p.

3. VAISTO FORMA

Injekcinė emulsija.

Pieno pavidalo gelsvas arba baltas skystis.

4. KLINIKINIAI DUOMENYS

4.1. Paskirties gyvūnų rūšis (-ys)

Galvijai, avys ir kiaulės.

4.2. Naudojimo indikacijos, nurodant paskirties gyvūnų rūšis

Dėl vitamino E ir seleno trūkumo atsiradusių ligų bei su jomis susijusių simptomų gydymas ir profilaktika.

4.3. Kontraindikacijos

Negalima naudoti gyvūnams, kurie buvo šeriami seleno turinčiais grūdais, žole arba pašarais. Negalima naudoti esant padidėjusiam jautrumui veikliosioms medžiagoms ar bet kuriai iš pagalbinių medžiagų.

4.4. Specialieji įspėjimai, naudojant atskirų rūšių paskirties gyvūnams

Dėl seleno toksiškumo svarbu laikytis rekomenduojamo dozavimo. Negalima skirti didesnių dozių negu rekomenduojamos.

4.5. Specialiosios naudojimo atsargumo priemonės

Specialiosios atsargumo priemonės, naudojant vaistą gyvūnams

Seleno ir vitamino E stokos sindromas lemia įvairius ir kompleksinius simptomus, neretai trukdančius nustatyti teisingą diagnozę. Netgi vietovėse, kuriose trūksta seleno, pasireiškia su kitomis ligomis susijusių būklių, kurioms būdingi panašūs klinikiniai požymiai. Prieš gydant seleno ir tokoferolio stokos (STS) sindromą, reikia apsvarstyti, ar tai nėra kuri nors iš šių būklių. Seleno koncentracijos serume, serumo glutamato-oksaloacetato transferazės (SGOT) ir kreatinino fosfokinazės (CPK)

koncentracijos serume ir kreatino / kreatinino santykio šlapime nustatymas gali padėti patvirtinti STS diagnozę.

Negalima švirkšti į veną.

Specialiosios atsargumo priemonės asmenims, naudojantiems vaistą gyvūnams

Žmonės, kuriems nustatytas padidėjęs jautrumas veikliosioms medžiagoms, šį veterinarinį vaistą turi naudoti apdairiai.

Atsitiktinai įsišvirkštus, reikia nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti šio veterinarinio vaisto informacinį lapelį arba etiketę.

Atsitiktinai patekus ant odos arba į akis, reikia nedelsiant plauti dideliu vandens kiekiu.

4.6. Nepalankios reakcijos (dažnumas ir sunkumas)

Labai retais atvejais (mažiau nei 1 iš 10 000 gydytų gyvūnų, skaičiuojant ir atskirus pranešimus):

- gali pasireikšti sudirginimas ir skausmas injekcijos vietoje;
- gali pasireikšti įvairaus intensyvumo anafilaksinės reakcijos anksčiau įjautrintiems gyvūnams .

4.7. Naudojimas vaikingumo, laktacijos ar kiaušinių dėjimo metu

Saugumas vaikingumo ir laktacijos metu nenustatytas. Vis dėl to šis veterinarinis vaistas, naudojamas paskutiniame vaikingumo etape, nesukelia problemų.

4.8. Sąveika su kitais vaistais ir kitos sąveikos formos

Nežinoma.

4.9. Dozės ir naudojimo būdas

Švirkšti į raumenis arba po oda.

Galvijai

Profilaktika

Naujagimiai veršeliai: 2 ml vaisto / gyvūnui (atitinka 140 mg vitamino E ir 2 mg seleno), pakartoti po 7 dienų.

1–2 savaičių veršeliai: 2,5–3 ml vaisto / gyvūnui (atitinka 175–210 mg vitamino E ir 2,5–3 mg seleno), pakartoti po 7 dienų.

Suaugę gyvūnai: 20 ml vaisto / gyvūnui (atitinka 1400 mg vitamino E ir 20 mg seleno) 30 dienų iki numatomos veršiavimosi dienos, kad veršeliai išvengtų šių medžiagų stokos.

Gydymas

Naujagimiai veršeliai: 4 ml vaisto / gyvūnui (atitinka 280 mg vitamino E ir 4 mg seleno), pakartoti po 7 dienų.

1–2 savaičių veršeliai: 5 ml vaisto / gyvūnui (atitinka 350 mg vitamino E ir 5 mg seleno), pakartoti po 7 dienų.

Avys

Profilaktika

Naujagimiai ėriukai: 0,5 ml vaisto / gyvūnui (atitinka 35 mg vitamino E ir 0,5 mg seleno), pakartoti po 5–7 dienų.

Vyresni kaip 2 savaičių ėriukai: 1 ml vaisto / gyvūnui (atitinka 70 mg vitamino E ir 1 mg seleno), pakartoti po 5–7 dienų.

Ėringos avys: 2,5–4 ml vaisto / gyvūnui (atitinka 175–280 mg vitamino E ir 2,5–4 mg seleno)
30 dienų iki numatomos ėriavimosi dienos, kad ėriukai išvengtų šių medžiagų stokos.

Gydymas

1 ml vaisto / gyvūnui (atitinka 70 mg vitamino E ir 1 mg seleno), pakartoti po 5–7 dienų. Vaistą galima skirti iki 4 kartų.

Kiaulės

Profilaktika

Paršeliai: 0,03–0,1 ml vaisto / gyvūnui (atitinka 2,1–7 mg vitamino E ir 0,03–0,1 mg seleno).

Suaugę gyvūnai: 1–3 ml vaisto / 25 kg kūno svorio (atitinka 70–210 mg vitamino E ir 1–3 mg seleno / 25 kg kūno svorio), pakartoti po 7 dienų.

Gydymas

Paršeliai: 0,1 ml vaisto / gyvūnui (atitinka 7 mg vitamino E ir 0,1 mg seleno).

Suaugę gyvūnai: 2 ml vaisto / 25 kg kūno svorio (atitinka 140 mg vitamino E ir 2 mg seleno / 25 kg kūno svorio).

Veislinės paršavedės: 3–6 ml vaisto / 50 kg kūno svorio (atitinka 210–420 mg vitamino E ir 3–6 mg seleno / 50 kg kūno svorio), pakartoti po 7 dienų.

- Naudoti sterilius reikmenis ir griežtai laikytis aseptinių metodų (valyti vietą ir kt.).
- Prieš naudojant, gerai pakratyti talpyklę.
- Negalima švirkšti į tą pačią injekcijos vietą daugiau kaip 15 ml.
- Naudoti storą adatą ir švirkšti lėtai.

4.10. Perdozavimas (simptomai, pirmosios pagalbos priemonės, priešnuodžiai), jei būtina

Dėl ūmaus seleno toksiškumo gali pasireikšti simptomai:

galvijams ir avims perdozavimas pasireiškia kaip depresija, ataksija, dusulys, tachikardija ir padidėjusi karščiavimo rizika, tada padidėja diurezė ir pasireiškia viduriavimas. Terminaliniai simptomai yra pamėlusios gleivinės, išsiplėtę vyzdžiai, timpanitas, raumenų silpnumas, išsekimas ir mirtis.

Kiaulėms po 1–2 dienų buvo pastebėta anoreksija, vėmimas, viduriavimas, letargija, šlubavimas, silpnumas, parėzė, dusulys, išsekimas, koma ir mirtis.

Intoksikacijos atveju reikia taikyti simptominį gydymą. Būtina kovoti su plaučių edema ir kraujotakos šoku.

4.11. Išlauka

Skerdienai ir subproduktams:

- galvijai: 14 parų;
- kiaulės: 14 parų;
- avys: 30 parų.

Neregistruotas naudoti patelėms, kurių pienas skirtas žmonių maistui.

5. FARMAKOLOGINĖS SAVYBĖS

Farmakoterapinė grupė: seleno deriniai.

ATCvet kodas: QA12CE99.

5.1. Farmakodinaminės savybės

Selenas ir vitaminas E (visų racematų α -tokoferilio acetatas) veikia papildydami vienas kitą ir apsaugo ląsteles nuo peroksidų, kurie yra ląstelių degeneracijos ir irimo priežastis, kaupimosi.

Vitaminas E yra riebaluose tirpus vitaminas, kuris veikia kaip antioksidantas. Jis apsaugo nuo membranose esančių polinesočiųjų riebalų rūgščių oksidacijos, taip neleisdamas susidaryti laisviesiems radikalams ir peroksidams.

Selenas – tai mikroelementas, kuris yra fermento glutationo peroksidazės (GPx) dalis ir yra atsakingas už peroksidazės redukciją.

5.2. Farmakokinetinės savybės

Kai vitamino E švirkščiami į raumenis, jis yra linkęs kauptis injekcijos vietoje ir iš jos lėtai atsipalaiduoti. Tokia savybė leidžia aptikti koncentraciją kraujyje ir audiniuose praėjus iki 20 dienų po sušvirkštimo, o T_{max} reikšmės (laiko, per kurį pasiekama didžiausia koncentracija) svyruoja tarp 7 valandų ir 48 valandų (avims). Absorbuotas vitaminas E, prisijungęs prie lipoproteinų, patenka į kraujo apytakos sistemą ir tada pasiskirsto po visus audinius, juose kaupiasi ir vėl lėtai persiskirsto. Ši savybė prisideda prie to, kad jis ilgai išlieka organizme, ir apskaičiuotasis išlikimo laikas avims yra maždaug 47 valandos. Patekęs į kepenis, vitaminas E metabolizuojamas oksidaciniu būdu, ir susidarę konjugatai daugiausia išsiskiria su tulžimi, o mažesnė jų dalis – su šlapimu bei pienu. Vitamino E biologinis prieinamumas labai priklauso nuo naudojamo vaisto sudėties ir skirtingoms gyvūnų rūšims svyruoja tarp 40 % (kiaulėms) ir 51 % (avims).

Selenas, sušvirkštas į raumenis arba po oda, yra greitai absorbuojamas, o didžiausia jo koncentracija kraujyje avims ir veršeliams nustatoma praėjus nuo 1 valandos iki 5 valandų po injekcijos. Gyvūnams, kurių pašaruose trūksta seleno, koncentracija mažėja dviem fazėmis: pirmojoje fazėje koncentracija mažėja sparčiausiai, ir tuomet pašalinama maždaug 50 % sušvirkštos dozės, o antrojoje fazėje koncentracija mažėja lėčiau. Ši savybė avims ir ėriukams leidžia palaikyti didelę seleno koncentraciją iki 20–28 dienų po vaisto sušvirkštimo. Patekęs į kraują, selenas yra redukuojamas iki hidrintos formos, kuri prisijungia prie plazmos baltymų. Jis gali prasiskverbti per placentos barjerą, ir daugiausia jo pašalinama su šlapimu ir išmatomis, o mažesnė dalis išsiskiria su pienu.

6. FARMACINIAI DUOMENYS

6.1. Pagalbinių medžiagų sąrašas

Benzilo alkoholis (E1519),
makrogolio-15 hidroksistearatas,
vandenilio chlorido rūgštis,
natrio hidroksidas,
injekcinis vanduo.

6.2. Pagrindiniai nesuderinamumai

Atsžvelgiant, kad vitaminai neatsparūs oksiduojančioms medžiagoms ir pH pokyčiams, šio veterinarinio vaisto negalima maišyti su jokių kitų vaistų.

6.3. Tinkamumo laikas

Veterinarinio vaisto tinkamumo laikas, nepažeidus originalios pakuotės, – 3 metai.
Tinkamumo laikas, atidarius pirminę pakuotę, – 28 dienos.

6.4. Specialieji laikymo nurodymai

Talpyklę laikyti kartoninėje dėžutėje, kad vaistas būtų apsaugotas nuo šviesos.

6.5. Pirminės pakuotės pobūdis ir sudedamosios dalys

II tipo gintaro spalvos stiklo flakonai, užkimšti bromobutilinės gumos kamšteliais ir lakuotais aliuminio dangteliais.

Pakuočių dydžiai:

kartoninė dėžutė, kurioje yra 1 flakonas po 50 ml;
kartoninė dėžutė, kurioje yra 1 flakonas po 100 ml.

Gali būti tiekiamos ne visų dydžių pakuotės.

6.6. Specialiosios nesunaudoto veterinarinio vaisto ar su jo naudojimu susijusių atliekų naikinimo nuostatos

Nesunaudotas veterinarinis vaistas ar su juo susijusios atliekos turi būti sunaikintos pagal šalies reikalavimus.

7. REGISTRUOTOJAS

LABIANA Life Sciences, S.A.
Venus 26
08228 Terrassa
(Barcelona) Ispanija

8. REGISTRACIJOS NUMERIS (-IAI)

LT/2/21/2656/001-002

9. REGISTRAVIMO / PERREGISTRAVIMO DATA

Registravimo data 2021-05-18

10. TEKSTO PERŽIŪROS DATA

2021-05-06

DRAUDIMAS PREKIAUTI, TIEKTI IR (ARBA) NAUDOTI

Tiekimas: **parduodama tik su veterinariniu receptu.**

Naudojimas: **naudojamas kontroliuojant arba prižiūrint veterinarijos gydytojui.**

ŽENKLINIMAS IR INFORMACINIS LAPELIS

A. ŽENKLINIMAS

DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT ANTRINĖS IR PIRMINĖS PAKUOTĖS

50 ml
100 ml

1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

E-SELENSOL 70/1 mg/ml, injekcinė emulsija galvijams, avims ir kiaulėms

2. VEIKLIOJI (-IOSIOS) MEDŽIAGA (-OS)

Vieno ml sudėtyje yra:

veikliųjų medžiagų:

visų racematų- α -tokoferilio acetato (vitamino E)..... 70 mg,
seleno (atitinka 2,20 mg natrio selenito) 1 mg;

pagalbinių medžiagų:

benzilo alkoholio (E1519) 20 mg,
kitų pagalbinių medžiagų q.s.f. 1 ml.

3. VAISTO FORMA

Injekcinė emulsija.

4. PAKUOTĖS DYDIS

50 ml
100 ml

5. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠIS (-YS)

Galvijai, avys ir kiaulės.

6. INDIKACIJA (-OS)**7. NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS**

Švirkšti į raumenis arba po oda.

Prieš naudojant būtina perskaityti informacinį lapelį.

8. IŠLAUKA

Išlauka:

skerdienai ir subproduktams:

- galvijai: 14 parų;
- kiaulės: 14 parų;
- avys: 30 parų.

Neregistruotas naudoti patelėms, kurių pienas skirtas žmonių maistui.

9. SPECIALIEJI ĮSPĖJIMAI, JEI REIKIA

10. TINKAMUMO DATA

Tinka iki {mėnuo/metai} :
Atidarius sunaudoti per 28 dienas.

11. SPECIALIOSIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Talpyklę laikyti kartoninėje dėžutėje, kad vaistas būtų apsaugotas nuo šviesos.

**12. SPECIALIOSIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ
NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA**

Atliekos turi būti sunaikintos pagal šalies reikalavimus.

**13. NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“ IR TIEKIMO BEI
NAUDOJIMO SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI, JEI TAIKYTINA**

Tik veterinariniam naudojimui. Parduodama tik su veterinariniu receptu.

14. NUORODA „SAUGOTI NUO VAIKŲ“

Saugoti nuo vaikų.

15. REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

LABIANA Life Sciences, S.A.
Venus 26
08228 Terrassa (Barcelona)
Ispanija

16. REGISTRACIJOS NUMERIS (-IAI)

LT/2/21/2656/001-002

17. GAMINTOJO SERIJOS NUMERIS

Serija {numeris}

B. INFORMACINIS LAPELIS

INFORMACINIS LAPELIS:

E-SELENSOL 70/1 mg/ml, injekcinė emulsija galvijams, avims ir kiaulėms

1. REGISTRUOTOJO IR UŽ VAISTO SERIJOS IŠLEIDIMĄ EEE ŠALYSE ATSAKINGO GAMINTOJO, JEI JIE SKIRTINGI, PAVADINIMAS IR ADRESAS

Registruotojas ir gamintojas, atsakingas už vaisto serijos išleidimą

LABIANA Life Sciences, S.A.

Venus 26

08228 Terrassa (Barcelona)

Ispanija

2. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

E-SELENSOL 70/1 mg/ml, injekcinė emulsija galvijams, avims ir kiaulėms

3. VEIKLIOJI (-IOSIOS) IR KITOS MEDŽIAGOS

Vieno ml sudėtyje yra:

veikliųjų medžiagų:

visų racematų- α -tokoferilio acetato (vitamino E)..... 70 mg,

seleno (atitinka 2,20 mg natrio selenito) 1 mg;

pagalbinių medžiagų:

benzilo alkoholio (E1519) 20 mg,

kitų pagalbinių medžiagų q.s.f. 1 ml.

4. INDIKACIJA (-OS)

Dėl vitamino E ir seleno trūkumo atsiradusių ligų bei su jomis susijusių simptomų gydymas ir profilaktika.

5. KONTRAINDIKACIJOS

Negalima naudoti gyvūnams, kurie buvo šeriami seleno turinčiais grūdais, žole arba pašarais.

Negalima naudoti esant padidėjusiam jautrumui veikliosioms medžiagoms ar bet kuriai iš pagalbinių medžiagų.

6. NEPALANKIOS REAKCIJOS

Labai retais atvejais (mažiau nei 1 iš 10 000 gydytų gyvūnų, skaičiuojant ir atskirus pranešimus):

- gali pasireikšti sudirginimas ir skausmas injekcijos vietoje;
- gali pasireikšti įvairaus intensyvumo anafilaksinės reakcijos anksčiau įjautrintiems gyvūnams .

Nepalankių reakcijų dažnumas nustatytas vadovaujantis tokia konvencija:

- labai dažna (nepalankios reakcijos pasireiškė daugiau nei 1 iš 10 gydytų gyvūnų),
- dažna (daugiau nei 1, bet mažiau nei 10 iš 100 gydytų gyvūnų),
- nedažna (daugiau nei 1, bet mažiau nei 10 iš 1 000 gydytų gyvūnų),
- reta (daugiau nei 1, bet mažiau nei 10 iš 10 000 gydytų gyvūnų),
- labai reta (mažiau nei 1 iš 10 000 gydytų gyvūnų, skaičiuojant ir atskirus pranešimus).

Pastebėjus bet kokį šalutinį poveikį, net ir nepaminėtą šiame informaciniame lapelyje, arba manant, kad vaistas neveikė, būtina informuoti veterinarijos gydytoją.

7. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠIS (-YS)

Galvijai, avys ir kiaulės.

8. DOZĖS, NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS KIEKVIENAI RŪŠIAI

Švirkšti į raumenis arba po oda.

Dozės

Galvijai

Profilaktika

Naujagimiai veršeliai: 2 ml vaisto / gyvūnui (atitinka 140 mg vitamino E ir 2 mg seleno), pakartoti po 7 dienų.

1–2 savaičių veršeliai: 2,5–3 ml vaisto / gyvūnui (atitinka 175–210 mg vitamino E ir 2,5–3 mg seleno), pakartoti po 7 dienų.

Suaugę gyvūnai: 20 ml vaisto / gyvūnui (atitinka 1400 mg vitamino E ir 20 mg seleno) 30 dienų iki numatomos veršiavimosi dienos, kad veršeliai išvengtų šių medžiagų stokos.

Gydymas

Naujagimiai veršeliai: 4 ml vaisto / gyvūnui (atitinka 280 mg vitamino E ir 4 mg seleno), pakartoti po 7 dienų.

1–2 savaičių veršeliai: 5 ml vaisto / gyvūnui (atitinka 350 mg vitamino E ir 5 mg seleno), pakartoti po 7 dienų.

Avys

Profilaktika

Naujagimiai ėriukai: 0,5 ml vaisto / gyvūnui (atitinka 35 mg vitamino E ir 0,5 mg seleno), pakartoti po 5–7 dienų.

Vyresni kaip 2 savaičių ėriukai: 1 ml vaisto / gyvūnui (atitinka 70 mg vitamino E ir 1 mg seleno), pakartoti po 5–7 dienų.

Ėringos avys: 2,5–4 ml vaisto / gyvūnui (atitinka 175–280 mg vitamino E ir 2,5–4 mg seleno) 30 dienų iki numatomos ėriavimosi dienos, kad ėriukai išvengtų šių medžiagų stokos.

Gydymas

1 ml vaisto / gyvūnui (atitinka 70 mg vitamino E ir 1 mg seleno), pakartoti po 5–7 dienų. Vaistą galima skirti iki 4 kartų.

Kiaulės

Profilaktika

Paršeliai: 0,03–0,1 ml vaisto/ gyvūnui (atitinka 2,1–7 mg vitamino E ir 0,03–0,1 mg seleno).

Suaugę gyvūnai: 1–3 ml vaisto / 25 kg kūno svorio (atitinka 70–210 mg vitamino E ir 1–3 mg seleno / 25 kg kūno svorio), pakartoti po 7 dienų.

Gydymas

Paršeliai: 0,1 ml vaisto/ gyvūnui (atitinka 7 mg vitamino E ir 0,1 mg seleno).

Suaugę gyvūnai: 2 ml vaisto/ 25 kg kūno svorio (atitinka 140 mg vitamino E ir 2 mg seleno / 25 kg kūno svorio).

Veislinės paršavedės: 3–6 ml vaisto / 50 kg kūno svorio (atitinka 210–420 mg vitamino E ir 3–6 mg seleno / 50 kg kūno svorio), pakartoti po 7 dienų.

9. NUORODOS DĖL TINKAMO NAUDOJIMO

- Naudoti sterilius reikmenis ir griežtai laikytis aseptinių metodų (valyti vietą ir kt.).
- Prieš naudojant, gerai pakratyti talpyklę.
- Negalima švirkšti į tą pačią injekcijos vietą daugiau kaip 15 ml.
- Naudoti storą adatą ir švirkšti lėtai.

10. IŠLAUKA

Skerdienai ir subproduktams:

- galvijai: 14 parų;
- kiaulės: 14 parų;
- avys: 30 parų.

Neregistruotas naudoti patelėms, kurių pienas skirtas žmonių maistui.

11. SPECIALIEJI LAIKYMO NURODYMAI

Saugoti nuo vaikų.

Talpyklę laikyti kartoninėje dėžutėje, kad vaistas būtų apsaugotas nuo šviesos.

Atidarius pirminę pakuotę, reikia sunaudoti per 28 dienas.

Šio veterinarinio vaisto negalima naudoti pasibaigus tinkamumo laikui, nurodytam ant etiketės arba kartoninės dėžutės po „Tinka iki“. Vaistas tinkamas naudoti iki paskutinės nurodyto mėnesio dienos.

12. SPECIALIEJI ĮSPĖJIMAI

Specialieji įspėjimai, naudojant atskirų rūšių paskirties gyvūnams

Dėl seleno toksiškumo svarbu laikytis rekomenduojamo dozavimo. Negalima skirti didesnių dozių negu rekomenduojamos.

Specialiosios atsargumo priemonės, naudojant vaistą gyvūnams

Seleno ir vitamino E stokos sindromas lemia įvairius ir kompleksinius simptomus, neretai trukdančius nustatyti teisingą diagnozę. Netgi vietovėse, kuriose trūksta seleno, pasireiškia su kitomis ligomis susijusių būklių, kurioms būdingi panašūs klinikiniai požymiai. Prieš gydant seleno ir tokoferolio stokos (STS) sindromą, reikia apsvarstyti, ar tai nėra kuri nors iš šių būklių. Seleno koncentracijos serume, serumo glutamato-oksaloacetato transferazės (SGOT) ir kreatinino fosfokinazės (CPK) koncentracijos serume ir kreatino / kreatinino santykio šlapime nustatymas gali padėti patvirtinti STS diagnozę.

Negalima švirkšti į veną.

Specialiosios atsargumo priemonės asmenims, naudojantiems vaistą gyvūnams

Žmonės, kuriems nustatytas padidėjęs jautrumas veikliosioms medžiagoms, šį veterinarinį vaistą turi naudoti apdairiai.

Atsitiktinai įsišvirkštus, reikia nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti šio veterinarinio vaisto informacinį lapelį arba etiketę.

Atsitiktinai patekus ant odos arba į akis, reikia nedelsiant plauti dideliu vandens kiekiu.

Vaikingumas ir laktacija

Saugumas vaikinguma ir laktācijas metu nenustatīts. Vis dēļ to šis veterinārinis vaists, naudojamas paskutiniame vaikinguma etape, nesukelia problēmu.

Sāveika su kitais vaistais ir kitos sāveikos formas

Nežinoma.

Perdozavimas (simptomai, pirmosios pagalbos priemonės, priešnuodžiai)

Dēļ ūmaus seleno toksiskuma gali pasireikšti simptomai:

galvijams ir avims perdozavimas pasireiškia kaip depresija, ataksija, dusulys, tachikardija ir padidėjusi karščiavimo rizika, tada padidėja diurezė ir pasireiškia viduriavimas. Terminaliniai simptomai yra pamėlusios gleivinės, išsiplėtę vyzdžiai, timpanitas, raumenų silpnumas, išsekimas ir mirtis.

Kiaulėms po 1–2 dienų buvo pastebėta anoreksija, vėmimas, viduriavimas, letargija, šlubavimas, silpnumas, parėzė, dusulys, išsekimas, koma ir mirtis.

Intoksikacijos atveju reikia taikyti simptominį gydymą. Būtina kovoti su plaučių edema ir kraujotakos šoku.

Nesuderinamumai

Atsižvelgiant, kad vitaminai neatsparūs oksiduojančioms medžiagoms ir pH pokyčiams, šio veterinarinio vaisto negalima maišyti su jokia kitu vaistu.

13. SPECIALIOSIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA

Vaistų negalima išmesti į kanalizaciją ar su buitinėmis atliekomis.

Veterinarijos gydytojas arba vaistininkas gali patarti, ką daryti su nereikalingais vaistais. Tai turėtų padėti saugoti aplinką.

14. INFORMACINIO LAPELIO PASKUTINIO PATVIRTINIMO DATA

2021-05-06

15. KITA INFORMACIJA

Norint gauti informacijos apie šį veterinarinį vaistą, reikia susisiekti su registruotojo vietiniu atstovu.

SIA VET-MED
Mārupe, Mārupes novads
LV-2167, Latvija
Tel. 80000082
El.paštas vet-med@vet-med.lv