

VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS

1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Tolzesya 50 mg/ml geriamoji suspensija kiaulėms, galvijams ir avims

2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS

1 ml geriamosios suspensijos yra:

veikliosios medžiagos:

toltrazurilio 50 mg;

pagalbinių medžiagų:

natrio benzoato (E211) 2,1 mg,

natrio propionato (E281) 2,1 mg.

Išsamų pagalbinių medžiagų sąrašą žr. 6.1 p.

3. VAISTO FORMA

Geriamoji suspensija.

Tiršta balta suspensija.

4. KLINIKINIAI DUOMENYS

4.1. Paskirties gyvūnų rūšys

Kiaulės (3–5 d. amžiaus paršeliai).

Galvijai (pieno ūkių veršeliai).

Avys (ėriukai).

4.2. Naudojimo indikacijos, nurodant paskirties gyvūnų rūšis

Kiaulės

3–5 dienų amžiaus paršeliams profilaktiškai nuo kokcidiozės klinikinių požymių pasireiškimo ūkiuose, kuriuose nustatyta *Isospora suis* sukelta kokcidiozė.

Galvijai

Uždarose patalpose laikomiems veršeliams, skirtiems pakeisti karves, kurių pienas skirtas žmonių maistui (melžiamas karves), apsaugoti nuo klinikinių kokcidiozės požymių pasireiškimo ir norint sumažinti oocistų išskyrimą į aplinką ūkiuose, kuriuose pasireiškė *Eimeria bovis* ar *Eimeria zuernii* sukelta kokcidiozė.

Avys

Ėriukams apsaugoti nuo klinikinių kokcidiozės požymių pasireiškimo ir norint sumažinti oocistų išskyrimą į aplinką ūkiuose, kuriuose pasireiškė *Eimeria crandallis* ir *Eimeria ovinoidalis* sukelta kokcidiozė.

4.3. Kontraindikacijos

Nenaudoti, padidėjus jautrumui veikliajai medžiagai ar bet kuriai iš pagalbinių medžiagų.

Galvijai (dėl poveikio aplinkai)

Negalima naudoti veršeliams, sveriantiems daugiau kaip 80 kg.

Negalima naudoti mėsiniams veršeliams ar jautukams.

Detalesnė informacija pateikiama 4.5 p. „Specialios naudojimo atsargumo priemonės“ bei 5 p. „Savybės aplinkoje“.

4.4. Specialieji nurodymai, naudojant atskirų rūšių paskirties gyvūnams

Kaip ir naudojus bet kokį vaistą nuo parazitų ar pakartotinai naudojant tos pačios klasės antiprotozoinį vaistą, gali atsirasti ligos sukėlėjų atsparumas.

Rekomenduotina gydyti visus garde esančius veršelius ar ėriukus. Kokcidiozės pavojų galima sumažinti taikant higienos priemones. Dėl to tvarte rekomenduotina kartu gerinti ir higienines sąlygas, ypač sausumą ir švarą. Norint gauti didžiausią naudą, gyvulius reikia gydyti prieš pasireiškiant klinikiniams požymiams, t. y. inkubaciniu periodu. Norint sutrikdyti nustatytos klinikinės kokcidiozės infekcijos ciklą, atskirus gyvulius, kurie jau pradėję viduriuoti, gali tekti gydyti papildomai.

4.5. Specialios naudojimo atsargumo priemonės

Specialios atsargumo priemonės, naudojant vaistą gyvūnams

Nėra.

Specialios atsargumo priemonės asmenims, naudojantiems vaistą gyvūnams

Žmonės, kuriems nustatytas padidėjęs jautrumas bet kuriai sudėtinei medžiagai, turi vengti sąlyčio su šiuo veterinariniu vaistu.

Jeigu vaisto patenka ant odos ar į akis, reikia nedelsiant plauti vandeniu.

Kitos atsargumo priemonės

Norint apsaugoti augalus nuo bet kokio nepalankaus poveikio ir gruntinius vandenius nuo užteršimo, gydytų veršelių mėšlu negalima tręšti žemės prieš tai jo neatskiedus negydytų galvijų mėšlu. Prieš tręšimą gydytų veršelių mėšlą reikia atskiesti negydytų galvijų mėšlu ne mažiau kaip 3 kartus. Vyresnių kaip 6 savaičių ar sveriančių daugiau kaip 20 kg ėriukų, kurie visą gyvenimą laikomi patalpoje ir intensyviai auginami, gydyti negalima. Gydytų gyvulių mėšlu tręšti tą patį žemės plotą galima tik kas trejus metus.

4.6. Nepalankios reakcijos (dažnumas ir sunkumas)

Nežinomos.

4.7. Naudojimas vaikingumo, laktacijos ar kiaušinių dėjimo metu

Netaikytina.

4.8. Sąveika su kitais vaistais ir kitos sąveikos formos

Nežinoma.

4.9. Dozės ir naudojimo būdas

Vaistą reikia sugirdyti.

Prieš naudojimą geriamąją suspensiją būtina suplakiti.

Norint užtikrinti tinkamos dozės skyrimą, reikia kuo tiksliau nustatyti kūno svorį.

Norint gauti didžiausią naudą, gyvulius reikia gydyti prieš pasireiškiant klinikiniams požymiams, t. y. inkubaciniu periodu. Pasireiškus ligos protrūkiui, individualiai gyvūnus gydyti neveiksminga, nes plonosios žarnos jau būna pažeistos.

Kiaulės

Vaistą reikia duoti kiekvienam gyvūnui atskirai.

3–5 dieną po atsivedimo kiekvienam paršeliui reikia sugirdyti vienkartinę 20 mg/kg kūno svorio toltrazurilio dozę (atitinka 0,4 ml geriamosios suspensijos 1 kg kūno svorio).

Kadangi kiekvieną paršelį reikia gydyti mažo tūrio doze, rekomenduotina naudoti 0,1 ml tikslumu dozuojančias priemones.

Galvijai

Vienam gyvuliui per kartą reikia sugirdyti vienkartinę 15 mg/kg kūno svorio toltrazurilio dozę (atitinka 3 ml geriamosios suspensijos 10 kg kūno svorio).

Jei gyvuliai gydomi bendrai, o ne individualiai, juos reikia sugrupuoti pagal kūno svorį ir nustatyti atitinkamą dozę, kad ji nebūtų per maža ar per didelė.

Avys

Vienam gyvuliui per kartą reikia sugirdyti vienkartinę 20 mg/kg kūno svorio toltrazurilio dozę (atitinka 0,4 ml geriamosios suspensijos 1 kg kūno svorio).

Jei gyvuliai gydomi bendrai, o ne individualiai, juos reikia sugrupuoti pagal kūno svorį ir nustatyti atitinkamą dozę, kad ji nebūtų per maža ar per didelė.

4.10. Perdozavimas (simptomai, pirmosios pagalbos priemonės, priešnuodžiai), jei būtina

Tris kartus didesnę nei rekomenduotina vaisto dozę sveiki paršeliai ir veršeliai gerai toleravo be jokių nepalankių požymių. Ėriukams sugirdžius vienkartinę trigubą dozę ar dvi dienas iš eilės girdant dvigubą dozę, perdozavimo požymių nepastebėta.

4.11. Išlauka

Kiaulės:

skerdienai ir subproduktams – 77 paros.

Galvijai:

skerdienai ir subproduktams – 63 paros;

pienui: neregistruota naudoti laktacijos metu patelėms, kurių pienas skirtas žmonių maistui.

Avys:

skerdienai ir subproduktams – 42 paros;

pienui: neregistruota naudoti laktacijos metu patelėms, kurių pienas skirtas žmonių maistui.

5. FARMAKOLOGINĖS SAVYBĖS

Farmakoterapinė grupė: vaistai nuo pirmuonių sukeltų ligų, triazinai, toltrazurilis.

ATCvet kodas: QP51AJ01.

5.1. Farmakodinaminės savybės

Toltrazurilis yra triazinono darinys, veikiantis *Eimeria* ir *Isospora* rūšių kokcidijas. Vaistas veikia eimerijas intralastelinio vystymosi stadijose, t. y. merogonijos (nelytinio dauginimosi) ir gametogonijos (lytinio dauginimosi). Sutrikdomos visos stadijos, todėl toltrazurilio veikimo būdas yra kokcidiocidinis.

5.2. Farmakokinetinės savybės

Kiaulės

Sugirdytas kiaulėms toltrazurilis lėtai absorbuojasi, jo biologinis prieinamumas yra ≥ 70 %. Sugirdžius vienkartinę 20 mg/kg kūno svorio dozę, didžiausia toltrazurilio koncentracija (C_{max}) yra 14 $\mu\text{g/ml}$, ji susidaro po maždaug 30 val. Pagrindinis toltrazurilio metabolitas yra toltrazurilio sulfonas.

Toltrazurilis eliminuojamas lėtai, pusinės eliminacijos laikas yra maždaug 3 dienos. Ekskrecija vyksta daugiausia su išmatomis.

Galvijai

Sugirdytas galvijams toltrazurilis absorbuojamas lėtai. Sugirdžius vienkartinę 15 mg/kg kūno svorio dozę, didžiausia koncentracija kraujo plazmoje ($C_{max} = 41,4$ mg/l) susidaro po 6–48 val. (vidurkis – 19 val.). Iš organizmo toltrazurilis išsiskiria lėtai, galutinis pusinės eliminacijos laikas yra maždaug 2,7 d. (64,15 val.). Pagrindinis metabolitas – toltrazurilio sulfonas. Vaistas iš organizmo daugiausiai išsiskiria su išmatomis.

Avys

Sugirdytas ėriukams toltrazurilis absorbuojamas lėtai. Pagrindinis metabolitas yra toltrazurilio sulfonas. Sugirdžius vienkartinę 20 mg/kg kūno svorio dozę, didžiausia koncentracija kraujo plazmoje ($C_{max} = 64,6$ mg/l) susidaro po 12–120 val. (vidurkis – 27 val.). Iš organizmo toltrazurilis išsiskiria lėtai, galutinis pusinės eliminacijos laikas yra iki 9 d. (vidurkis 5 d.). Vaistas iš organizmo daugiausiai išsiskiria su išmatomis.

5.3. Savybės aplinkoje

Toltrazurilio metabolitas, toltrazurilio sulfonas (ponazurilis), ilgai išlieka (pusinio suirimo laikas – daugiau nei 1 metai), sklinda dirvoje ir neigiamai veikia augalų augimą bei daigumą. Pakartotinai tręšiant dirvą gydytų gyvulių mėšlu ponazurilis dėl minėtų savybių gali kauptis dirvoje ir po to kelti pavojų augalams. Ponazurilio gebėjimas kauptis dirvoje bei jo sklidimas taip pat gali kelti prasiskverbimo į gruntinius vandenis pavojų. Žr. 4.3 ir 4.5 p.

6. FARMACINIAI DUOMENYS

6.1. Pagalbinių medžiagų sąrašas

Natrio benzoatas (E211),
natrio propionatas (E281),
propilenglikolis,
dokuzato natrio druska,
simetikono emulsija,
aluminio-magnio silikatas,
citrinų rūgštis monohidratas,
ksantano lipai,
išgrynintas vanduo.

6.2. Nesuderinamumai

Nesant suderinamumo tyrimų, šio veterinarinio vaisto negalima maišyti su kitais veterinariniais vaistais.

6.3. Tinkamumo laikas

Veterinarinio vaisto tinkamumo laikas, nepažeidus originalios pakuotės, – 3 metai.
Veterinarinio vaisto tinkamumo laikas, atidarius pirminę pakuotę, – 12 mėn.

6.4. Specialieji laikymo nurodymai

Šiam veterinariniam vaistui specialių laikymo sąlygų nereikia.

6.5. Pirminės pakuotės pobūdis ir sudedamosios dalys

Didelio tankio polietileno buteliukas su didelio tankio polietileno uždoriu ir mažo tankio polietileno apsaugine plėvele po 250 ml geriamosios suspensijos, dėžutėje.

Didelio tankio polietileno buteliukas su didelio tankio polietileno uždoriu ir mažo tankio polietileno apsaugine plėvele po 1000 ml geriamosios suspensijos.

Gali būti platinamos ne visų dydžių pakuotės.

6.6. Specialios nesunaudoto veterinarinio vaisto ar su jo naudojimu susijusių atliekų naikinimo nuostatos

Nesunaudotas veterinarinis vaistas ar su juo susijusios atliekos turi būti sunaikintos pagal šalies reikalavimus.

7. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJAS

KRKA, d.d., Novo mesto
Šmarješka cesta 6
8501 Novo mesto
SLOVĖNIJA

8. RINKODAROS TEISĖS NUMERIS (-IAI)

LT/2/10/1962/001-002

9. RINKODAROS TEISĖS SUTEIKIMO / ATNAUJINIMO DATA

Rinkodaros teisė pirmą kartą suteikta 2010-07-30

Rinkodaros teisė paskutinį kartą atnaujinta 2015-06-18

10. TEKSTO PERŽIŪROS DATA

2015-12-09

ŽENKLINIMAS

DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT ANTRINĖS IR PIRMINĖS PAKUOTĖS

250 ml DĖŽUTĖ / 1000 ml ETIKETĖ

1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Tolzesya 50 mg/ml geriamoji suspensija kiaulėms, galvijams ir avims
Toltrazurilis

2. VEIKLIOJI (-IOSIOS) IR KITOS MEDŽIAGOS

1 ml yra 50 mg toltrazurilio, 2,1 mg natrio benzoato (E211) ir 2,1 mg natrio propionato (E281).

3. VAISTO FORMA

Geriamoji suspensija.

4. PAKUOTĖS DYDIS

250 ml
1000 ml

5. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠIS (-YS)

Kiaulės (3–5 d. amžiaus paršeliai).
Galvijai (pieno ūkių veršeliai).
Avys (ėriukai).

6. INDIKACIJA (-OS)

7. NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS

Prieš naudojimą būtina perskaityti informacinę lapelį.
Sugirdyti.

8. IŠLAUKA

Išlauka:

	Kiaulės	Galvijai	Avys
Skerdienai ir subproduktams	77 paros	63 paros	42 paros
Pienui	/	Neregistruota naudoti laktacijos metu patelėms, kurių pienas skirtas žmonių maistui.	

9. SPECIALIEJI ĮSPĖJIMAI, JEI REIKIA

Prieš naudojimą geriamąją suspensiją būtina suplakti.

10. TINKAMUMO DATA

Tinka iki {mėnuo/metai}

Atidarius būtina sunaudoti per 12 mėn.

Atidarius būtina sunaudoti iki...

11. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

**12. SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ
NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA**

Naikinimas: skaityti informacinį lapelį.

**13. NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“ IR TIEKIMO BEI
NAUDOJIMO SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI, JEI TAIKYTINA**

Tik veterinariniam naudojimui. Parduodama tik su veterinariniu receptu.

14. NUORODA „SAUGOTI NUO VAIKŲ“

Saugoti nuo vaikų.

15. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, SLOVĖNIJA

16. RINKODAROS TEISĖS NUMERIS (-IAI)

LT/2/10/1962/001

LT/2/10/1962/002

17. GAMINTOJO SERIJOS NUMERIS

Serijs {numeris}

DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT PIRMINĖS PAKUOTĖS**250 ml ETIKETĖ****1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS**

Tolzesya 50 mg/ml geriamoji suspensija kiaulėms, galvijams ir avims
Toltrazurilis

2. VEIKLIOJI (-IOSIOS) IR KITOS MEDŽIAGOS

1 ml yra 50 mg toltrazurilio, 2,1 mg natrio benzoato (E211) ir 2,1 mg natrio propionato (E281).

3. VAISTO FORMA**4. PAKUOTĖS DYDIS**

250 ml

5. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠIS (-YS)

Kiaulės (3–5 d. amžiaus paršeliai).
Galvijai (pieno ūkių veršeliai).
Avys (ėriukai).

6. INDIKACIJA (-OS)**7. NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS**

Prieš naudojimą būtina perskaityti informacinį lapelį.
Sugirdyti.

8. IŠLAUKA

Išlauka:

	Kiaulės	Galvijai	Avys
Skerdienai ir subproduktams	77 paros	63 paros	42 paros
Pienui	/	Neregistruota naudoti laktacijos metu patelėms, kurių pienas skirtas žmonių maistui.	

9. SPECIALIEJI ĮSPĖJIMAI, JEI REIKIA

Prieš naudojimą geriamąją suspensiją būtina suplakiti.

10. TINKAMUMO DATA

Tinka iki {mėnuo/metai}
Atidarius būtina sunaudoti per 12 mėn.
Atidarius būtina sunaudoti iki...

11. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS**12. SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ
NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA****13. NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“ IR TIEKIMO BEI
NAUDOJIMO SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI, JEI TAIKYTINA**

Tik veterinariniam naudojimui. Parduodama tik su veterinariniu receptu.

14. NUORODA „SAUGOTI NUO VAIKŲ“**15. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS**

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, SLOVĖNIJA

16. RINKODAROS TEISĖS NUMERIS (-IAI)

LT/2/10/1962/001
LT/2/10/1962/002

17. GAMINTOJO SERIJOS NUMERIS

Serijs {numeris}

INFORMACINIS LAPELIS
Tolzesya 50 mg/ml geriamoji suspensija kiaulėms, galvijams ir avims

1. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO IR UŽ VAISTO SERIJOS IŠLEIDIMĄ EEE ŠALYSE ATSAKINGO GAMINTOJO, JEI JIE SKIRTINGI, PAVADINIMAS IR ADRESAS

Rinkodaros teisės turėtojas ir gamintojas, atsakingas už vaisto serijos išleidimą
KRKA, d.d., Novo mesto
Šmarješka cesta 6
8501 Novo mesto
SLOVĖNIJA

2. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Tolzesya 50 mg/ml geriamoji suspensija kiaulėms, galvijams ir avims
Toltrazurilis

3. VEIKLIOJI (-IOSIOS) IR KITOS MEDŽIAGOS

1 ml tirštos baltos suspensijos yra 50 mg toltrazurilio, 2,1 mg natrio benzoato (E211) ir 2,1 mg natrio propionato (E281).

4. INDIKACIJA (-OS)

Kiaulės

3–5 dienų amžiaus paršeliams profilaktiškai nuo kokcidiozės klinikinių požymių pasireiškimo ūkiuose, kuriuose nustatyta *Isoospora suis* sukelta kokcidiozė.

Galvijai

Uždarose patalpose laikomiems veršeliams, skirtiems pakeisti karves, kurių pienas skirtas žmonių maistui (melžiamas karves), apsaugoti nuo klinikinių kokcidiozės požymių pasireiškimo ir norint sumažinti oocistų išskyrimą į aplinką ūkiuose, kuriuose pasireiškė *Eimeria bovis* ar *Eimeria zuernii* sukelta kokcidiozė.

Avys

Ėriukams apsaugoti nuo klinikinių kokcidiozės požymių pasireiškimo ir norint sumažinti oocistų išskyrimą į aplinką ūkiuose, kuriuose pasireiškė *Eimeria crandallis* ir *Eimeria ovinoidalis* sukelta kokcidiozė.

5. KONTRAINDIKACIJOS

Nenaudoti, padidėjus jautrumui veikliajai medžiagai ar bet kuriai iš pagalbinių medžiagų.

Galvijai (dėl poveikio aplinkai)

Negalima naudoti veršeliams, sveriantiems daugiau kaip 80 kg,
Negalima naudoti mėsiniams veršeliams ar jautukams.

6. NEPALANKIOS REAKCIJOS

Nežinomos.

Pastebėjus bet koki sunkų poveikį ar kitą šiame informaciniame lapelyje nepaminėtą poveikį, būtina informuoti veterinarijos gydytoją.

7. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠYS

Kiaulės (3-5 d. amžiaus paršeliai).

Galvijai (pieno ūkių veršeliai).

Avys (ėriukai).

8. DOZĖS, NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS KIEKVIENAI RŪŠIAI

Vaistą reikia sugirdyti.

Kiaulės

Vaistą reikia duoti kiekvienam gyvūnui atskirai.

3–5 dieną po atsivedimo kiekvienam paršeliui reikia sugirdyti vienkartinę 20 mg/kg kūno svorio toltrazurilio dozę (atitinka 0,4 ml geriamosios suspensijos 1 kg kūno svorio).

Kadangi kiekvieną paršelį reikia gydyti mažo tūrio doze, rekomenduotina naudoti 0,1 ml tikslumu dozuojančias priemones.

Galvijai

Vienam gyvuliui per kartą reikia sugirdyti vienkartinę 15 mg/kg kūno svorio toltrazurilio dozę (atitinka 3 ml geriamosios suspensijos 10 kg kūno svorio).

Jei gyvuliai gydomi bendrai, o ne individualiai, juos reikia sugrupuoti pagal kūno svorį ir nustatyti atitinkamą dozę, kad ji nebūtų per maža ar per didelė.

Avys

Vienam gyvuliui per kartą reikia sugirdyti vienkartinę 20 mg/kg kūno svorio toltrazurilio dozę (atitinka 0,4 ml geriamosios suspensijos 1 kg kūno svorio).

Jei gyvuliai gydomi bendrai, o ne individualiai, juos reikia sugrupuoti pagal kūno svorį ir nustatyti atitinkamą dozę, kad ji nebūtų per maža ar per didelė.

9. NUORODOS DĖL TINKAMO NAUDOJIMO

Paruoštą naudoti geriamąją suspensiją prieš naudojimą reikia suplakti.

Norint užtikrinti tinkamos dozės skyrimą, reikia kuo tiksliau nustatyti kūno svorį.

Norint gauti didžiausią naudą, gyvulius reikia gydyti prieš pasireiškiant klinikiniams požymiams, t. y. inkubaciniu periodu. Pasireiškus ligos protrūkiui, individualiai paršelius gydyti neveiksminga, nes plonosios žarnos jau būna pažeistos.

10. IŠLAUKA

Kiaulės:

skerdienai ir subproduktams – 77 paros.

Galvijai:

skerdienai ir subproduktams – 63 paros;

pienui: neregistruota naudoti laktacijos metu patelėms, kurių pienas skirtas žmonių maistui.

Avys:

skerdienai ir subproduktams – 42 paros;

pienui: neregistruota naudoti laktacijos metu patelėms, kurių pienas skirtas žmonių maistui.

11. SPECIALIEJI LAIKYMO NURODYMAI

Saugoti nuo vaikų.

Šiam veterinariniam vaistui specialių laikymo sąlygų nereikia.

Šio veterinarinio vaisto negalima naudoti pasibaigus tinkamumo laikui, nurodytam ant pakuotės po „Tinka iki“. Tinkamumo data sutampa su paskutine nurodyto mėnesio diena.

Tinkamumo laikas, pirmą kartą atidarius pirminę pakuotę, – 12 mėn.

12. SPECIALIEJI NURODYMAI

Specialieji nurodymai, naudojant atskirų rūšių paskirties gyvūnams

Kaip ir naudojus bet koki vaistą nuo parazitų ar pakartotinai naudojant tos pačios klasės antiprotozoinį vaistą, gali atsirasti ligos sukėlėjų atsparumas.

Rekomenduotina gydyti visus garde esančius veršelius ar ėriukus. Kokcidiozės pavojų galima sumažinti taikant higienos priemones. Dėl to tvarte rekomenduotina kartu gerinti ir higienines sąlygas, ypač sausumą ir švarą. Norint gauti didžiausią naudą, gyvulius reikia gydyti prieš pasireiškiant klinikiniams požymiams, t. y. inkubaciniu periodu. Norint sutrikdyti nustatytos klinikinės kokcidiozės infekcijos ciklą, atskirus gyvulius, kurie jau pradėję viduriuoti, gali tekti gydyti papildomai.

Kitos atsargumo priemonės

Toltrazurilio metabolitas, toltrazurilio sulfonas (ponazurilis), ilgai išlieka (pusinio suirimo laikas – daugiau nei 1 metai), sklinda dirvoje ir neigiamai veikia augalų augimą bei daigumą. Pakartotinai tręšiant dirvą gydytų gyvulių mėšlu ponazurilis dėl minėtų savybių gali kauptis dirvoje ir po to kelti pavojų augalams. Ponazurilio gebėjimas kauptis dirvoje bei jo sklidimas taip pat gali kelti prasiskverbimo į gruntinius vandenis pavojų.

Norint apsaugoti augalus nuo bet kokio nepalankaus poveikio ir gruntinius vandenis nuo užteršimo, gydytų veršelių mėšlu negalima tręšti žemės prieš tai jo neatskiedus negydytų galvijų mėšlu. Prieš tręšimą gydytų veršelių mėšlą reikia atskiesti negydytų galvijų mėšlu ne mažiau kaip 3 kartus.

Vyresnius kaip 6 savaitių ar sveriančius daugiau kaip 20 kg ėriukus, kurie visą gyvenimą laikomi patalpoje ir intensyviai auginami, gydyti negalima. Gydytų gyvulių mėšlu tręšti tą patį žemės plotą galima tik kas trejus metus.

Nesuderinamumai

Nesant suderinamumo tyrimų, šio veterinarinio vaisto negalima maišyti su kitais veterinariniais vaistais.

Perdozavimas (simptomai, pirmosios pagalbos priemonės, priešnuodžiai), jei būtina

Tris kartus didesnę nei rekomenduotina vaisto dozę sveiki paršeliai ir veršeliai gerai toleravo be jokių nepalankių požymių. Ėriukams sugirdžius vienkartinę trigubą dozę ar dvi dienas iš eilės girdant dvigubą dozę, perdozavimo požymių nepastebėta.

Specialios atsargumo priemonės asmenims, naudojantiems vaistą gyvūnams

Žmonės, kuriems nustatytas padidėjęs jautrumas bet kuriai sudėtinei medžiagai, turi vengti sąlyčio su šiuo veterinariniu vaistu.

Jeigu vaisto patenka ant odos ar į akis, reikia nedelsiant plauti vandeniu.

13. SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA

Nesunaudotas veterinarinis vaistas ar su juo susijusios atliekos turi būti sunaikintos pagal šalies reikalavimus.

Veterinarijos gydytojas gali patarti, ką daryti su nereikalingais vaistais. Tai turėtų padėti saugoti aplinką.

14. INFORMACINIO LAPELIO PASKUTINIOJO APROBAVIMO DATA

2015-12-09

15. KITA INFORMACIJA

Parduodama tik su veterinariniu receptu.

Tolzesya tiekiamas buteliukais po 250 ml ir 1000 ml geriamosios suspensijos.

250 ml buteliukas būna dėžutėje.

Gali būti platinamos ne visų dydžių pakuotės.

Norint gauti informacijos apie šį veterinarinį vaistą, reikia susisiekti su rinkodaros teisės turėtojo vietiniu atstovu.

UAB KRKA Lietuva

Senasis Ukmergės kelias 4

Užubalių km., Vilniaus r.

LT - 14013

Tel. + 370 5 236 2740