

## NAVODILO ZA UPORABO

Cefa-cure 200 mg tablete za pse in mačke

### 1. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM TER IMETNIKA DOVOLJENJA ZA IZDELAVO ZDRAVILA, ODGOVORNEGA ZA SPROSTITEV SERIJE V EGP, ČE STA RAZLIČNA

Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom:

INTERVET International B.V.  
Wim de Korverstraat 35  
5831 AN Boxmeer  
Nizozemska

Izdelovalec, odgovoren za sprostitvev serije:

Intervet Productions S.r.l., Aprilia  
Via NETTUNENSE, Km 20.3  
04011 Aprilia (LT)  
Italija

### 2. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Cefa-cure 200 mg tablete za pse in mačke  
cefadroksil

### 3. NAVEDBA ZDRAVILNE UČINKOVINE IN DRUGIH SESTAVIN

1 tableta vsebuje 200 mg cefadroksila.

### 4. INDIKACIJE

Cefa-cure je indiciran za zdravljenje naslednjih obolenj psov in mačk:

- *piodermija – površinska in globinska* – ki jo povzročajo občutljivi mikroorganizmi, na primer stafilokoki;
- *okužbe mehkih tkiv* (rane, abscesi, vroča mesta ali poletne rane), ki jih povzročajo občutljivi mikroorganizmi, na primer stafilokoki ali streptokoki;
- *okužbe sečil*, ki jih povzročajo občutljivi mikroorganizmi, na primer stafilokoki, streptokoki, *Proteus* spp., *E. coli* ali *Klebsiella* spp.;
- *okužbe dihal*, ki jih povzročajo občutljivi mikroorganizmi, na primer stafilokoki, streptokoki, *Pasteurella* spp. ali *Klebsiella* spp..

### 5. KONTRAINDIKACIJE

Znana preobčutljivost za peniciline ali cefalosporine.

### 6. NEŽELENI UČINKI

Driska, mehko blato in bruhanje. Neželeni učinki so redki, blagi in prehodni.

Če opazite kakršne koli resne stranske učinke ali druge učinke, ki niso omenjeni v teh navodilih za uporabo, obvestite svojega veterinarja.

## **7. CILJNE ŽIVALSKÉ VRSTE**

Pes in mačka.

## **8. ODMERKI ZA POSAMEZNE ŽIVALSKÉ VRSTE TER POT IN NAČIN UPORABE ZDRAVILA**

Odmerek po 20 mg cefadroksila na kilogram telesne mase 1-krat na dan peroralno. Priporočamo dajanje zdravila med obrokom ali po njem.

Trajanje zdravljenja je odvisno od vrste in resnosti okužbe ter odziva na zdravljenje. Večinoma zadošča 10-dnevno zdravljenje. Če je potrebno in glede na klinični odziv lahko zdravljenje nadaljujemo, dokler menimo, da je odziv nanj ustrezen. Ko bolezenski simptomi minejo, živali zdravimo še najmanj 2 do 3 dni.

Piodermija se večinoma pojavi kot sekundarna okužba ob osnovni bolezni. Priporočljivo je odkriti njen vzrok in žival ustrezno zdraviti.

## **9. NASVET O PRAVILNI UPORABI ZDRAVILA**

Za zagotovitev ustreznega odmerka in da se prepreči premajhno odmerjanje zdravila je treba čim bolj natančno določiti telesno težo.

## **10. KARENCA**

Ni smiselno.

## **11. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE**

Shranjujte nedosegljivo otrokom.

Za shranjevanje ni posebnih navodil.

Zdravila ne smete uporabljati po datumu izteka roka uporabnosti, navedenega na škatli poleg oznake EXP.

## **12. POSEBNA OPOZORILA**

Beta-laktamski antibiotiki lahko povzročijo preobčutljivost (alergijo) ob injiciranju, inhalaciji, zaužitju ali ob stiku s kožo.

1. Ne rokujte z zdravilom, če ste senzibilizirani za beta-laktamske antibiotike ali so vam svetovali, da ne delate s takimi preparati.

2. Z zdravilom rokujte z veliko mero previdnosti, da se izognete morebitnemu stiku zdravila s kožo.

3. Če se pri vas pojavijo simptomi izpostavljenosti zdravilu kot so izpuščaji se je treba posvetovati z zdravnikom in pokazati zdravniku to opozorilo. Oteklina obraza, ustnic ali oči ali težave z dihanjem so resnejši simptomi in zahtevajo zdravniško oskrbo.

## **13. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEPORABLJENEGA ZDRAVILA ALI ODPADNIH SNOVI, ČE OBSTAJAJO**

Ne odvrzite zdravila v odpadno vodo ali v gospodinjske odpadke.

Glede odstranjevanja zdravil, ki jih ne uporabljate več, se posvetujte z veterinarjem. Zdravilo odstranite na okolju prijazen način.

## **14. DATUM ZADNJE ODOBRITEVE NAVODILA ZA UPORABO**

9.4.2015