

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

KARTONSKA ŠKATLA
50/100 /250 ml steklena viala

1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

TYLUCYL 200 mg/ml raztopina za injiciranje

2. NAVEDBA UČINKOVIN

En ml vsebuje:

tilozin..... 200 000 IE
(kar je enako približno 200 mg)

3. VELIKOST PAKIRANJA

50 ml,
100 ml
250 ml

4. CILJNE ŽIVALSKÉ VRSTE

Govedo, prašiči

**5. INDIKACIJE****6. POTI UPORABE**

i.m. ali počasi i.v. (samo pri govedu)

7. KARENCA

Karenca:

Govedo:
Meso in organi: 28 dni.
Mleko: 108 ur.

Prašiči:

Meso in organi: 16 dni.

8. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

Exp. {mm/llll}

Načeto zdravilo uporabite v 28 dneh.

Načeto zdravilo uporabite do ____.

9. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Ne shranjujte pri temperaturi nad 25 °C.

Ne zamrzujte.

Vialo shranjujte v zunanji ovojnini, da se zaščiti pred svetlobo.

Shranjujte v originalni ovojnini.

10. BESEDILO “PRED UPORABO PREBERITE NAVODILO ZA UPORABO”

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

11. BESEDILO “SAMO ZA ŽIVALI”

Samo za živali.

12. BESEDILO “ZDRAVILO SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM”

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom.

13. IME IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET

Vetoquinol S.A.

14. ŠTEVILKA DOVOLJENJA ZA PROMET

DC/V/0589/001

15. ŠTEVILKA SERIJE

Lot {števila}

**PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA MANJŠIH STIČNIH
OVOJNINAH**

Nalepka 50 ml viala

1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

TYLUCYL 200 mg/ml



2. KOLIČINA UČINKOVIN

Tilozin.....200 000 IE/ml
(kar je enako približno 200 mg)

3. ŠTEVILKA SERIJE

Lot {številka}

4. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

Exp. {mm/llll}

Načeto zdravilo uporabite v 28 dneh.

Načeto zdravilo uporabite do ____.

PODATKI NA STIČNI OZ. PRIMARNI OVOJNINI

Nalepka 100 in 250 ml viala

1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Tylucyl 200 mg/ml

2. NAVEDBA UČINKOVIN

En ml vsebuje:

tilozin.....200 000 IE

(kar je enako približno 200 mg)

3. CILJNE ŽIVALSKÉ VRSTE

Govedo, prašiči



4. POTI UPORABE

i.m. ali počasi i.v. (samo pri govedu)

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

5. KARENCA

Karenca:

Govedo:

Meso in organi: 28 dni.

Mleko: 108 ur.

Prašiči:

Meso in organi: 16 dni.

6. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

Exp. {mm/llll}

Načeto zdravilo uporabite v 28 dneh.

Načeto zdravilo uporabite do ____.

7. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE
--

Ne shranjujte pri temperaturi nad 25 °C.

Ne zamrzujte.

Vialo shranjujte v zunanji ovojnini, da se zaščiti pred svetlobo.

Shranjujte v originalni ovojnini.

8. IME IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET

Vetoquinol S.A.

9. ŠTEVILKA SERIJE

Lot {številka}