

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA V/NRP/96/0453

Dehelman powder 11,8% pulveris iekšķīgai lietošanai
liellopiem, aitām, kazām, cūkām, cāļiem

1. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA UN RAŽOŠANAS LICENCES TURĒTĀJA, KURŠ ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI, NOSAUKUMS UN ADRESE, JA DAŽĀDI

KRKA, d.d., Novo mesto
Šmarješka cesta 6
8501 Novo mesto
Slovēnija

2. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Dehelman powder 11,8% pulveris iekšķīgai lietošanai liellopiem, aitām, kazām, cūkām, cāļiem

Levamisolum

3. ZIŅOJUMS PAR AKTĪVO VIELU UN CITĀM SASTĀVDAĻĀM

100 g pulvera iekšķīgai lietošanai satur -

Aktīvā viela:

11,8 g levamizola hidrohlorīds, kas atbilst 10 g levamizola (*Levamisolum*).

Palīgvielas:

Laktozes monohidrāts

4. INDIKĀCIJAS

Veterinārās zāles lieto zarnu parazītu iznīcināšanai ar kuņģa-zarnu trakta un plaušu nematodēm inficētiem liellopiem, aitām, kazām, cūkām un cāļiem.

Liellopiem, aitām, kazām: *Dictyocaulus spp.*, *Protostrongylus spp.*, *Neoascaris vitulorum*, *Trichuris ovis*, *Trichostrongylus spp.*, *Cooperia spp.*, *Ostertagia spp.* (izņemot hipobiotiskas kūniņas), *Haemonchus spp.*, *Nematodirus spp.*, *Bunostomum spp.*, *Oesophagostomum spp.*, *Chabertia ovina*, *Strongyloides spp.*

Cūkām: *Ascaris suum* (tostarp migrējošas kūniņas), *Metastrongylus elongatus*, *Hyostrongylus rubidus*, *Oesophagostomum spp.*, *Strongyloides ransomi*, *Trichuris suis*.

Cāļiem: *Ascaridia spp.*, *Capillaria spp.*, *Heterakis spp.*, *Amidostomum spp.*, *Syngamus trachea*.

5. KONTRINDIKĀCIJAS

Nelietot dējējputniem, no kuriem iegūst olas cilvēku uzturam.

Nelietot dzīvniekiem, no kuriem iegūst pienu, ko paredzēts lietot pārtikā.

Nelietot dzīvniekiem nieru un aknu slimību gadījumā.

6. IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS

Terapeitiskā deva nav toksiska un neizraisa nevēlamas blakusparādības. Pēc pārdozēšanas 30 minūšu laikā var rasties satraukums, tremors, kolikas, acu asarošana un siekalošanās. 2 – 3 stundu laikā šīs pazīmes spontāni izzūd bez jebkādas medicīniskas ārstēšanas. Atsevišķiem dzīvniekiem smagas nobriedušu plaušu tārpu invāzijas rezultātā dažas dienas pēc ārstēšanas var saglabāties klepus.

Ja novērojat jebkuras būtiskas blakusparādības vai citu iedarbību, kas nav minētas šajā lietošanas instrukcijā, lūdzu informējiet par tām savu veterinārārstu.

7. MĒRĶA SUGAS

Liellopi, aitas, kazas, cūkas, cāļi.

8. DEVAS ATKARĪBĀ NO DZĪVNIEKU SUGAS, LIETOŠANAS VEIDA UN PAŅĒMIENA

Liellopiem, aitām un kazām veterinārās zāles piejauc dzeramajam ūdenim vai dod atsevišķi.

Cūkām zāles piejauc barībai vai dzeramajam ūdenim.

Cāļiem zāles piejauc dzeramajam ūdenim.

Liellopiem, aitām, kazām un cūkām jālieto 20 g pulvera uz 250 kg ķermeņa svara, kas atbilst 9 mg levamizola uz 1 kg ķermeņa svara.

Cāļiem jālieto 20 g pulvera uz 100 kg ķermeņa svara, kas atbilst 23 mg levamizola uz 1 kg ķermeņa svara.

9. IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI

14 dienas pirms un 14 dienas pēc Dehelman pulvera iekšķīgai lietošanas nedrīkst lietot organiskos fosfora savienojumus.

10. IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Gaļai un nierēm: liellopiem 21 diena.

Gaļai un blakusproduktiem: cūkām, aitām, kazām 7 dienas.

Nierēm: cūkām, aitām, kazām 14 dienas.

Gaļai un blakusproduktiem: cāļiem 3 dienas.

Nelietot dējējputniem, no kuriem iegūst olas cilvēku uzturam.

Nelietot dzīvniekiem, no kuriem iegūst pienu, ko paredzēts lietot pārtikā.

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI

Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā!

Uzglabāt temperatūrā līdz +25°C.

Sargāt no gaismas un mitruma.

Nelietot, ja beidzies derīguma termiņš, kurš norādīts marķējumā.

12. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI

Lietošana grūsnības un laktācijas laikā

Šīs veterinārās zāles drīkst lietot gan grūsnības, gan laktācijas laikā.

Nelietot dzīvniekiem, no kuriem iegūst pienu, ko paredzēts lietot pārtikā.

Mijiedarbība ar citām vetrinārajām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Nav zināma.

Pārdozēšana (simptomi, simptomi, rīcība ārkārtas situācijā, antidoti)

Profesionālā literatūrā pārdozēšanas gadījumi nav aprakstīti.

Īpaši brīdinājumi par katru mērķa sugu

Nav.

13. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI RĪCĪBAI AR NEIZLIETOTĀM VETERINĀRAJĀM ZĀLĒM VAI TO ATKRITUMIEM, JA TĀDI IR

Jebkuras neizlietotās veterinārās zāles vai to atkritumi jāiznīcina saskaņā ar vietējo normatīvo aktu prasībām.

Jautājiet savam veterinārārstam, kā atbrīvoties no nevajadzīgām zālēm. Šādi pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

14. DATUMS, KAD LIETOŠANAS INSTRUKCIJA PĒDĒJO REIZI TIKA APSTIPRINĀTA

29/12/2011

15. CITA INFORMĀCIJA

Kartona kārbā pa 10 x 20 g paciņām.

Maiss pa 1 kg.

Ne visi iepakojuma izmēri var tikt izplatīti.

Lai iegūtu papildu informāciju par šīm veterinārajām zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas apliecības īpašnieka vietējo pārstāvi Latvijā:

SIA KRKA Latvija
Mūkusalas iela 101, Rīga
LV-1004, Latvija
Tālr.: +371 67338610
Fakss: +371 67338151