

*[Version 7.1, 10/2006]
Corr. 06/2007 nazionale*

RIASSUNTO DELLE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE VETERINARIO

Droncit Spot-on 20 mg soluzione spot-on per gatti

2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA

1 tubetto da 0,5 ml di soluzione contiene:

Principio attivo:

Praziquantel 20 mg

Eccipienti:

Butilidrossitoluene (BHT - E321) 0,5 mg

N-metil pirrolidone 497,8 mg

Per l'elenco completo degli eccipienti, vedere paragrafo 6.1.

3. FORMA FARMACEUTICA

Soluzione per spot-on

4. INFORMAZIONI CLINICHE

4.1 Specie di destinazione

Gatti.

4.2 Indicazioni per l'utilizzazione specificando le specie di destinazione

Antelmintico per gatti.

Efficace contro le forme mature ed immature di *Dipylidium caninum* e *Taenia spp.*

Lo spettro d'azione del praziquantel copre tutte le specie importanti di cestodi dei gatti. Esso include specificamente tutte le *Taenia species* che infestano i gatti, *Multiceps multiceps*, *Joyeuxiella pasqualei*, *Dipylidium caninum*, *Mesocostoides spp.*, *Echinococcus granulosus* e *Echinococcus multilocularis*. Il praziquantel è efficace contro tutti gli stadi intestinali di questi parassiti presenti nei gatti.

4.3 Controindicazioni

Gatti di peso inferiore a 1 kg, in quanto i tubetti non sono idonei a dispensare dosaggi adatti a gatti inferiori a 1 kg di peso corporeo.

Non usare in caso di ipersensibilità al principio attivo o ad uno qualsiasi degli eccipienti

4.4 Avvertenze speciali per ciascuna specie di destinazione

Nell'ambiente domestico, evitare che il gatto trattato o altri gatti leccino la zona di applicazione dopo il trattamento. Se ciò dovesse avvenire subito dopo l'applicazione, dal momento che il prodotto è di sapore amaro, potrebbe occasionalmente verificarsi salivazione. Questo non è un segno di intossicazione e scompare spontaneamente poco dopo, senza trattamento. Evitare che l'animale appena trattato venga a contatto con bambini.

4.5 Precauzioni speciali per l'impiego

Precauzioni speciali per l'impiego negli animali

Solo per uso esterno.

Droncit® Spot-on può essere irritante per gli occhi. Prestare attenzione per evitare che il contenuto del tubetto venga in contatto con gli occhi dell'animale oggetto del trattamento. In caso di contatto accidentale sciacquare abbondantemente con acqua.

Precauzioni speciali che devono essere adottate dalla persona che somministra il prodotto agli animali

Studi di laboratorio su conigli e ratti con l'eccipiente N-metil pirrolidone hanno evidenziato effetti fetotossici. Il medicinale veterinario non deve essere somministrato da donne in gravidanza e da donne che sospettano di essere in gravidanza. Le donne in età fertile devono indossare dispositivi di protezione individuale, come guanti, durante la manipolazione del medicinale veterinario.

Droncit® Spot-on può essere irritante per la cute e per gli occhi. Durante il trattamento indossare guanti e occhiali.

Evitare il contatto con la cute. In caso di contaminazione accidentale, lavare con acqua e sapone.

Lavarsi le mani accuratamente dopo l'uso.

Evitare assolutamente qualsiasi contatto della soluzione con gli occhi.

In caso di contatto accidentale sciacquare abbondantemente con acqua. Se l'irritazione oculare o cutanea dovesse persistere, rivolgersi ad un medico.

Non mangiare, bere o fumare durante l'applicazione. Non ingerire. In caso di ingestione accidentale, rivolgersi immediatamente ad un medico mostrandogli il foglietto illustrativo o l'etichetta.

4.6 Reazioni avverse (frequenza e gravità)

Occasionalmente può essere osservata in sede di applicazione una reazione locale successiva al trattamento, come dermatite, desquamazione o lieve presenza di essudato, perdita di pelo, ipersensibilità. Il prodotto è di sapore amaro e occasionalmente si può presentare salivazione e vomito se il gatto lecca il sito di applicazione immediatamente dopo il trattamento. Tale effetto non è un segno di intossicazione e scompare poco dopo, senza trattamento.

4.7 Impiego durante la gravidanza o l'allattamento

La sicurezza del medicinale veterinario nei gatti durante la gravidanza e l'allattamento o negli animali destinati alla riproduzione non è stata stabilita. Studi di laboratorio su conigli e ratti con l'eccipiente N-metil pirrolidone hanno evidenziato effetti fetotossici. Usare solo conformemente alla valutazione del rapporto beneficio-rischio del veterinario responsabile.

4.8 Interazione con altri medicinali veterinari ed altre forme d'interazione

Non somministrare contemporaneamente ad altri farmaci.


4.9 Posologia e via di somministrazione

Il dosaggio minimo raccomandato è di 8 mg di praziquantel/kg di peso corporeo. Tale dosaggio corrisponde a 1 tubetto per 2,5 kg di peso corporeo.


Peso corporeo	n° tubetti
1 - 2,5 kg	1
> 2,5 - 5 kg	2
> 5 kg	3

Somministrazione cutanea (spot-on).

La soluzione viene somministrata mediante il tubetto, che rende l'applicazione facile e sicura. Togliere un tubetto dalla confezione. Tenere il tubetto in posizione verticale, svitare e togliere il tappo. Usare il tappo rovesciato per ruotare e togliere il sigillo dal tubetto.



Con due dita, scostare il pelo sulla parte posteriore del collo, immediatamente dietro la testa, in modo da rendere visibile la cute (vedi figura). Tenendo il tubetto in posizione verticale, appoggiare la punta sulla cute e, premendo più volte, applicare tutto il contenuto sulla zona interessata. È particolarmente importante applicare la dose su una zona che l'animale non possa leccare.



Unico trattamento.

4.10 Sovradosaggio (sintomi, procedure d'emergenza, antidoti) se necessario

Il sovradosaggio può portare a lievi reazioni cutanee che scompaiono spontaneamente in pochi giorni.

4.11 Tempo(i) di attesa

Non pertinente.

5. PROPRIETÀ FARMACOLOGICHE

Gruppo farmacoterapeutico: derivato pirazinoisochinolinico, con attività antelmintica.
Codice ATCvet: QP52 AA 01

5.1 Proprietà farmacodinamiche

Lo spettro d'azione del praziquantel copre tutte le specie importanti di cestodi dei gatti. Esso include specificamente tutte le *Taenia species* che infestano i gatti, *Multiceps multiceps*, *Joyeuxiella pasqualei*, *Dipylidium caninum*, *Mesocoestoides spp.*, *Echinococcus granulosus* e *Echinococcus multilocularis*. Il praziquantel è efficace contro tutti gli stadi intestinali di questi parassiti presenti nei gatti.

5.2 Informazioni farmacocinetiche

Il praziquantel viene rapidamente assorbito attraverso la superficie dei parassiti e si distribuisce uniformemente nel parassita stesso. Sia in vitro che in vivo si verifica molto rapidamente un grave danno del tegumento del parassita, che si traduce nella paralisi degli stessi parassiti. In particolare, la base di questa rapida insorgenza d'azione è il cambiamento di permeabilità delle membrane del parassita al Ca^{++} innescato dal praziquantel; ciò provoca un'alterazione del metabolismo del parassita conducendo alla morte di quest'ultimo.

Dopo somministrazione orale a ratti, cani, scimmie, pecore e nell'uomo, il praziquantel viene assorbito molto rapidamente e pressoché completamente nello stomaco e nell'intestino tenue. Anche la somministrazione parenterale (s.c. e i.m.) si è dimostrata efficace in cani e gatti. È stato dimostrato che l'applicazione cutanea produce livelli ematici efficaci nel gatto. In funzione della forma di applicazione e della specie, il picco dei livelli serici viene raggiunto entro 0,3-2 ore. Il praziquantel si distribuisce molto rapidamente in tutti gli organi. I valori dell'emivita di eliminazione del praziquantel marcato con ^{14}C e dei suoi metaboliti sono compresi fra 2 e 3 ore nel ratto, nel cane, nella scimmia e nella pecora. Nell'uomo ed in tutte le specie animali citate, il praziquantel viene rapidamente metabolizzato nel fegato. Oltre a numerosi altri metaboliti, il metabolita principale presente in ciascun caso è il derivato 4-idrossicicloesilico del praziquantel.

Il praziquantel è completamente eliminato sotto forma di metaboliti. Dal 40 al 71% è escreto nelle urine e dal 13 al 30% passa tramite la bile nelle feci entro le 48 ore dopo il trattamento.

6. INFORMAZIONI FARMACEUTICHE

6.1 Elenco degli eccipienti

Butilidrossitoluene (BHT - E321)
N - metilpirrolidone

6.2 Incompatibilità

Non note.

6.3 Periodo di validità

Periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 30 mesi

6.4 Speciali precauzioni per la conservazione

Dopo l'apertura del blister conservare la pipetta non utilizzata al riparo dalla luce.

6.5 Natura e composizione del condizionamento primario

Scatola con quattro pipette in polipropilene da 0,5 ml , confezionate in due blister.

Scatola con quaranta pipette in polipropilene da 0.5 ml, confezionate in venti blister.

Blister composto da OPA/Al/PVC e Al.

È possibile che non tutte le confezioni siano commercializzate.

6.6 Precauzioni particolari da prendere per lo smaltimento del medicinale veterinario non utilizzato e dei rifiuti derivanti dal suo utilizzo

Tutti i medicinali veterinari non utilizzati o i rifiuti derivati da tali medicinali, devono essere smaltiti in conformità alle disposizioni di legge locali.

7. TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO

Titolare dell'Autorizzazione all'Immissione in Commercio:

Vetoquinol S.A.
Magny-Vernois
70200 Lure
Francia

Fabbricante e responsabile del rilascio dei lotti:

KVP Pharma + Veterinaer Produkte GmbH
Projendorfer Str. 324
24106 Kiel
Germania

8. NUMERO(I) DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO

A.I.C. n. 102473016 scatola 4 tubetti da 0,5 ml
A.I.C. n. 102473028 scatola 40 tubetti da 0,5 ml

9. DATA DELLA PRIMA AUTORIZZAZIONE/RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE

Data di prima autorizzazione: 18.12.1998
Data del rinnovo: 18.12.2008

10. DATA DI REVISIONE DEL TESTO

02/2024

DIVIETO DI VENDITA, FORNITURA E/O IMPIEGO

Non pertinente.

MODALITA' DI DISPENSAZIONE

Medicinale veterinario senza obbligo di ricetta medico veterinaria

ETICHETTATURA E FOGLIETTO ILLUSTRATIVO

A. ETICHETTATURA

<INFORMAZIONI DA APPORRE SULL'IMBALLAGGIO ESTERNO>
<INFORMAZIONI DA APPORRE SUL CONDIZIONAMENTO PRIMARIO>

Scatola : 4 tubetti da 0,5 ml (2 blister contenenti 2 tubetti ciascuno)
Scatola : 40 tubetti da 0,5 ml (20 blister contenenti 2 tubetti ciascuno)

1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE VETERINARIO

Droncit® Spot-on 20 mg soluzione Spot-on per gatti

Praziquantel

2. INDICAZIONE DEI PRINCIPI ATTIVI E DI ALTRE SOSTANZE

1 tubetto da 0,5 ml di soluzione contiene:

Principio attivo:

Praziquantel 20 mg

Eccipienti:

Butilidrossitoluene (BHT - E321) 0,5 mg

N-metil pirrolidone 497,8 mg

3. FORMA FARMACEUTICA

Soluzione per spot-on

4. CONFEZIONI

4 tubetti da 0,5 ml

40 tubetti da 0,5 ml

5. SPECIE DI DESTINAZIONE

Gatti

6. INDICAZIONE(I)

Antelmintico per gatti.

Efficace contro le forme mature ed immature di *Dipylidium caninum* e *Taenia spp.*

Prima dell'uso leggere anche il foglietto illustrativo.

7. MODALITÀ E VIA(E) DI SOMMINISTRAZIONE

Soluzione cutanea per trattamento transdermico (spot-on).

Solo per uso esterno.

Il dosaggio minimo raccomandato è di 8 mg di praziquantel/kg di peso corporeo. Tale dosaggio corrisponde a 1 tubetto per 2,5 kg di peso corporeo.

Applicare 1 o più tubetti secondo la seguente tabella:

Peso corporeo	n° tubetti
1 - 2,5 kg	1
> 2,5 - 5 kg	2
> 5 kg	3

Applicare sulla parte posteriore del collo, alla base del cranio, dopo aver scostato con le dita, il pelo dell'animale.

Prima dell'uso leggere il foglietto illustrativo.

spazio per la posologia prescritta, ai sensi del D.Lvo 193/06, art. 58, comma 1, lettera f

8. SE NECESSARIO, AVVERTENZA(E) SPECIALE(I)

Droncit® Spot-on può essere irritante per gli occhi. Prestare attenzione per evitare che il contenuto del tubetto venga in contatto con gli occhi dell'operatore o dell'animale oggetto del trattamento.

Prima dell'uso leggere il foglietto illustrativo.

9. DATA DI SCADENZA

SCAD {mese/anno}

10. PRECAUZIONI PARTICOLARI PER LA CONSERVAZIONE

Dopo l'apertura del blister conservare la pipetta non utilizzata al riparo dalla luce.

11. OVE NECESSARIO, PRECAUZIONI PARTICOLARI DA PRENDERE PER LO SMALTIMENTO DEI MEDICINALI NON UTILIZZATI O DEI RIFIUTI

Tutti i medicinali veterinari non utilizzati o i rifiuti derivati da tali medicinali devono essere smaltiti in conformità alle disposizioni di legge locali e conferiti negli idonei sistemi di raccolta e di smaltimento per i medicinali non utilizzati o scaduti

12. LA SCRITTA "SOLO PER USO VETERINARIO" E CONDIZIONI O LIMITAZIONI RELATIVE A FORNITURA ED IMPIEGO, se pertinente

Solo per uso veterinario. (in rosso)

La vendita non è sottoposta all'obbligo di ricetta medico-veterinaria. (in rosso)

13. LA SCRITTA “TENERE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI”
--

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

14. NOME E INDIRIZZO DEL TITOLARE DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO
--

Titolare A.I.C.:

Vetoquinol S.A.
Magny-Vernois
70200 Lure
Francia

Fabbricante e Responsabile del Rilascio dei lotti:

KVP Pharma + Veterinär Produkte GmbH
Projensdorfer Str. 324, Kiel
D-24106 Kiel (Germania)

15. NUMERO(I) DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO
--

A.I.C. n. 102473016 – scatola da 4 tubetti
A.I.C. n. 102473028 – scatola da 40 tubetti

16. NUMERO DEL LOTTO DI FABBRICAZIONE
--

Lotto {numero}

Euro.....

Logo Vetoquinol S.A.Figura/foto gatto
Pittogramma forma farmaceutica

Non disperdere il contenitore nell’ambiente dopo l’uso.
Spazio per codice a barre a lettura ottica D.M. 17/12/2007

**INFORMAZIONI MINIME DA APPORRE SUI CONDIZIONAMENTI PRIMARI DI
PICCOLE DIMENSIONI**
Etichetta tubetto da 0,5 ml

1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE VETERINARIO

Droncit® Spot-on 20 mg soluzione Spot-on per gatti

Praziquantel

2. QUANTITÀ DI PRINCIPIO(I) ATTIVO(I)

Praziquantel 20 mg/0,5 ml

3. CONTENUTO IN PESO, VOLUME O NUMERO DI DOSI

0,5 ml

4. VIA(E) DI SOMMINISTRAZIONE

Solo per uso esterno.

Soluzione cutanea per trattamento transdermico (Spot-on)

5. TEMPO DI ATTESA

6. NUMERO DI LOTTO

Lotto {numero}

7. DATA DI SCADENZA

SCAD{mese/anno}

8. LA SCRITTA “SOLO PER USO VETERINARIO”

Solo per uso veterinario

Logo Vetoquinol S.A.

INFORMAZIONI MINIME DA APPORRE SUI BLISTER O SUGLI STRIPS

Blister 2 tubetti da 0,5 ml

1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE VETERINARIO

Droncit® Spot-on 20 mg soluzione Spot-on per gatti

Praziquantel

2. NOME DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO

Vetoquinol S.A.

3. DATA DI SCADENZA

SCAD {mese/anno}

4. NUMERO DI LOTTO

Lotto {numero}

5. LA SCRITTA "SOLO PER USO VETERINARIO"

Solo per uso veterinario.

Solo per uso esterno

Logo Vetoquinol S.A.Figura gatto

Antelmintico per gatti

B. FOGLIETTO ILLUSTRATIVO

FOGLIETTO ILLUSTRATIVO

Droncit® Spot-on 20 mg soluzione Spot-on per gatti

1. NOME E INDIRIZZO DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO E DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA PRODUZIONE RESPONSABILE DEL RILASCIO DEI LOTTI DI FABBRICAZIONE, SE DIVERSI

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio:

Vetoquinol S.A.
Magny-Vernois
70200 Lure
Francia

Titolare dell'autorizzazione alla produzione e responsabile del rilascio dei lotti di fabbricazione:

KVP Pharma + Veterinär Produkte GmbH
Projensdorfer Str. 324, Kiel
D-24106 Kiel (Germania)

2. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE VETERINARIO

Droncit® Spot-on 20 mg soluzione Spot-on per gatti

Praziquantel

3. INDICAZIONE DEL(I) PRINCIPI(O) ATTIVO(I) E DEGLI ALTRI INGREDIENTI

1 tubetto da 0,5 ml di soluzione contiene:

Principio attivo:

Praziquantel 20 mg

Eccipienti:

Butilidrossitoluene (BHT – E321) 0,5 mg
N-metil pirrolidone 497,8 mg

4. INDICAZIONE(I)

Antielmintico per gatti.

Efficace contro le forme mature ed immature di *Dipylidium caninum* e *Taenia spp.*

Lo spettro d'azione del praziquantel copre tutte le specie importanti di cestodi dei gatti. Esso include specificamente tutte le *Taenia species* che infestano i gatti, *Multiceps multiceps*, *Joyeuxiella pasqualei*, *Dipylidium caninum*, *Mesocostoides spp.*, *Echinococcus granulosus* e *Echinococcus multilocularis*. Il praziquantel è efficace contro tutti gli stadi intestinali di questi parassiti presenti nei gatti.

5. CONTROINDICAZIONI

Gatti di peso inferiore a 1 kg, in quanto i tubetti non sono idonei a dispensare dosaggi adatti a gatti inferiori a 1 kg di peso corporeo.

Non usare in caso di ipersensibilità al principio attivo o ad uno qualsiasi degli eccipienti.

6. REAZIONI AVVERSE

Occasionalmente può essere osservata in sede di applicazione una reazione locale successiva al trattamento, come dermatite, desquamazione o lieve presenza di essudato, perdita di pelo, ipersensibilità. Il prodotto è di sapore amaro e occasionalmente si può presentare salivazione e vomito se il gatto lecca il sito di applicazione immediatamente dopo il trattamento. Tale effetto non è un segno di intossicazione e scompare poco dopo, senza trattamento.

Se dovessero manifestarsi reazioni avverse gravi o altre reazioni non menzionate in questo foglietto illustrativo, si prega di informare il veterinario.

7. SPECIE DI DESTINAZIONE

Gatti


8. POSOLOGIA PER CIASCUNA SPECIE, VIA(E) E MODALITÀ DI SOMMINISTRAZIONE

Il dosaggio minimo raccomandato è di 8 mg di praziquantel/kg di peso corporeo. Tale dosaggio corrisponde a 1 tubetto per 2,5 kg di peso corporeo.


Peso corporeo	n° tubetti
1 - 2,5 kg	1
> 2,5 - 5 kg	2
> 5 kg	3

Somministrazione cutanea (spot-on).

La soluzione viene somministrata mediante il tubetto, che rende l'applicazione facile e sicura. Togliere un tubetto dalla confezione. Tenere il tubetto in posizione verticale, svitare e togliere il tappo. Usare il tappo rovesciato per ruotare e togliere il sigillo dal tubetto.



Con due dita, scostare il pelo sulla parte posteriore del collo, immediatamente dietro la testa, in modo da rendere visibile la cute (vedi figura). Tenendo il tubetto in posizione verticale, appoggiarne la punta sulla cute e, premendo più volte, applicare tutto il contenuto sulla zona interessata. È particolarmente importante applicare la dose su una zona che l'animale non possa leccare.



Unico trattamento.

9. AVVERTENZE PER UNA CORRETTA SOMMINISTRAZIONE

10 PARTICOLARI PRECAUZIONI PER LA CONSERVAZIONE

Non utilizzare dopo la data di scadenza riportata sulla pipetta

Dopo l'apertura del blister conservare la pipetta non utilizzata al riparo dalla luce.

11. AVVERTENZA(E) SPECIALE(I)

Avvertenze speciali per ciascuna specie di destinazione

Nell'ambiente domestico, evitare che il gatto trattato o altri gatti leccino la zona di applicazione dopo il trattamento. Se ciò dovesse avvenire subito dopo l'applicazione, dal momento che il prodotto è di sapore amaro, potrebbe occasionalmente verificarsi salivazione. Questo non è un segno di intossicazione e scompare spontaneamente poco dopo, senza trattamento. Evitare che l'animale appena trattato venga a contatto con bambini.

Precauzioni speciali per l'impiego negli animali

Solo per uso esterno.

Droncit® Spot-on può essere irritante per gli occhi. Prestare attenzione per evitare che il contenuto del tubetto venga in contatto con gli occhi dell'animale oggetto del trattamento. In caso di contatto accidentale sciacquare abbondantemente con acqua.

Precauzioni speciali che devono essere adottate dalla persona che somministra il prodotto agli animali

Studi di laboratorio su conigli e ratti con l'eccipiente N-metil pirrolidone hanno evidenziato effetti fetotossici. Il medicinale veterinario non deve essere somministrato da donne in gravidanza e da donne che sospettano di essere in gravidanza. Le donne in età fertile devono indossare dispositivi di protezione individuale, come guanti, durante la manipolazione del medicinale veterinario.

Droncit® Spot-on può essere irritante per la cute e per gli occhi. Durante il trattamento indossare guanti e occhiali.

Evitare il contatto con la cute. In caso di contaminazione accidentale, lavare con acqua e sapone.

Lavarsi le mani accuratamente dopo l'uso. Evitare assolutamente qualsiasi contatto della soluzione con gli occhi.

In caso di contatto accidentale con gli occhi, sciacquare abbondantemente con acqua. Se l'irritazione oculare o cutanea dovesse persistere, rivolgersi ad un medico.

Non mangiare, bere o fumare durante l'applicazione. Non ingerire. In caso di ingestione accidentale, rivolgersi immediatamente ad un medico mostrandogli il foglietto illustrativo o l'etichetta.

Impiego durante la gravidanza o l'allattamento

La sicurezza del medicinale veterinario nei gatti durante la gravidanza e l'allattamento o negli animali destinati alla riproduzione non è stata stabilita. Studi di laboratorio su conigli e ratti con l'eccipiente N-metil pirrolidone hanno evidenziato effetti fetotossici. Usare solo conformemente alla valutazione del rapporto beneficio-rischio del veterinario responsabile.

Interazione con altri medicinali veterinari ed altre forme d'interazione

Non somministrare contemporaneamente ad altri farmaci.

Sovradosaggio (sintomi, procedure d'emergenza, antidoti) se necessario

Il sovradosaggio può portare a lievi reazioni cutanee che scompaiono spontaneamente in pochi giorni.

Incompatibilità

Non note.

12. PRECAUZIONI PARTICOLARI DA PRENDERE PER LO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO NON UTILIZZATO O DEGLI EVENTUALI RIFIUTI

Tutti i medicinali veterinari non utilizzati o i rifiuti derivati da tali medicinali devono essere smaltiti in conformità alle disposizioni di legge locali e conferiti negli idonei sistemi di raccolta e di smaltimento per i medicinali non utilizzati o scaduti.

13 DATA DELL'ULTIMA REVISIONE DEL FOGLIETTO ILLUSTRATIVO

02/2024

14. ALTRE INFORMAZIONI

- Efficacia con un solo trattamento
- Comprovata efficacia contro le forme mature e immature di *Dipylidium caninum* e *Taenia* spp.
- Con sistema di applicazione moderno, facile e sicuro
- Ottimo profilo tossicologico

Gruppo farmacoterapeutico: derivato pirazinoisochinolinico, con attività antelmintica.

Codice ATCvet: QP52 AA 01

Proprietà farmacodinamiche

Lo spettro d'azione del praziquantel copre tutte le specie importanti di cestodi dei gatti. Esso include specificamente tutte le *Taenia species* che infestano i gatti, *Multiceps multiceps*, *Joyeuxiella pasqualei*, *Dipylidium caninum*, *Mesocostoides spp.*, *Echinococcus granulosus* e *Echinococcus multilocularis*. Il praziquantel è efficace contro tutti gli stadi intestinali di questi parassiti presenti nei gatti.

Informazioni farmacocinetiche

Il praziquantel viene rapidamente assorbito attraverso la superficie dei parassiti e si distribuisce uniformemente nel parassita stesso. Sia in vitro che in vivo si verifica molto rapidamente un grave danno del tegumento del parassita, che si traduce nella paralisi degli stessi parassiti. In particolare, la base di questa rapida insorgenza d'azione è il cambiamento di permeabilità delle membrane del parassita al Ca^{++} innescato dal praziquantel; ciò provoca un'alterazione del metabolismo del parassita conducendo alla morte di quest'ultimo.

Dopo somministrazione orale a ratti, cani, scimmie, pecore e nell'uomo, il praziquantel viene assorbito molto rapidamente e pressoché completamente nello stomaco e nell'intestino tenue. Anche la somministrazione parenterale (s.c. e i.m.) si è dimostrata efficace in cani e gatti. È stato dimostrato che l'applicazione cutanea produce livelli ematici efficaci nel gatto. In funzione della forma di applicazione e della specie, il picco dei livelli serici viene raggiunto entro 0,3-2 ore. Il praziquantel si distribuisce molto rapidamente in tutti gli organi. I valori dell'emivita di eliminazione del praziquantel marcato con ^{14}C e dei suoi metaboliti sono compresi fra 2 e 3 ore nel ratto, nel cane, nella scimmia e nella pecora. Nell'uomo ed in tutte le specie animali citate, il praziquantel viene rapidamente metabolizzato nel fegato. Oltre a numerosi altri metaboliti, il metabolita principale presente in ciascun caso è il derivato 4-idrossicicloesilico del praziquantel.

Il praziquantel è completamente eliminato sotto forma di metaboliti. Dal 40 al 71% è escreto nelle urine e dal 13 al 30% passa tramite la bile nelle feci entro le 48 ore dopo il trattamento.

Confezioni

Scatola 4 tubetti da 0,5 ml

Scatola 40 tubetti da 0,5 ml

È possibile che non tutte le confezioni siano commercializzate.