

A. KENNZEICHNUNG

ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG UND ANGABEN AUF DEM BEHÄLTNIS**Plastikflasche 500ml****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Calcii Borogluconas

Lösung zur intravenösen Infusion für Rinder, Schafe und Pferde

Calcium gluconate injectio / Magnesium chloride hexahydrate

2. WIRKSTOFF(E)1 ml enthält:

Wirkstoffe:

Calciumgluconat zur Injektion 187 mg
Magnesiumchloridhexahydrat 60 mg**3. DARREICHUNGSFORM**

Lösung zur intravenösen Infusion.

4. PACKUNGSGRÖSSE

500 ml

5. ZIELTIERART(EN)

Rind, Schaf und Pferd.

6. ANWENDUNGSGEBIET(E)

Gebärparesse (Paresis puerperalis), akute und andauernde Hypokalzämie- und Hypomagnesiämiezustände bei Rind, Schaf und Pferd.

7. ART DER ANWENDUNG

Langsam intravenös verabreichen.

Rinder, Pferde, : 500 ml pro Tier.

Für leichtere Rassen und Schafe: 1 ml/kg Körpergewicht.

Bei Bedarf, nach 6 - 8 Stunden mit der gleichen Dosierung wiederholen.

Das Produkt ist für eine subkutane Verabreichung nicht geeignet.

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

8. WARTEZEIT(EN)

Null Tage.

9. BESONDERE WARNHINWEISE, SOWEIT ERFORDERLICH

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

10. VERFALLDATUM

EXP: {Monat/Jahr}

Nach Anbrechen der Flasche sofort verbrauchen

11. BESONDERE LAGERUNGSBEDINGUNGEN

Nicht über 25°C lagern. Vor Licht schützen.

12. BESONDERE VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DIE ENTSORGUNG VON NICHT VERWENDETEN ARZNEIMITTELN ODER VON ABFALLMATERIALIEN

Entsorgung: Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

13. VERMERK "FÜR TIERE" SOWIE BEDINGUNGEN ODER BESCHRÄNKUNGEN FÜR EINE SICHERE UND WIRKSAME ANWENDUNG DES TIERARZNEIMITTELS, SOFERN ZUTREFFEND

Für Tiere.

Verschreibungspflichtig.

14. KINDERWARNHINWEIS "ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN"

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

15. NAME UND ANSCHRIFT DES ZULASSUNGSHABERS

Dechra Veterinary Products

Achterstenhoek 48

2275 Lille, Belgien

16. ZULASSUNGSNR(N)

BE-V162784

17. CHARGENBEZEICHNUNG DES HERSTELLERS

Lot: {Nummer}