

RIASSUNTO DELLE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE VETERINARIO

Fiprotec Spray 2,5 mg/ml Spray cutaneo, soluzione per Cani e Gatti

2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA

Ogni ml di soluzione contiene:

Principio attivo:

Fipronil 2,5 mg

Eccipienti:

Per l'elenco completo degli eccipienti, vedere paragrafo 6.1.

3. FORMA FARMACEUTICA

Spray cutaneo, soluzione
Liquido limpido, incolore

4. INFORMAZIONI CLINICHE

4.1 Specie di destinazione

Cani e gatti

4.2 Indicazioni per l'utilizzazione, specificando le specie di destinazione

Trattamento e prevenzione delle infestazioni da pulci (*Ctenocephalides* spp.) e zecche (*Ixodes* spp., compresa *Ixodes ricinus*) in cani e gatti.

Trattamento delle infestazioni da pidocchi masticatori nel cane (*Trichodectes canis*) e nel gatto (*Felicola subrostratus*).

Il prodotto, a seconda del livello di carica ambientale, ha un'efficacia insetticida persistente contro le pulci adulte fino a 2 mesi nel gatto e fino a 3 mesi nel cane ed un'efficacia acaricida contro le zecche fino ad un mese.

4.3 Controindicazioni

Non utilizzare su animali malati (malattie sistemiche, febbre...) o convalescenti

Non usare nei conigli, poiché possono verificarsi reazioni avverse e persino la morte.

Non usare in caso di ipersensibilità al principio attivo o a uno qualsiasi degli eccipienti.

4.4 Avvertenze speciali per ciascuna specie di destinazione

Non superare il dosaggio consigliato.

Evitare il contatto con gli occhi dell'animale. In caso di contatto accidentale con gli occhi sciacquare immediatamente e accuratamente gli occhi con acqua.

Non spruzzare direttamente sulla cute irritata.

Lasciate asciugare gli animali trattati in una stanza ben ventilata (vedere anche paragrafo 4.5).

Non chiudere gli animali in un luogo chiuso o nel trasportino fino a quando il mantello non sia completamente asciutto.

In assenza di dati specifici sull'efficacia e sulla tolleranza, il prodotto non è consigliato per il trattamento di specie diverse da cani e gatti.

Per un'efficacia ottimale, non è raccomandato il bagno o lo shampoo agli animali nei due giorni precedenti il trattamento e nei due giorni successivi al trattamento. È stato dimostrato che un bagno o uno shampoo effettuato fino a quattro volte in due mesi, non ha effetti significativi sull'efficacia residua del prodotto. Si raccomanda il trattamento mensile, se lo shampoo viene fatto più frequentemente.

Per un controllo ottimale delle infestazioni da pulci negli ambienti domestici con più animali, tutti i cani e gatti di presenti nell'abitazione devono essere trattati con un apposito insetticida.

Le pulci presenti sugli animali domestici spesso infestano la cuccia dell'animale, i letti e le aree abituali di riposo, come i tappeti ed i tessuti d'arredo. Questi, in caso di infestazioni massive e all'inizio del trattamento antiparassitario, devono essere trattati con un insetticida apposito e regolarmente ripuliti con un aspirapolvere.

Il prodotto non è adatto per il trattamento diretto dell'ambiente.

Considerato il volume erogato dalla pompetta dello spray (0,5 ml/spruzzo), il prodotto è estremamente adatto ad essere usato su cani e gatti con un peso corporeo fino a 5-10 kg, a seconda della lunghezza del pelo (vedere anche il paragrafo 4.9), ma non idoneo per cani di media e grossa taglia.

4.5 Precauzioni speciali per l'impiego

Precauzioni speciali per l'impiego negli animali

È importante assicurarsi che gli animali non si lecchino dopo il trattamento.

Può verificarsi l'adesione di singole zecche. Per questo motivo non è possibile escludere completamente la trasmissione di malattie infettive in presenza di condizioni sfavorevoli.

Gli animali sottoposti al trattamento devono essere tenuti lontani dalle fiamme o altre fonti di calore e da superfici che potrebbero essere facilmente interessate dallo spruzzo a base alcolica, per almeno 30 minuti dopo l'applicazione e fino a quando il pelo non è completamente asciutto. Non spruzzare su fiamma viva o su materiale incandescente. Solo per uso esterno.

Precauzioni speciali che devono essere adottate dalla persona che somministra il medicinale veterinario agli animali

Questo prodotto può causare irritazione delle mucose e degli occhi. Pertanto, è necessario evitare il contatto del prodotto con bocca e occhi.

Le persone affette da asma o con ipersensibilità nota agli insetticidi o all'alcol devono evitare il contatto con il medicinale veterinario. Evitare che il contenuto venga a contatto con le dita. In questo caso, lavarsi le mani con acqua e sapone. In caso di irritazione, consultare un medico.

Dopo un'esposizione oculare accidentale, risciacquare accuratamente l'occhio con acqua corrente.

Non toccare gli animali e non far giocare i bambini con gli animali trattati fino a quando il sito di applicazione non sia asciutto. Si consiglia pertanto di non trattare gli animali durante il giorno, ma di trattarli alla sera e, se appena trattati, di non farli dormire con i proprietari, specialmente se si tratta di bambini.

Spruzzare sugli animali all'aperto o in una stanza ben ventilata.

Non inalare lo spray. Non fumare, bere o mangiare durante l'applicazione.

Indossare guanti in nitrile o in PVC durante il trattamento degli animali. Si raccomanda di indossare un grembiule impermeabile per la protezione dei vestiti.

Togliere i vestiti e lavarli prima del riutilizzo, se dovessero rimanere impregnati del prodotto.

Smaltire i guanti dopo l'uso e quindi lavarsi le mani con acqua e sapone.

Trattamento di più animali: una buona ventilazione è particolarmente importante qualora sia necessario trattare più animali contemporaneamente. Trattare gli animali all'esterno oppure ridurre la formazione di vapore spostando gli animali dal luogo di trattamento mentre l'alcol sta evaporando e assicurarsi che ci sia ricambio d'aria tra un trattamento e l'altro. Inoltre, assicurarsi che il luogo di asciugatura sia ben areato ed evitare di confinare più animali appena trattati all'interno dello stesso spazio.

Altre precauzioni

Il fipronil può avere effetti negativi sugli organismi acquatici.

Non permettere ai cani di nuotare nei corsi d'acqua per 2 giorni dopo l'applicazione (vedere paragrafo 6.6).

4.6 Reazioni avverse (frequenza e gravità)

Qualora l'animale si lecchi, si può osservare un breve periodo di ipersalivazione dovuto principalmente alla natura degli eccipienti.

Dopo l'applicazione, tra le reazioni avverse sospette estremamente rare, sono state segnalate reazioni cutanee transitorie, eritema, prurito o alopecia.

Sono inoltre stati eccezionalmente riscontrati scialorrea, sintomi neurologici reversibili (iperestesia, depressione, sintomi nervosi), vomito o sintomi respiratori.

4.7 Impiego durante la gravidanza, l'allattamento o l'ovodeposizione

Gli studi di laboratorio non hanno evidenziato l'esistenza di effetti teratogeni del fipronil nel ratto e nel coniglio.

La formulazione è molto ben tollerata dai cuccioli durante l'allattamento dopo il trattamento della cagna.

Non sono disponibili i dati sul trattamento delle gatte gravide o di quelle che allattano.

4.8 Interazione con altri medicinali e altre forme di interazione

Non usare contemporaneamente con altri prodotti antipulci applicati direttamente sull'animale.

4.9 Posologia e via di somministrazione

Via di somministrazione: pompetta spray per uso esterno.

Metodo di somministrazione:

Spruzzare sull'intero corpo dell'animale, da una distanza di circa 10-20 cm.

Applicare nel senso contrario alla direzione del pelo e assicurarsi che tutto il mantello dell'animale sia inumidito. Arruffare il pelo, specialmente negli animali a pelo lungo, affinché il prodotto penetri fino alla cute.

Per il trattamento della zona della testa, e nel caso di animali giovani e vivaci, è possibile eseguire l'applicazione spruzzando il prodotto su una mano, protetta da un guanto, e strofinarlo nel pelo. Lasciare che asciughi in modo naturale. Non usare asciugamani.

Posologia: è importante inumidire tutto il pelo per consentire al prodotto il raggiungimento della cute. A seconda della lunghezza del pelo, applicare da 3 a 6 ml per kg di peso corporeo, (da 7,5 a 15 mg di principio attivo per kg di peso corporeo) cioè da 6 a 12 spruzzi per kg di peso corporeo della confezione da 100 ml.

Il flacone da 100 ml contiene:

- Circa 3-6 trattamenti per un cane che pesa 5 kg, a seconda della lunghezza del pelo;
- Circa 8 trattamenti per un gatto con pelo corto e con un peso di 4 kg;
- Circa 2 trattamenti per un cane con pelo lungo e con un peso di 8 kg.

Proprietà: La formulazione contiene una sostanza di rivestimento. Pertanto, la spruzzatura crea una pellicola che rende il mantello lucido.

In assenza di studi sulla sicurezza, l'intervallo minimo di trattamento è di 4 settimane.

Possono essere trattati anche cuccioli e gattini di 2 giorni di età.

4.10 Sovradosaggio (sintomi, procedure d'emergenza, antidoti), se necessario

Il rischio di insorgenza di eventi avversi (vedi paragrafo 4.6) può aumentare in caso di sovradosaggio. Pertanto gli animali devono essere sempre trattati con la dose corretta secondo il peso corporeo.

Iniziare un trattamento sintomatico appropriato in caso di sovradosaggio.

4.11 Tempo(i) di attesa

Non pertinente.

5. PROPRIETÀ FARMACOLOGICHE

Gruppo farmacoterapeutico: ectoparassitocidi per uso topico, compresi gli insetticidi.
Codice ATCvet: QP53AX15.

5.1 Proprietà farmacodinamiche

Il fipronil è un insetticida ed acaricida della famiglia dei fenilpirazoli. Agisce inibendo il complesso GABA, legandosi al canale del cloro e bloccando di conseguenza il trasferimento pre-sinaptico e post-sinaptico degli ioni del cloro attraverso la membrana. Ciò determina un'attività incontrollata del sistema nervoso centrale e la morte di insetti e acari.

Il fipronil mostra attività insetticida e acaricida contro pulci (*Ctenocephalides* spp., zecche (*Ixodes* spp.) e pidocchi (*Trichodectes canis* e *Felicola subrostratus*) in cani e gatti.

5.2 Informazioni farmacocinetiche

Assorbimento

La quantità di fipronil assorbita dalla cute del cane dopo l'applicazione dello spray sul pelo e sulla pelle è estremamente scarsa o trascurabile.

Distribuzione

Il fipronil persiste sul pelo per molto tempo (in media $52,5 \pm 11,5$ giorni), considerando che il limite di quantificazione del metodo di dosaggio è $0,25 \mu\text{g/g}$.

Questo è dovuto al fatto che il fipronil si scioglie bene nel grasso e si concentra nelle ghiandole sebacee. Dalle ghiandole sebacee (deposito) la quantità di fipronil viene costantemente rilasciata a livello cutaneo.

Biotrasformazione

In tutte le specie il fipronil è metabolizzato prevalentemente nel relativo derivato solfonico (RM1602), che possiede anche proprietà insetticide e acaricide.

Il RM1602 rilevato sul pelo dopo l'applicazione a spruzzo nei cani può essere spiegato con la sua presenza nella materia prima originale.

6. INFORMAZIONI FARMACEUTICHE

6.1 Elenco degli eccipienti

Copovidone K28
Alcool isopropilico
Acqua purificata

6.2 Incompatibilità principali

In assenza di studi di compatibilità, questo medicinale veterinario non deve essere miscelato con altri medicinali veterinari.

6.3 Periodo di validità

Periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 3 anni.
Periodo di validità dopo prima apertura del confezionamento primario: 1 anno.

6.4. Speciali precauzioni per la conservazione

Altamente infiammabile.

Non conservare a temperatura superiore ai 25 °C.

6.5 Natura e composizione del confezionamento primario

Un flacone da 100 ml in polietilene ad alta densità, provvisto di una pompa a spruzzo che eroga 0,5 ml per spruzzo (tubo pescante in polietilene a bassa densità).

6.6 Precauzioni particolari da prendere per lo smaltimento del medicinale veterinario non utilizzato e dei rifiuti derivanti dal suo utilizzo

Il medicinale veterinario non utilizzato o i rifiuti derivati da tale medicinale veterinario devono essere smaltiti in conformità alle disposizioni di legge locali.

Il fipronil può avere effetti negativi sugli organismi acquatici. Non contaminare stagni, corsi d'acqua o fossati con il prodotto o i contenitori vuoti.

7. TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO

Beaphar B.V.

Drostenkamp 3

8101 BX, Raalte

Paesi Bassi

Tel: + 31 (0) 572 348 834

Fax: + 31 (0) 572 348 835

E-mail: hqb@beaphar.com

8. NUMERO(I) DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO

Flacone da 100 ml AIC n.105056016

9. DATA DELLA PRIMA AUTORIZZAZIONE/RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE

Data della prima autorizzazione: {GG/MM/AAAA}.

10 DATA DI REVISIONE DEL TESTO

DIVIETO DI VENDITA, FORNITURA E/O IMPIEGO

Non pertinente.

Solo per uso veterinario.

La vendita non è riservata esclusivamente alle farmacie e non è sottoposta all'obbligo di ricetta medico veterinaria

Sono inoltre stati eccezionalmente riscontrati scialorrea, sintomi neurologici reversibili (iperestesia, depressione, sintomi nervosi), vomito o sintomi respiratori.

Se dovessero manifestarsi effetti collaterali, anche quelli non già menzionati in questo foglietto illustrativo o se si ritiene che il medicinale non abbia funzionato, si prega di informarne il medico veterinario.

7. SPECIE DI DESTINAZIONE

Cani e gatti

8. POSOLOGIA PER CIASCUNA SPECIE, VIA(E) E MODALITÀ DI SOMMINISTRAZIONE

Via di somministrazione: pompa spray per uso esterno.

Dosaggio: È importante inumidire il pelo fino a raggiungere la cute. A seconda della lunghezza del pelo, applicare da 3 a 6 ml per kg di peso corporeo, (da 7,5 a 15 mg di principio attivo per kg di peso corporeo) cioè da 6 a 12 applicazioni a spruzzo per kg di peso corporeo della confezione da 100 ml.

Il flacone da 100 ml contiene:

- Circa 3-6 trattamenti per un cane che pesa 5 kg, a seconda della lunghezza del pelo;
- Circa 8 trattamenti per un gatto con pelo corto e con un peso di 4 kg;
- Circa 2 trattamenti per un cane con pelo lungo e con un peso di 8 kg.

Proprietà: La formulazione contiene una sostanza di rivestimento. Pertanto, la spruzzatura crea una pellicola che rende il mantello lucido.

In assenza di studi sulla sicurezza, l'intervallo minimo di trattamento è di 4 settimane.

9. AVVERTENZE PER UNA CORRETTA SOMMINISTRAZIONE

Metodo di somministrazione:

spruzzare sull'intero corpo dell'animale e applicare da una distanza di circa 10-20 cm.

Applicare nel senso contrario alla direzione del pelo e assicurarsi che tutto il mantello dell'animale sia inumidito. Arruffare il pelo, specialmente negli animali a pelo lungo, affinché il prodotto penetri fino alla pelle.

Per il trattamento della zona della testa, e nel caso di animali giovani e vivaci, è possibile eseguire l'applicazione spruzzando il prodotto su una mano, protetta da un guanto, e strofinarlo nel pelo. Lasciare che asciughi in modo naturale. Non usare asciugamani.

Possono essere trattati anche cuccioli e gattini di 2 giorni di età.

10. TEMPO(I) DI ATTESA

Non pertinente.

11. PARTICOLARI PRECAUZIONI PER LA CONSERVAZIONE

Tenere fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

Altamente infiammabile.

Non conservare a temperatura superiore ai 25 °C.

Non usare questo medicinale veterinario dopo la data di scadenza riportata sul flacone.

Periodo di validità dopo la prima apertura del contenitore: 1 anno.

La data di smaltimento (1 anno dopo l'apertura) deve essere registrata. La quantità di prodotto rimanente dopo tale data deve essere eliminata.

12. AVVERTENZA(E) SPECIALE(I)

Avvertenze speciali per ciascuna specie di destinazione:

Non superare il dosaggio consigliato.

Evitare il contatto con gli occhi dell'animale.

Non spruzzare direttamente sulla cute irritata.

Lasciate asciugare gli animali trattati in una stanza ben ventilata (vedere anche paragrafo 4.5).

Non rinchiodare gli animali in un luogo chiuso o nel trasportino fino a quando il mantello non sia completamente asciutto.

In assenza di dati specifici sull'efficacia e sulla tolleranza, il prodotto non è consigliato per il trattamento di specie diverse da cani e gatti.

Per un'efficacia ottimale, non è raccomandato il bagno o lo shampoo agli animali nei due giorni precedenti il trattamento e nei due giorni successivi al trattamento. È stato dimostrato che un bagno o uno shampoo effettuato fino a quattro volte in due mesi, non ha effetti significativi sull'efficacia residua del prodotto. Si raccomanda il trattamento mensile, se lo shampoo viene fatto più frequentemente.

Per un controllo ottimale delle infestazioni da pulci negli ambienti domestici con più animali, tutti i cani e gatti di presenti nell'abitazione devono essere trattati con un apposito insetticida.

Le pulci presenti sugli animali domestici spesso infestano la cuccia dell'animale, i letti e le aree abituali di riposo, come i tappeti ed i tessuti d'arredo. Questi, in caso di infestazioni massive e all'inizio del trattamento antiparassitario, devono essere trattati con un insetticida apposito e regolarmente ripuliti con un aspirapolvere.

Il prodotto non è adatto per il trattamento diretto dell'ambiente.

Considerato il volume erogato dalla pompetta dello spray (0,5 ml/spruzzo) il prodotto è estremamente adatto ad essere usato su cani e gatti con un peso corporeo fino a 5-10 kg, a seconda della lunghezza del pelo (vedere anche il paragrafo 8) ma non idoneo per cani di media e grossa taglia.

Precauzioni speciali per l'impiego negli animali:

È importante assicurarsi che gli animali non si leccino l'un l'altro dopo il trattamento.

Può verificarsi l'adesione di singole zecche. Per questo motivo non è possibile escludere completamente la trasmissione di malattie infettive in presenza di condizioni sfavorevoli.

Gli animali sottoposti al trattamento devono essere tenuti lontani dalle fiamme o altre fonti di calore e da superfici che potrebbero essere facilmente interessate dallo spruzzo a base alcolica, per almeno 30 minuti dopo l'applicazione e fino a quando il pelo non è completamente asciutto. Non spruzzare su fiamma viva o su materiale incandescente.

Solo per uso esterno.

Precauzioni speciali che devono essere adottate dalla persona che somministra il medicinale veterinario agli animali:

Questo prodotto può causare irritazione delle mucose e degli occhi. Pertanto, è necessario evitare il contatto del prodotto con bocca e occhi.

Le persone affette da asma o con ipersensibilità (allergia) nota agli insetticidi o all'alcol devono evitare il contatto con il medicinale veterinario. Evitare che il contenuto venga a contatto con le dita. In questo caso, lavarsi le mani con acqua e sapone. In caso di irritazione, consultare un medico.

Dopo un'esposizione oculare accidentale, risciacquare accuratamente l'occhio con acqua corrente.

Non toccare gli animali e non far giocare i bambini con gli animali trattati fino a quando il sito di applicazione non sia asciutto. Si consiglia pertanto di non trattare gli animali durante il giorno, ma di trattarli alla sera e, se appena trattati, di non farli dormire con i proprietari, specialmente se si tratta di bambini.

Spruzzare sugli animali all'aperto o in una stanza ben ventilata.

Non inalare lo spray. Non fumare, bere o mangiare durante l'applicazione.

Indossare guanti in nitrile o in PVC durante il trattamento degli animali. Si raccomanda di indossare un grembiule impermeabile per la protezione dei vestiti.

Togliere i vestiti e lavarli prima del riutilizzo, se dovessero rimanere impregnati del prodotto.

Smaltire i guanti dopo l'uso e quindi lavarsi le mani con acqua e sapone.

Trattamento di più animali: una buona ventilazione è particolarmente importante qualora sia necessario trattare più animali contemporaneamente. Trattare gli animali all'esterno oppure ridurre la formazione di vapore spostando gli animali dal luogo di trattamento mentre l'alcol sta evaporando e assicurarsi che ci sia ricambio d'aria tra un trattamento e l'altro. Inoltre, assicurarsi che il luogo di asciugatura sia ben areato ed evitare di confinare più animali appena trattati all'interno dello stesso spazio.

Altre precauzioni:

Il fipronil può avere effetti negativi sugli organismi acquatici.

Non permettere ai cani di nuotare nei corsi d'acqua per 2 giorni dopo l'applicazione.

Gravidanza, allattamento e ovodeposizione:

Lo spray è sicuro per l'uso sulle cagne che allattano.

Non utilizzare su cagne e gatte gravide o su gatte che allattano.

Interazione con altri medicinali e altre forme di interazione:

Non usare contemporaneamente con altri prodotti antipulci applicati direttamente sull'animale.

Sovradosaggio (sintomi, procedure d'emergenza, antidoti):

Il rischio di insorgenza di effetti negativi può aumentare per sovradosaggio; pertanto gli animali devono essere sempre trattati con la dose corretta secondo il peso corporeo.

In caso di sovradosaggio, è responsabilità del veterinario iniziare il trattamento sintomatico corretto.

Incompatibilità:

In assenza di studi di compatibilità, questo medicinale veterinario non deve essere miscelato con altri medicinali veterinari.

13. PRECAUZIONI PARTICOLARI DA PRENDERE PER LO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO NON UTILIZZATO O DEGLI EVENTUALI RIFIUTI

Il medicinale veterinario non utilizzato o i rifiuti derivati da tale medicinale veterinario devono essere smaltiti in conformità alle disposizioni di legge locali.

Il fipronil può avere effetti negativi sugli organismi acquatici. Non contaminare stagni, corsi d'acqua o fossati con il prodotto o i contenitori vuoti.

14. DATA DELL'ULTIMA REVISIONE DEL FOGLIETTO ILLUSTRATIVO

15. ALTRE INFORMAZIONI

Flacone da 100 ml

Solo per uso veterinario.

La vendita non è riservata esclusivamente alle farmacie e non è sottoposta all'obbligo di ricetta medico veterinaria

INFORMAZIONI DA APPORRE SUL CONFEZIONAMENTO PRIMARIO

Flacone in HDPE (100 ml)

1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE VETERINARIO

Fiprotec Spray 2.5 mg/ml Spray cutaneo, soluzione
Fipronil

2. INDICAZIONI DEI PRINCIPI ATTIVI

Fipronil 2,5 mg/ml

3. FORMA FARMACEUTICA

Spray cutaneo, soluzione

4. CONFEZIONI

100 ml

5. SPECIE DI DESTINAZIONE

Cani e gatti

6. INDICAZIONE(I)

Trattamento e prevenzione delle infestazioni da pulci (*Ctenocephalides* spp.) e zecche (*Ixodes* spp., compresa *Ixodes ricinus*) nel cane e nel gatto.

Trattamento delle infestazioni da pidocchi masticatori nel cane (*Trichodectes canis*) e nel gatto (*Felicola subrostratus*).

Il prodotto, a seconda del livello di carica ambientale, ha un'efficacia insetticida persistente contro le pulci adulte fino a 2 mesi nel gatto e fino a 3 mesi nel cane ed un'efficacia acaricida contro le zecche fino ad un mese.

7. MODALITÀ E VIA(E) DI SOMMINISTRAZIONE

Prima dell'uso leggere il foglietto illustrativo.

Applicare da 3 a 6 ml per kg di peso corporeo. Il flacone da 100 ml contiene:

- Circa 3-6 trattamenti per un cane che pesa 5 kg, a seconda della lunghezza del pelo;
- Circa 8 trattamenti per un gatto con pelo corto e con un peso di 4 kg;
- Circa 2 trattamenti per un cane con pelo lungo e con un peso di 8 kg.
- Da 2 giorni di età

8. TEMPO(I) DI ATTESA

9. SE NECESSARIO, AVVERTENZA(E) SPECIALE(I)

Prima dell'uso leggere il foglietto illustrativo.

10. DATA DI SCADENZA

SCAD {GG/MM/AA}

Dopo l'apertura usare entro 1 anno.

11. PRECAUZIONI PARTICOLARI PER LA CONSERVAZIONE

Altamente infiammabile.

Non conservare a temperatura superiore ai 25 °C.

12. OVE NECESSARIO, PRECAUZIONI PARTICOLARI DA PRENDERE PER LO SMALTIMENTO DEI MEDICINALI NON UTILIZZATI O DEI RIFIUTI

Smaltimento: leggere il foglietto illustrativo.

13. LA SCRITTA "SOLO PER USO VETERINARIO" E CONDIZIONI O LIMITAZIONI RELATIVE A FORNITURA ED IMPIEGO, SE PERTINENTE

Solo per uso veterinario.

La vendita non è riservata esclusivamente alle farmacie e non è sottoposta all'obbligo di ricetta medico veterinaria

14. LA SCRITTA "TENERE FUORI DALLA VISTA E DALLA PORTATA DEI BAMBINI"

Tenere fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

15. NOME E INDIRIZZO DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio e responsabile del rilascio dei lotti

Beaphar B.V.
Drostenkamp 3
8101 BX, Raalte
Paesi Bassi

Produttore responsabile del rilascio dei lotti di fabbricazione:

Beaphar B.V.
Oude Linderteseweg9
8102 EV Raalte
Paesi Bassi

Distribuito da:

Pet Village srl, Via Stradello, 35,
48124 Madonna dell'Albero (RA), Italia

16. NUMERO(I) DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO)

Flacone da 100 ml A.I.C. 105056016

17. NUMERO DEL LOTTO DI FABBRICAZIONE

Lotto {numero}

Spazio per codice a barre a lettura ottica -D.M. 17/12/2007

