

KENNZEICHNUNG

ANGABEN AUF DER PRIMÄRVERPACKUNG: Behältnis

5, 10, 20, 60 oder 200 Liter undurchsichtige Hochdichtheitpolyäthylengefäße

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Bovidip 2% w/v Konzentrat zur Zitzentauchmittel oder Spray, Lösung für Kühen

Wirkstoff: 2% w/v Jod

2. WIRKSAME(R) BESTANDTEIL(E) UND SONSTIGE BESTANDTEILE

Wirkstoff: 2% w/v Jod

Pflegemittel: 10% w/v glycerol

3. DARREICHUNGSFORM

Konzentrat zur Zitzentauchmittel oder Spray, Lösung

4. PACKUNGSGRÖSSEN

5, 10, 20, 60 oder 200 Liter.

5. ZIELTIERART

(Milch)Kühen.

6. ANWENDUNGSGEBIET

Zitzendesinfektion als Teil der Strategie der Vorbeuge von Mastitis bei laktierenden MilchKühen.

7. ART DER ANWENDUNG

Vor dem Melken Zitzen mit Eutertüchern oder aber Euterpapier in Verbindung mit einer Reinigungslösung reinigen. Verdünnen Sie vor Gebrauch einen Teil der Bovidip 2% w/v Konzentrat zur Zitzentauchmittel oder Spray, Lösung mit drei Teilen sauberem Wasser. Verwende Sie 5 ml pro Kuh und Anwendung der verdünnte Produkt sofort nach dem Melken Dipp-anwendung: Dippen Sie die Zitzen mit der gebrauchsfertige Lösung direkt nach dem Melken. Tauchen Sie die volle Länge der Zitzen in den Becher. Sprühanwendung: Besprühen Sie die gesamte Oberfläche der Zitzen sofort nach dem Melken. Wenn nötig füllen sie den Dippbecher oder die Sprühflasche mit der gebrauchsfertigen Lösung auf. Gebrauchsfertige Lösung sollte innerhalb eines Tages verwendet werden.

8. WARTEZEIT

Essbares Gewebe: null Tage / Milch : null Studen.

9. BESONDERE WARNHINWEISE, SOWEIT ERFORDERLICH

Nicht mischen mit anderen Chemikalien. In Abwesenheit der Verein-barkeit Studien, das Produkt nicht mischen mit anderen Arzneimitteln. Nicht auf verletzten Zitzen verwenden; Behandlung unterbrechen, bis Verletzungen verheilt sind. Wenn Anzeichen einer Krankheit auftreten, Tierarzt konsultieren. Produkt auf der Zitzenhaut trocknen lassen, bevor das Euter Nässe oder aber Kälte ausgesetzt wird. Verwenden Sie kein verunreinigtes Produkt. Verwenden Sie immer einen sauberen, gereinigten Dippbecher oder Zitzen-sprühflasche. Das Tragen von Handschuhen während des Melkens und bei Anwendung des Produktes wird empfohlen, um die Haut zu schützen und um eine hygienische Milchgewinnung zu gewährleisten. Das Produkt kann während der Laktation und Trächtigkeit verwendet werden.

Nur für den äußerlichen Gebrauch. Vorsicht bei der Anwendung: Augenkontakt vermeiden. Im Fall eines Augenkontaktees die Augen mit ausreichend Wasser spülen und medizinischen Rat suchen. Im Fall einer Einnahme, große Mengen Wasser trinken und medizinischen Rat suchen. Bei Sprühanwendung, das Arbeiten im Sprühnebel vermeiden. Nach Gebrauch Hände waschen. Personen mit Jodallergie sollten bei der Anwendung Hand-schuhe und Maske tragen.

10. VERFALLDATUM

Chargenbezeichnung und Verfallsdatum: Siehe Etikett auf dem Gebinde.
EXP {MM/AAAA}. Nach erstmaligem Öffnen verwendbar bis 6 Monate.

11. BESONDERE LAGERUNGSBEDINGUNGEN

Im verschlossenen Original-gebinde aufrechtstehend aufbewahren. Nicht über 25°C lagern. Vor Licht schützen. Vor Frost schützen. Wenn das Produkt eingefroren ist, in einen warmen Raum verbringen, langsam auf-tauen lassen und vor Gebrauch mischen. Die größeren Gebindegrößen sollten ausreichend bewegt werden, um die Lösung zu mischen. Unter keinen Umständen sollten die 60 oder 200 L Gebinde geschüttelt werden.

12. BESONDERE VORSICHTSMAßNAHMEN FÜR DIE ENTSORGUNG VON NICHT VERWENDETEN ARZNEIMITTELN ODER VON ABFALLMATERIALIEN, SOFERN ERFORDERLICH

Nicht verwendete Tierarzneimittel oder davon stammende Abfallmaterialien sind entsprechend den nationalen Vorschriften zu entsorgen.

13. VERMERK "FÜR TIERE" SOWIE BEDINGUNGEN ODER BESCHRÄNKUNGEN FÜR EINE SICHERE UND WIRKSAME ANWENDUNG DES TIERARZNEIMITTELS, sofern erforderlich

Nur Für Tiere. Rezeptfrei.

**14. KINDERWARNHINWEIS "AUSSER REICH- UND SICHTWEITE VON
KINDERN AUFBEWAHREN"**

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

15. NAME UND ANSCHRIFT DES ZULASSUNGSHABERS

DeLaval N.V., Industriepark-Drongen 10, B 9031 Gent, België

16. ZULASSUNGSNUMMER(N)

BE-V339893

17. CHARGENBEZEICHNUNG DES HERSTELLERS

Chargenbezeichnung und Verfallsdatum: Siehe Etikett auf dem Gebinde.