

PODROBNÉ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

Papírová krabička se 3 pipetami

1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Frontline Combo roztok pro nakapání na kůži - spot-on pro kočky

2. OBSAH LÉČIVÝCH LÁTEK

Každá 0,5 ml pipeta obsahuje:

Fipronilum.....	50,00 mg
(S)-methoprenum	60,00 mg

3. VELIKOST BALENÍ

3 x 0,5 ml

4. CÍLOVÉ DRUHY ZVÍŘAT

Kočky

Fretky

5. INDIKACE

Hubí blechy u koček a brání opětovnému napadení po dobu 4 týdnů.

Brání vývoji vajíček blech, larev a kukel (po dobu 6 týdnů u koček), čímž brání kontaminaci prostředí po stejnou dobu.

Hubí klíšťata u koček a brání opětovnému napadení po dobu až 2 týdnů.

Hubí všenky u koček.

Lze použít u koček jako součást léčebné strategie při potlačení alergie na bleší kousnutí (FAD).
Brání kontaminaci prostředí ošetřených zvířat vývojovými stádii blech.

Hubí blechy u fretek a brání opětovnému napadení po dobu 4 týdnů.

Hubí klíšťata u fretek a brání opětovnému napadení po dobu 4 týdnů.

6. CESTY PODÁNÍ

Podání nakapáním na kůži – spot-on.

ZPŮSOB PODÁNÍ:

1. Vyjměte pipetu z obalu.
2. Držte pipetu ve svislé poloze. Poklepejte na zúženou část pipety a ujistěte se, že obsah zůstal v hlavní části pipety. Odlomte hrot.
3. Rozhrňte srst zvířete v oblasti báze krku před lopatkami, aby byla vidět kůže. Přiložte hrot pipety na kůži a několikrát stiskněte pipetu tak, aby se celý obsah vyprázdnil přímo na kůži v jednom místě.

[Informace o způsobu podání jsou viditelné na krabičce po jejím otevření.]

7. OCHRANNÉ LHŮTY

8. DATUM EXSPIRACE

Exp. {mm/rrrr}

9. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ
--

Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Uchovávejte v původním obalu.

10. OZNAČENÍ „PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE PŘÍBALOVOU INFORMACI“
--

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

11. OZNAČENÍ „POUZE PRO ZVÍŘATA“

Pouze pro zvířata.

12. OZNAČENÍ „UCHOVÁVEJTE MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ“
--

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

13. JMÉNO DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS

14. REGISTRAČNÍ ČÍSLO

96/028/03-C

15. ČÍSLO ŠARŽE

Lot {číslo}

PODROBNÉ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

Plastový blistr s 1 pipetou

1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Frontline Combo roztok pro nakapání na kůži - spot-on pro kočky

2. OBSAH LÉČIVÝCH LÁTEK

Každá 0,5 ml pipeta obsahuje:

Fipronilum	50,00 mg
(S)-methoprenum	60,00 mg

3. VELIKOST BALENÍ

0,5 ml

4. CÍLOVÉ DRUHY ZVÍŘAT

Kočky
Fretky

5. INDIKACE

Hubí blechy.
Hubí klíšťata.
Hubí všenky u koček.
Brání kontaminaci prostředí ošetřených zvířat vývojovými stádii blech.

6. CESTY PODÁNÍ

Podání nakapáním na kůži - spot on.

7. OCHRANNÉ LHŮTY**8. DATUM EXSPIRACE**

Exp. {mm/rrrr}

9. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Uchovávejte v původním obalu.

10. OZNAČENÍ „PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE PŘÍBALOVOU INFORMACI“

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

11. OZNAČENÍ „POUZE PRO ZVÍŘATA“

Pouze pro zvířata.

12. OZNAČENÍ „UCHOVÁVEJTE MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ“

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

13. JMÉNO DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS

14. REGISTRAČNÍ ČÍSLO

96/028/03-C

15. ČÍSLO ŠARŽE

Lot {číslo}

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU MALÉ VELIKOSTI**Pipeta****1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU**

FRONTLINE COMBO

[Piktogram kapky přípravku padající z pipety na kůži zvířete ukazující cestu podání]

2. KVANTITATIVNÍ ÚDAJE O LÉČIVÝCH LÁTKÁCH

0,5 ml

3. ČÍSLO ŠARŽE

Lot {číslo}

4. DATUM EXSPIRACE

Exp. {mm/rrrr}

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU MALÉ VELIKOSTI**Blistr se 3 pipetami****1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU**

FRONTLINE COMBO kočky

2. KVANTITATIVNÍ ÚDAJE O LÉČIVÝCH LÁTKÁCHFIPRONIL / (S)-METHOPRENE
50 mg / 60 mg**3. ČÍSLO ŠARŽE**

Lot {číslo}

4. DATUM EXSPIRACE

Exp. {mm/rrrr}