

ЛИСТОВКА

1. Наименование на ветеринарния лекарствен продукт

Адвентидж 40 mg разтвор за прилагане върху ограничен участък за котки и зайци домашни любимци (< 4 kg)

Адвентидж 80 mg разтвор за прилагане върху ограничен участък за котки и зайци домашни любимци (≥ 4 kg)

2. Състав

Всяка единична доза (пипета) съдържа:

Активни вещества:	Единична доза	Imidacloprid
Адвентидж 40 mg разтвор за прилагане върху ограничен участък за котки и зайци домашни любимци (< 4 kg)	0,4 ml	40 mg
Адвентидж 80 mg разтвор за прилагане върху ограничен участък за котки и зайци домашни любимци (≥ 4 kg)	0,8 ml	80 mg

Помощни вещества:	пипета 0,4 ml	пипета 0,8 ml
Бензилов алкохол (E1519)	332,8 mg	665,6 mg
Бутилхидрокситолуен (E321)	0,4 mg	0,8 mg

Бистър, жълт до леко кафеникав разтвор.

3. Видове животни, за които е предназначен ВЛП

Котки и зайци домашни любимци.



4. Показания за употреба

За профилактика и лечение на опаразитяване с бълхи при котки.

Продуктът може да бъде използван и като част от комплексно лечение на алергичен дерматит, причинен от бълхи.

За лечение на опаразитяване с бълхи (*Ctenocephalides felis*) при зайци домашни любимци.

5. Противопоказания

Да не се използва при неотбити котенца, ненавършили 8-седмична възраст.

Да не се използва при зайци, ненавършили 10-седмична възраст.

Да не се използва при свръхчувствителност към активното вещество или към някое от помощните вещества.

6. Специални предупреждения

Специални предупреждения:

Ненужната употреба на антипаразитни средства или употреба, която се отклонява от инструкциите посочени в КХП, може да увеличи вероятността от развитие на резистентност и да доведе до намалена ефикасност. Решението за използване на продукта трябва да се основава на определяне на видовете паразити и степента на опаразитеност или на риска от опаразитяване, обоснован от епидемиологичните особености за всяко отделно животно.

Трябва да се обмисли вероятността други животни в домакинството да са източник на повторно опаразитяване с бълхи и при необходимост да бъдат третирани с подходящ продукт.

От съществуващите какавиди в околната среда след 6 или повече седмици (в зависимост от климатичните условия) може да се развият възрастни бълхи. Поради това, понякога е необходимо лечението с ветеринарния лекарствен продукт да се комбинира с третиране на заобикалящата среда, насочено към прекъсване на жизнения цикъл на бълхите. Това може да доведе до много по-бързо намаляване на тяхната популация.

Ветеринарният лекарствен продукт остава ефикасен ако животното се намокри, например при проливен дъжд. Понякога се налага повторно третиране, поради нивото на опаразитеност на заобикалящата среда. В такива случаи третирайте повторно на интервали не по-къси от 1 седмица.

Бълхите от домашни любимци често заразяват леглото на животното, постелките и обичайните места за почивка, като килими и мека мебел. Поради това е необходимо те да бъдат обработвани в случай на масово опаразитяване и в началото на контролните мерки, и да се почистват редовно с прахосмукачка.

Специални предпазни мерки за безопасна употреба при видовете животни, за които е предназначен ВЛП:

Ветеринарният лекарствен продукт е за приложение върху ограничен участък и не трябва да се прилага перорално.

Да се прилага само върху здрава, ненаранена кожа.

Да не се позволява на скоро третирани животни да се почистват взаимно.

Преди прилагане на ветеринарния лекарствен продукт трябва да бъдат свалени всички каишки.

Преди поставяне на каишка трябва да се провери визуално мястото на третиране и да се установи, че е сухо.

Трябва да се внимава съдържанието на пипетата да не попадне в контакт с очите или устата на третираното животно.

Специални предпазни мерки, които трябва да вземе лицето, прилагащо ветеринарния лекарствен продукт на животните:

Този ветеринарен лекарствен продукт съдържа бензилов алкохол и може да причини кожна сенсibilизация или преходни кожни реакции в редки случаи (например дразнене, изтръпване). Хора с известна свръхчувствителност към imidacloprid и бензилов алкохол трябва да избягват контакт с ветеринарния лекарствен продукт.

Да се избягва контакт на ветеринарния лекарствен продукт с кожата, очите или устата. Да не се разтрива мястото на приложение.

Да не се яде, пие или пуши по време на прилагането.

При случайно разливане върху кожата, да се измие с вода и сапун.

При случайно попадане на ветеринарния лекарствен продукт в очите, те трябва да се измият обилно с вода.

Ако дразненето на кожата или очите продължава или при случайно поглъщане, незабавно да се потърси медицински съвет, като на лекаря се предостави листовката или етикета на продукта.

След прилагане не галете и не разресвайте животните, докато мястото на приложение не изсъхне.

След употреба, ръцете да се измиват старателно.

Други предпазни мерки:

Разтворителят в този продукт може да направи петна върху някои материали, като кожа, плат, пластмаса и лакирани повърхности. Мястото на третиране трябва да изсъхне, преди да допуснете животното да има контакт с подобни материали.

Бременност и лактация:

Лабораторните проучвания при плъхове и зайци не показват никакви доказателства за тератогенност, фетотоксичност, токсичност за майката. Изследванията при бременни и кърмещи домашни любимци и тяхното поколение са ограничени. Получените досега данни показват, че не би трябвало да се очакват неблагоприятни реакции при тези видове животни.

Взаимодействие с други ветеринарни лекарствени продукти и други форми на взаимодействие:

Не е наблюдавана несъвместимост на този продукт, прилаган в двойно по-голяма доза от препоръчаната с последващо прилагани обичайни ветеринарни лекарствени продукти: lufenuron, pyrantel и praziquantel (котки). Съвместимостта на продукта е била доказана също и с множество рутинни процедури, включително с ваксинация.

Предозиране:

Не се появяват неблагоприятни реакции при котки, когато се прилагат дози пет пъти по-високи от терапевтичното ниво седмично, в продължение на осем последователни седмици.

Не се появяват неблагоприятни реакции при зайци, когато се прилагат дози до 45 mg/kg телесна маса (четири пъти по-високи от терапевтичното ниво) седмично, в продължение на четири последователни седмици.

Малко вероятно е да се получи отравяне, в следствие на неволен перорален прием от животното. В такъв случай, лечението трябва да бъде симптоматично, под ветеринарномедицински контрол. Няма известен специфичен антидот, но прилагането на активен въглен може да бъде от полза.

7. Неблагоприятни реакции

Котки:

Много редки (по-малко от 1 на 10 000 третирани животни, включително изолирани съобщения):

Нарушения в мястото на приложение (напр. Загуба на козина, Сърбеж, Зачервяване на кожата, Кожна лезия)
--

Обща възбуда

Диария ¹ , Хиперсаливация ² , Повръщане ¹
--

Неврологични нарушения (напр. Депресия, Нарушена координация, Тремор)

¹Може да се появи след перорално поглъщане.

²Може да възникне, ако котката облизва мястото на приложение веднага след третиране, поради горчивия вкус. Това не е признак на интоксикация и изчезва за няколко минути без лечение.

Зайци:

Много редки (по-малко от 1 на 10 000 третирани животни, включително изолирани съобщения):
Нарушения в мястото на приложение (напр. Загуба на козина, Сърбеж, Зачервяване на кожата, Кожна лезия)
Обща възбуда
Диария ¹ , Хиперсаливация ²

¹Може да се появи след перорално поглъщане.

²Може да възникне, ако заека облизне мястото на приложение веднага след третиране, поради горчивия вкус. Това не е признак на интоксикация и изчезва за няколко минути без лечение.

Съобщаването на неблагоприятни реакции е важно. Това позволява непрекъснат мониторинг на безопасността на продукта. Ако забележите някакви неблагоприятни реакции, включително и такива, които не са описани в тази листовка или мислите, че ветеринарният лекарствен продукт не действа, свържете се първо с Вашия ветеринарен лекар. Можете също да съобщавате неблагоприятни реакции на притежателя на разрешението за търговия, като използвате данните за контакт в края на тази листовка или чрез Вашата национална система за съобщаване: {подробности за националната система}.

8. Дозировка за всеки вид животно, начини и метод на приложение

Прилагане върху ограничен участък.

За гарантиране на правилна дозировка телесната маса (т.м.) трябва да се определи възможно най-точно.

Препоръчителната минимална доза е 10 mg imidacloprid/kg телесна маса, еквивалентна на 0,1 ml от ветеринарният лекарствен продукт/kg телесна маса.

Телесна маса на котката/заека [kg]	Ветеринарен лекарствен продукт	Брой пипети	Imidacloprid (mg/kg т. м.)
< 4 kg	Адвентидж 40 mg за котки и зайци домашни любимци	1 x 0,4 ml	минимум 10 mg
≥ 4 kg	Адвентидж 80 mg за котки и зайци домашни любимци	1 x 0,8 ml	минимум 10 mg

За третиране на котки с телесна маса над 8 kg използвайте подходяща комбинация от пипети, за да приложите минимална доза от 10 mg imidacloprid/kg т.м.

Едно третиране предпазва от опаразитяване за период от 4 седмици при котките и до 1 седмица при зайците домашни любимци.

При опаразитяване с бълхи необходимостта и честотата на повторно(и) третиране(ия) трябва да се основават на професионален съвет и трябва да вземат предвид местната епидемиологична ситуация и начина на отглеждане на животното.

9. Съвети за правилното прилагане на продукта

Само за външна употреба.

Извадете една пипета от опаковката. Дръжте пипетата в изправено положение, завъртете и отстранете капачката. Използвайте обърнатата капачка, за да завъртите и премахнете запушалката на пипетата (виж илюстрация 1).


Начин на приложение при котки и зайци:

Разтворете козината на тила в основата на черепа, докато кожата стане видима. Поставете върха на пипетата близо до кожата и стиснете силно няколко пъти, за да изпразните цялото съдържание директно върху кожата (виж илюстрация 2: котки, илюстрация 3: зайци).


Илюстрациите са показани в края на листовката.

Прилагайте само върху здрава, ненаранена кожа.


Прилагането на продукта в основата на черепа намалява възможността животното да го погълне.



Илюстрация 1



Илюстрация 2



Илюстрация 3

10. Карентни срокове

Не се разрешава за употреба при зайци, предназначени за консумация от хора.

11. Специални условия за съхранение

Да се съхранява далеч от погледа и на недостъпни за деца места.

Този ветеринарен лекарствен продукт не изисква никакви специални условия за съхранение.

Срок на годност на крайния ветеринарен лекарствен продукт: 5 години.

Да се съхранява блистера във външната опаковка.

Да не се използва този ветеринарен лекарствен продукт след изтичане срока на годност, посочен върху кутията след Ехр. Срокът на годност отговаря на последния ден от този месец.

12. Специални предпазни мерки при унищожаване

Ветеринарните лекарствени продукти не трябва да бъдат изхвърляни чрез отпадни води или битови отпадъци.

Този ветеринарен лекарствен продукт не трябва да бъде изхвърлян във водни басейни, тъй като imidacloprid може да бъде опасен за риби и други водни организми.

Използвайте програми за връщане при унищожаването на неизползвани ветеринарни лекарствени продукти или остатъци от тях в съответствие с изискванията на местното законодателство и с всички приложими национални системи за събиране. Тези мерки ще помогнат за опазване на околната среда.

Попитайте Вашия ветеринарен лекар как да унищожите ненужни ветеринарни лекарствени продукти.

13. Класификация на ветеринарните лекарствени продукти

Да се отпуска без лекарско предписание.

14. Номера на разрешението за търговия и размери опаковки

Пипети от 0,4 ml: 0022-1451;

Пипети от 0,8 ml: 0022-1452.

Размери на опаковката:

Картонени опаковки, съдържащи 2, 3, 4 или 6 еднодозови пипети в блистери. Всяка еднодозова пипета съдържа 0,4 ml или 0,8 ml разтвор.

Не всички размери на опаковката могат да бъдат предлагани на пазара.

15. Дата на последната редакция на текста

05/2025

Подробна информация за този ветеринарен лекарствен продукт може да намерите в базата данни на Съюза относно продуктите (<https://medicines.health.europa.eu/veterinary>).

16. Данни за връзка

Притежател на разрешението за търговия и данни за връзка за съобщаване на предполагаеми неблагоприятни реакции:

Elanco Animal Health GmbH

Alfred-Nobel-Str. 50, 40789 Monheim, Германия

Тел: +48221047815

PV.BGR@elancoah.com

Производител, отговарящ за освобождаването на партиди:

KVP Pharma + Veterinär Produkte GmbH, Projensdorfer Str. 324, 24106 Kiel, Германия

21.5.2025 г.

X

Д-Р КРАСИМИР ЗЛАТКОВ

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ КВЛП

Signed by: KRASIMIR YANKOV ZLATKOV