

**MENTIONS DEVANT FIGURER SUR L'EMBALLAGE EXTÉRIEUR**  
**MENTIONS DEVANT FIGURER SUR LE CONDITIONNEMENT PRIMAIRE**

**Boîte en carton, Flacon pulvérisateur**

**1. NOM DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE**

Animedazon Spray, 2,45% g/g pulvérisateur cutanée, suspension

**2. COMPOSITION EN SUBSTANCES ACTIVES**

Un pulvérisateur contient :

**Substance active :**

Chlorhydrate de chlortétracycline 3,210g (équivalent à 2,45% g/g)  
(équivalent à 2,983 g de chlortétracycline)

**3. TAILLE DE L'EMBALLAGE**

211 ml

12x 211 ml

**4. ESPÈCES CIBLES**

Bovins, ovins porcins

**5. INDICATIONS**

**6. VOIES D'ADMINISTRATION**

Vóie cutanée.

Pulvériser pendant 3 secondes à une distance de 15 à 20 cm environ de la zone à traiter.

**Infections des griffes:** répéter après 30 secondes.

**Piétin et pourriture du pied:** deux administrations à 30 secondes d'intervalle 1 à 2 fois par jour.  
Répéter le traitement après un à trois jours en fonction de la sévérité de la lésion et de l'évolution de la cicatrisation.

**Lésions superficielles:** une administration unique en cas de contamination par des germes sensibles à la chlortétracycline.

**Dermatite digitée:** deux administrations à 30 secondes d'intervalle, une à deux fois par jour pendant trois jours consécutifs.

Agiter vigoureusement le flacon avant pulvérisation.

Ce produit peut provoquer de graves irritations oculaires. Protéger les yeux et le visage. Porter des gants imperméables.

Éviter d'inhaler les vapeurs. Utiliser uniquement à l'air libre ou dans un espace bien ventilé. En cas de contact accidentel avec les yeux ou en cas d'ingestion, demandez immédiatement conseil à un médecin et montrez-lui le flacon de pulvérisateur.

**7. TEMPS D'ATTENTE**

Temps d'attente:

Viande et abats, lait: zéro jour

Ne pas utiliser sur les mamelles des animaux en période de lactation si le lait est destiné à la consommation humaine.

**8. DATE DE PÉREMPTION**

Exp. {mm/aaaa}

**9. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION**

A conserver à une température ne dépassant pas 25 °C.

Ne pas conserver au réfrigérateur et ne pas congeler.

Aérosol extrêmement inflammable. Conteneur pressurisé: peut exploser s'il est chauffé.

Protéger des rayons directs du soleil. Ne pas exposer à des températures dépassant 50 °C.

Maintenir à l'écart de la chaleur/surfaces chaudes/étincelles/flammes nues ou autres sources d'ignition. Ne pas fumer.

Ne pas pulvériser sur une flamme nue ou une autre source d'ignition.

Ne pas percer ou brûler, même après l'utilisation.

**10. LA MENTION « LIRE LA NOTICE AVANT UTILISATION »**

Lire la notice avant utilisation.

**11. LA MENTION « À USAGE VÉTÉRINAIRE UNIQUEMENT »**

À usage vétérinaire uniquement.

**12. LA MENTION « TENIR HORS DE LA VUE ET DE LA PORTÉE DES ENFANTS »**

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

Danger



Signe « Extrêmement inflammable ».

**13. NOM DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ**

aniMedica GmbH

**14. NUMÉROS D'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ**

BE-V503191

**15. NUMÉRO DU LOT**

Lot {numéro}