

B. NAVODILO ZA UPORABO

NAVODILO ZA UPORABO

BAYCOX 25 mg/ml peroralna raztopina za piščance in purane

1. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM TER PROIZVAJALEC ZDRAVILA, ODGOVOREN ZA SPROŠČANJE SERIJ, ČE STA RAZLIČNA

Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom:

Bayer Animal Health GmbH, 51368 Leverkusen, Nemčija

Izdelovalec, odgovoren za sproščanje serij:

KVP Pharma + Veterinär Produkte GmbH, Projensdorfer Str.324, 24106 Kiel, Nemčija

2. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

BAYCOX 25 mg/ml peroralna raztopina za piščance in purane

3. NAVEDBA UČINKOVIN(E) IN DRUGE(IH) SESTAVIN

Toltrazuril: 25,0 mg

4. INDIKACIJA(E)

Za zdravljenje kokcidioze pri piščancih in puranih.

Piščanci: Zdravljenje kokcidioze, ki je posledica okužbe z *Eimeria acervulina*, *E. brunetti*, *E. maxima*, *E. necatrix*, *E. mitis* in *E. tenella*.

Purani: Zdravljenje kokcidioze, ki je posledica okužbe z *E. adenoides*, *E. meleagrimitis*.

5. KONTRAINDIKACIJE

Ne zdravite živali, ki dajejo jajca za prehrano ljudi. Ne uporabljajte pri jarkicah, starejših od 16 tednov.

6. NEŽELENI UČINKI

Če opazite kakršne koli resne stranske učinke ali druge učinke, ki niso omenjeni v teh navodilih za uporabo, obvestite svojega veterinarja.

7. CILJNE ŽIVALSKÉ VRSTE

Piščanci in purani.

8. ODMERKI ZA POSAMEZNE ŽIVALSKÉ VRSTE TER POT(I) IN NAČIN UPORABE ZDRAVILA

Odmerek:

Dnevni odmerek (odvisno od teže živali in lokalnih pogojev reje) ne sme biti manjši od 7 mg toltrazurila/kg telesne mase/dan 2 dni zaporedoma; pri neprekinjenem 24-urnem zdravljenju ali pri neprekinjenem 8-urnem zdravljenju v vodi za pitje.

9. NASVET O PRAVILNI UPORABI ZDRAVILA

Izračunajte telesno težo jate in izberite potreben odmerek Baycox 25 mg/ml (tabela). Ocenite potrebno količino vode za pitje, da se zagotovi pravilno odmerjanje glede na različen čas zdravljenja. Pred uporabo Baycox počasi zmešajte v vodi.

telesna teža jate	Baycox 25 mg/ml odmerek
10 kg	2,8 ml
50 kg	14 ml
100 kg	28 ml
250 kg	70 ml
500 kg	140 ml
1000 kg	280 ml
5000 kg	1400 ml = 1,4 l
10000 kg	2800 ml = 2,8 l

Baycox deluje proti vsem intracelularnim razvojnim oblikam kokcidij, tako na merogonije (nespolni način razmnoževanja) kot na gametogonije (spolni način razmnoževanja).

Kontraindicirana je uporaba kemoterapevtikov za zdravljenje kokcidioze istočasno z Baycox 25 mg/ml. Zdravljenje v zgodnji fazi infekcije je zelo učinkovito, zato je pomembna zgodnja diagnoza. Zdravljenje je treba začeti ob prvih znakih obolenja. Dvodnevno zaporedno zdravljenje je dostikrat že zadostno.

10. KARENCA

Piščanci: meso in organi 14 dni.

Purani: meso in organi 16 dni.

Ni za uporabo pri pticah, ki proizvajajo ali so namenjene proizvodnji jajc za prehrano ljudi. Ne uporabite v obdobju 6 tednov pred začetkom obdobja nesnosti.

11. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Shranjujte nedosegljivo otrokom.

Shranjujte pri temperaturi do 25° C. Zdravilo ne sme zmrzniti.
Zaščitite pred svetlobo.

Rok uporabnosti zdravila v pakiranju za prodajo: 5 let.

Rok uporabnosti po prvem odpiranju stične ovojnine: 12 tednov.

Rok uporabnosti po razredčenju v skladu z navodili: 1 dan.

12. POSEBNO(A) OPOZORILO(A)

Posebni previdnostni ukrepi za uporabo pri živalih

Koncentracije, nižje od 1 ml Baycox 25 mg/ml raztopine na liter vode za pitje, lahko povzročijo obarjanje. Priporočamo dnevno pripravo sveže mešanice vode in zdravila.

Posebni previdnostni ukrepi, ki jih mora izvajati oseba, ki živalim daje zdravilo

Baycox 25 mg/ml je alkalna raztopina. Kožo ali oči, ki so prišle v stik z zdravilom, nemudoma sperite z vodo.

13. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEPORABLJENEGA ZDRAVILA ALI ODPADNIH SNOVI, ČE OBSTAJAJO

Ne odvrzite zdravila v odpadno vodo ali v gospodinjske odpadke.

Glede odstranjevanja zdravil, ki jih ne uporabljate več, se posvetujte z veterinarjem. Zdravilo odstranite na okolju prijazen način.

14. DATUM ZADNJE ODOBRITVE NAVODIL ZA UPORABO

9.12.2022

15. DRUGE INFORMACIJE

Ni nujno, da so v prometu vsa navedena pakiranja.

Za vse nadaljnje informacije o tem zdravilu se obrnite na krajevno predstavništvo imetnika dovoljenja za promet z zdravilom.

Samo za živali. Rp-Vet.