

ETIKETTERING**GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD****Kartonnen doos voor 100 ml en 250 ml injectieflacon****1. NAAM VAN HET DIERGENEESMIDDEL**

Resflor 300, 16,5 mg/ml
oplossing voor injectie
solution injectable
Injektionslösung

2. GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) BESTANDE(E)L(EN)

300 mg/ml florfenicol
16,5 mg/ml flunixin overeenkomend met/équivalent à/korresponderend zu 27,4 mg flunixin
meglumine

3. VERPAKKINGSGROOTTE

100 ml
250 ml

4. DOELDIERSOORT(EN)

Rund/Bovins/Rinder

5. INDICATIES**6. TOEDIENINGSWEG(EN)**

Subcutaan gebruik.

7. WACHTTIJD(EN)

Wachttijd(en):

Vlees en slachtafval: 46 dagen

Melk: Niet goedgekeurd voor gebruik bij dieren die melk voor humane consumptie produceren. Niet gebruiken bij drachtige dieren bestemd voor de productie van melk voor humane consumptie binnen 2 maanden voor de verwachte partus.

Temps d'attente :

Viande et abats : 46 jours.

Lait : Ne pas utiliser chez les animaux producteurs de lait destiné à la consommation humaine. Ne pas utiliser chez les animaux gravides producteurs de lait destiné à la consommation humaine au cours des 2 mois précédant la mise- bas.

Wartezeit(en):

Essbare Gewebe: 46 Tage.

Milch: Nicht bei Tieren anwenden, deren Milch für den menschlichen Verzehr vorgesehen ist. Bei trächtigen Tieren, deren Milch für den menschlichen Verzehr vorgesehen ist, nicht innerhalb von 2 Monaten vor dem voraussichtlichen Geburtstermin anwenden.

8. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

Exp. {mm/jjjj}

Na openen gebruiken binnen 28 dagen.

Après ouverture, à utiliser dans les 28 jours.

Nach Anbrechen/erstmaligen Öffnen: innerhalb von 28 Tagen verbrauchen.

9. BIJZONDERE BEWAARVOORSCHRIFTEN

Niet bewaren boven 25°C. Niet in de vriezer bewaren. Beschermen tegen bevriezing.

À conserver à une température ne dépassant pas 25 °C. Ne pas congeler. À conserver à l'abri du gel.

Nicht über 25°C lagern. Nicht einfrieren. Vor Frost schützen.

10. VERMELDING “LEES VÓÓR GEBRUIK DE BIJSLUITER”

Lees vóór gebruik de bijsluiter.

11. VERMELDING “UITSLUITEND VOOR DIERGENEESKUNDIG GEBRUIK”

Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik.

12. VERMELDING “BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN BEWAREN”

Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

13. NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Intervet International B.V.

14. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING(EN) VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

BE-V300991

15. PARTIJNUMMER

Lot {nummer}

GEGEVENS DIE OP DE PRIMAIRE VERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD**Etiket voor 100 ml en 250 ml injectieflacon****1. NAAM VAN HET DIERGENEESMIDDEL**

Resflor 300, 16,5 mg/ml
oplossing voor injectie
solution injectable
Injektionslösung

2. GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) BESTANDE(E)L(EN)

300 mg/ml florfenicol
16,5 mg/ml flunixin overeenkomend met/ équivalent à/korresponderend zu 27,4 mg flunixin
meglumine

3. DOELDIERSOORT(EN)

Rund/Bovins/Rinder

4. TOEDIENINGSWEG(EN)

Subcutaan gebruik.
Lees vóór gebruik de bijsluiters. Voir la notice avant utilisation. Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

5. WACHTTIJD(EN)Wachttijd(en):

Vlees en slachtafval: 46 dagen.

Melk: Niet goedgekeurd voor gebruik bij dieren die melk voor humane consumptie produceren. Niet gebruiken bij drachtige dieren bestemd voor de productie van melk voor humane consumptie binnen 2 maanden voor de verwachte partus.

Temps d'attente :

Viande et abats : 46 jours.

Lait : Ne pas utiliser chez les animaux producteurs de lait destiné à la consommation humaine. Ne pas utiliser chez les animaux gravides producteurs de lait destiné à la consommation humaine au cours des 2 mois précédant la mise-bas.

Wartezeit(en):

Essbare Gewebe: 46 Tage.

Milch: Nicht bei Tieren anwenden, deren Milch für den menschlichen Verzehr vorgesehen ist. Bei trächtigen Tieren, deren Milch für den menschlichen Verzehr vorgesehen ist, nicht innerhalb von 2 Monaten vor dem voraussichtlichen Geburtstermin anwenden.

6. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

Exp. {mm/jjjj}

Na openen gebruiken binnen 28 dagen.

Après ouverture, à utiliser dans les 28 jours.

Nach Anbrechen/erstmaligen Öffnen innerhalb von 28 Tagen verbrauchen.

7. BIJZONDERE BEWAARVOORSCHRIFTEN

Niet bewaren boven 25°C. Niet in de vriezer bewaren. Beschermen tegen bevriezing.

À conserver à une température ne dépassant pas 25°C. Ne pas congeler. À conserver à l'abri du gel.

Nicht über 25°C lagern. Nicht einfrieren. Vor Frost schützen.

8. NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Intervet International B.V.

9. PARTIJNUMMER

Lot {nummer}