

ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЕ ИЗПИСВА ВЪРХУ ВЪНШНАТА ОПАКОВКА И ПЪРВИЧНАТА ОПАКОВКА

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ

ОЛЕТЕТРАКОРТ® аерозол
OLETETPACORT® aerosol

2. СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНИТЕ СУБСТАНЦИИ И ЕКСЦИПИЕНТИТЕ

Активни субстанции:

Tetracycline Hydrochloride - 1.5 g (1 395 000 UI)/150 g
Oleandomycin Phosphate - 0.75 g (562 500 UI)/150 g
Hydrocortisone Acetate - 0,10 g/150 g

Tetracycline Hydrochloride – 0,9 g (837 000 UI)/90 g
Oleandomycin Phosphate - 0,45 g (337 500 UI)/90 g
Hydrocortisone Acetate – 0,06 g/90 g

Ексципиенти: Dimethyl Sulphoxide, Povidone (Polyvinyl Pyrrolidone), Trolamine (Triethanolamin), Ethanol (96 %), Forane 134 A

3. ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА

Аерозол.

4. РАЗМЕР НА ОПАКОВКАТА

150 g
90 g

5. ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП

Кучета и котки.

6. ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ

Продуктът се прилага при повърхностни случайни рани, при недълбоки контузни наранявания, при липса на некротични и размачкани тъкани и своевременно направена щателна хирургическа обработка, при интердигитален дерматит и други кожни заболявания. Оказва отличен профилактичен ефект при операционни рани.

7. МЕТОД И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Външно!

В зависимост от тежестта на случая, засегнатия участък от кожата се напръсква 2-3 пъти дневно до пълно излекуване.

8. КАРЕНТЕН СРОК

Не е приложимо.

9. СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, АКО Е НЕОБХОДИМО

Преди употреба прочети листовката.

10. СРОК НА ГОДНОСТ

Годен до {месец/година}

11. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ

Да се съхранява при температура под 25 °C.

Да се пази от светлина.

Да се съхранява на сухо място.

Внимание! Флаконът е под налягане. Да се пази от пряка слънчева светлина и от температури над 50 °C. Да се пази от източници на възпламеняване.

Да се използва само в добре вентилирани помещения.

12. СПЕЦИАЛНИ МЕРКИ ЗА УНИЩОЖАВАНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАН ПРОДУКТ ИЛИ ОСТАТЪЦИ ОТ НЕГО, АКО ИМА ТАКИВА

Унищожете остатъчните материали в съответствие с изискванията на местното законодателство.

13. НАДПИСЪТ “САМО ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКА УПОТРЕБА” И УСЛОВИЯ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ ОТНОСНО РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО И УПОТРЕБАТА, АКО Е ПРИЛОЖИМО

Само за ветеринарномедицинска употреба. Да се отпуска само по лекарско предписание.

14. НАДПИСЪТ “ДА СЕ СЪХРАНЯВА ДАЛЕЧ ОТ ПОГЛЕДА И НА НЕДОСТЪПНИ ЗА ДЕЦА МЕСТА”

Да се съхранява далеч от погледа и на недостъпни за деца места.

15. ИМЕ И ПОСТОЯНЕН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА

ВЕТПРОМ АД

гр. Радомир, ул. ”Отец Паисий” № 26

Телефон: 0777/8-24-93, 8-00-19

Факс: 0777/8-23-91

E-mail: office@vetprom.bg

16. НОМЕР НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА НА ВМП

0022-2335/25.06.2014

17. ПАРТИДЕН НОМЕР

Партида №

ЛИСТОВКА ЗА:

ОЛЕТЕТРАКОРТ® аерозол за кучета и котки.

1. ИМЕ И ПОСТОЯНЕН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ

Притежател на лиценза за употреба и производител отговорен за освобождаване на партидата:

ВЕТПРОМ АД

гр. Радомир, ул. "Отец Паисий" № 26

Телефон: 0777/8-24-93, 8-00-19

Факс: 0777/8-23-91

E-mail: office@vetprom.bg

2. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ

ОЛЕТЕТРАКОРТ® аерозол

OLETETRACORT® aerosol

3. СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНИТЕ СУБСТАНЦИИ И ЕКСЦИПИЕНТИТЕ

Активни субстанции:

Tetracycline Hydrochloride - 1.5 g (1 395 000 UI)/150 g

Oleandomycin Phosphate - 0.75g (562 500 UI)/150 g

Hydrocortisone Acetate - 0,10 g/150 g

Tetracycline Hydrochloride – 0,9 g (837 000 UI)/90 g

Oleandomycin Phosphate - 0,45 g (337 500 UI)/90 g

Hydrocortisone Acetate - 0,06 g/90 g

Ексципиенти: Dimethyl Sulphoxide, Povidone (Polyvinyl Pyrrolidone), Trolamine (Triethanolamin), Ethanol (96 %), Forane 134 A

4. ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ

Продуктът се прилага при повърхностни случайни рани, при недълбоки контузни наранявания, при липса на некротични и размачкани тъкани и своевременно направена щателна хирургическа обработка, при интердигитален дерматит и други кожни заболявания. Оказва отличен профилактичен ефект при операционни рани.

5. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Да не се използва при свръхчувствителност към активните субстанции или към някой от ексципиентите.

Да не се използва при туберкулозни поражения, вирусни и гъбични инфекции на кожата.

6. НЕБЛАГОПРИЯТНИ РЕАКЦИИ

В много редки случаи са възможни алергични реакции. Както при други антибиотици, приложението може да доведе до развитие на резистентни патогенни микроорганизми.

Ако забележите някакво сериозно въздействие или други ефекти, вследствие от употребата на този ВМП, които не са описани в тази листовка, моля незабавно да уведомите Вашия ветеринарен лекар.

7. ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП

Кучета и котки.

8. ДОЗИРОВКА ЗА ВСЕКИ ВИД ЖИВОТНО, МЕТОД И НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ

Външно!

В зависимост от тежестта на случая, засегнатия участък от кожата се напръсква 2-3 пъти дневно до пълно излекуване.

9. СЪВЕТ ЗА ПРАВИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ

Винаги използвайте ОЛЕТЕТРАКОРТ® аерозол точно както Ви е казал Вашия ветеринарен лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия ветеринарен лекар.

10. КАРЕНТЕН СРОК

Не е приложимо.

11. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ПРОДУКТА

Да се съхранява при температура под 25 °C.

Да се пази от светлина.

Да се съхранява на сухо място.

Внимание! Флаконът е под налягане. Да се пази от пряка слънчева светлина и от температури над 50 °C. Да се пази от източници на възпламеняване.

Да се използва само в добре вентилирани помещения.

12. СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Специални предупреждения за всеки вид животни, за които е предназначен ВМП:

Няма.

Специални предпазни мерки за животните при употребата на продукта:

Да не се вдишва!

Специални предпазни мерки за лицата, прилагащи ветеринарномедицинския продукт на животните:

Да се пазят очите. Индивидуално предпазно оборудване, състоящо се от защитни очила, трябва да се носи, когато се работи с ветеринарномедицинския продукт.

Да не се вдишва!

Бременност и лактация или яйценосене:

Може да се прилага по време на бременност и лактация.

Взаимодействие с други ветеринарномедицински продукти и други форми на взаимодействие:

Тетрациклините взаимодействат с антиациди, калциеви производни (като калциев карбонат), производни на желязото, магнезиеви-съдържащи лаксативи, натриев бикарбонат, фенобарбитал, пеницилин, оксацилин, цефалоспорици, ампицилин, карбеницилин, еритромицин, оксацилин.

Хидрокортизон ацетат взаимодейства с ампицилин, ефедринов сулфат, хепарин, окситетрациклин, фено- и пентобарбитал, прометазин хидрохлорид.

Олеандомицинът взаимодейства с линкомицин и еритромицин.

Предозиране (симптоми, спешни мерки, антидоти):

Няма данни.

Несъвместимости:

Тетрациклините взаимодействат с антиациди, калциеви производни (като калциев карбонат), производни на желязото, магнезии-съдържащи лаксативи, натриев бикарбонат, фенобарбитал, пеницилин, оксацилин, цефалоспорици, ампицилин, карбеницилин, еритромицин, оксацилин.
Хидрокортизон ацетат взаимодейства с ампицилин, ефедринов сулфат, хепарин, окситетрациклин, фено- и пентобарбитал, прометазин хидрохлорид.
Олеандомицинът взаимодейства с линкомицин и еритромицин.

13. СПЕЦИАЛНИ МЕРКИ ЗА УНИЩОЖАВАНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАН ПРОДУКТ ИЛИ ОСТАТЪЦИ ОТ НЕГО, АКО ИМА ТАКИВА

ВМП не трябва да бъдат изхвърляни с битови отпадъци или отпадни води.
Попитайте Вашия ветеринарен лекар какво да правите с ненужните ВМП. Тези мерки ще помогнат за опазване на околната среда.

14. ДАТАТА НА ПОСЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ НА ТЕКСТА

11/2016

15. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Не всички размери на опаковката могат да бъдат предлагани на пазара.
За всяка информация относно този ветеринарномедицински продукт, моля свържете се с териториалния представител на притежателя на лиценза за употреба.