

MENTIONS DEVANT FIGURER SUR L'EMBALLAGE EXTÉRIEUR - COMBINED LABEL AND PACKAGE LEAFLET

ETUI DU CONDITIONNEMENT DU FLACON DE 125 ML

1. NOM DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE

BRONCHORYL, SOLUTION BUVABLE

2. COMPOSITION EN SUBSTANCES ACTIVES

COMPOSITION

Antimonium tartaricum	5CH
Bryonia	5CH
Ipeca	3CH
Aconitum napellus.....	5 CH
Belladonna.....	5 CH
Drosera	3 CH
Rumex crispus	5 CH
Sticta pulmonaria.....	4 CH
Pulsatilla	5 CH aa

Excipient :
éthanol 15% (v/v) QSP..... 1 ml

3. TAILLE DE L'EMBALLAGE

Flacon de 125 mL

Boîte de 1 flacon de 125 mL et de 1 pipette graduée

4. ESPÈCES CIBLES

ESPÈCES CIBLES

Bovins, ovins, caprins, équins, porcins et volailles.

5. INDICATIONS

Affections aigües bénignes des voies respiratoires supérieures.

INDICATIONS D'UTILISATION

Chez les bovins, les ovins, les caprins, les équins, les porcins et les volailles : médicament homéopathique traditionnellement utilisé dans les affections aigües bénignes des voies respiratoires supérieures.

6. CONTRE-INDICATIONS

Sans objet.

7. MISES EN GARDES PARTICULIERES

UTILISATION EN CAS DE GESTATION OU DE LACTATION

L'innocuité de la spécialité chez la femelle pendant la gestation et la lactation n'a pas été étudiée.

Cependant, ce médicament homéopathique est traditionnellement utilisé pendant la gestation et la lactation.

Consulter un vétérinaire si les symptômes persistent.

8. EFFETS INDESIRABLES

Sans objet.

9. POSOLOGIE POUR CHAQUE ESPÈCE, VOIES ET MODE D'ADMINISTRATION

POSOLOGIE ET VOIE D'ADMINISTRATION

Voie orale.

5 mL 2 à 3 fois par jour jusqu'à amélioration. Administrer soit directement dans la gueule de l'animal, soit diluer dans l'eau de boisson à la concentration de 1 mL par litre d'eau de boisson, soit mélanger à l'aliment.

10. INDICATIONS NÉCESSAIRES À UNE ADMINISTRATION CORRECTE

Sans objet.

11. TEMPS D'ATTENTE

TEMPS D'ATTENTE

Zéro jour.

12. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION

PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION

À conserver à une température ne dépassant pas 25° C.

13. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES D'ELIMINATION

Les conditionnements vides et tout reliquat de produit doivent être éliminés suivant les pratiques en vigueur régies par la réglementation sur les déchets.

14. CLASSIFICATION DES MÉDICAMENTS VÉTÉRINAIRES

Médicament vétérinaire non soumis à ordonnance.

15. NUMÉRO D'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ ET PRÉSENTATIONS

AMM n° FR/V/4705529 0/2012

16. DATE DU DERNIER ÉTIQUETAGE APPROUVÉ

<{MM/YYYY}>

Des informations détaillées sur ce médicament vétérinaire sont disponibles dans la base de données *Union Product Database* (<https://medicines.health.europa.eu/veterinary>).

17. COORDONNÉES

Titulaire / Exploitant / Fabricant :

BOIRON

2 avenue de l'Ouest Lyonnais

69510 Messimy - France

Tél. pour la France Métropolitaine :

0 810 809 810 (Service 0,05€ / min + prix appel)

18. AUTRES INFORMATIONS**PROPRIÉTÉS PHARMACOLOGIQUES**

Médicament homéopathique associant plusieurs souches dont les propriétés, dans l'indication proposée, sont reconnues par les matières médicales homéopathiques.

GTIN {numéro}

19. LA MENTION «À USAGE VÉTÉRINAIRE UNIQUEMENT»

Médicament homéopathique. Usage vétérinaire.

20. DATE DE PÉREMPTION

EXP {mm/aaaa}

21. NUMÉRO DU LOT

LOT {numéro}

MENTIONS DEVANT FIGURER SUR LE CONDITIONNEMENT PRIMAIRE**ETIQUETTE FLACON 125ML****1. NOM DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE**

BRONCHORYL SOLUTION BUVABLE

2. COMPOSITION EN SUBSTANCES ACTIVES**COMPOSITION**

Antimonium tartaricum	5CH
Bryonia	5CH
Ipeca	3CH
Aconitum napellus.....	5 CH
Belladonna.....	5 CH
Drosera	3CH
Rumex crispus	5CH
Sticta pulmonaria.....	4CH
Pulsatilla	5CH aa
Excipient : Ethanol 15% (v/v) QSP1 ml

3. ESPÈCES CIBLES**ESPÈCES CIBLES**

Bovins, ovins, caprins, équins, porcins et volailles.

4. VOIES D'ADMINISTRATION**POSOLOGIE ET VOIE D'ADMINISTRATION**

Voie orale. 5 mL 2 à 3 fois par jour jusqu'à amélioration. Administrer soit directement dans la gueule de l'animal, soit diluer dans l'eau de boisson à la concentration de 1 mL par litre d'eau de boisson, soit mélanger à l'aliment.

5. TEMPS D'ATTENTE**TEMPS D'ATTENTE**

Zéro jour.

6. DATE DE PÉREMPTION

EXP {mm/aaaa}

7. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION**PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION**

À conserver à une température ne dépassant pas 25° C.

8. NOM DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ**Titulaire / Exploitant : BOIRON**

2 avenue de l'Ouest Lyonnais - 69510 Messimy - France

9. NUMÉRO DU LOT

LOT {numéro}

10. AUTRES MENTIONS

INDICATIONS D'UTILISATION

Chez les bovins, les ovins, les caprins, les équins, les porcins et les volailles : médicament homéopathique traditionnellement utilisé dans les affections aigües bénignes des voies respiratoires supérieures.

Affections aigües bénignes des voies respiratoires supérieures.

PROPRIÉTÉS PHARMACOLOGIQUES

Médicament homéopathique associant plusieurs souches dont les propriétés, dans l'indication proposée, sont reconnues par les matières médicales homéopathiques.

UTILISATION EN CAS DE GESTATION OU DE LACTATION

L'innocuité de la spécialité chez la femelle pendant la gestation et la lactation n'a pas été étudiée. Cependant, ce médicament homéopathique est traditionnellement utilisé pendant la gestation et la lactation.

Les conditionnements vides et tout reliquat de produit doivent être éliminés suivant les pratiques en vigueur régies par la réglementation sur les déchets.

Consulter un vétérinaire si les symptômes persistent.

Médicament homéopathique. Usage vétérinaire.

AMM n° FR/V/4705529 0/2012

Flacon de 125 ml

MENTIONS DEVANT FIGURER SUR LE CONDITIONNEMENT PRIMAIRE**ETIQUETTE FLACON 1L****1. NOM DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE**

BRONCHORYL SOLUTION BUVABLE

2. COMPOSITION EN SUBSTANCES ACTIVES**COMPOSITION**

Antimonium tartaricum 5 CH, Bryonia 5 CH, Ipeca 3 CH, Aconitum napellus 5 CH, Belladonna 5 CH, Drosera 3 CH, Rumex crispus 5 CH, Sticta pulmonaria 4 CH, Pulsatilla 5 CH aa
Excipient : Ethanol 15% (v/v) QSP 1 ml

3. ESPÈCES CIBLES**ESPÈCES CIBLES**

Bovins, ovins, caprins, équins, porcins et volailles.

4. VOIES D'ADMINISTRATION**POSOLOGIE ET VOIE D'ADMINISTRATION****Voie orale.**

5 mL 2 à 3 fois par jour jusqu'à amélioration. Administrer soit directement dans la gueule de l'animal, soit diluer dans l'eau de boisson à la concentration de 1 mL par litre d'eau de boisson, soit mélanger à l'aliment.

5. TEMPS D'ATTENTE**TEMPS D'ATTENTE**

Zéro jour.

6. DATE DE PÉREMOPTION

EXP {mm/aaaa}

7. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION**PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION**

À conserver à une température ne dépassant pas 25° C.

8. NOM DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ**Titulaire / Exploitant : BOIRON**

2 avenue de l'Ouest Lyonnais - 69510 Messimy - France

Tél. pour la France Métropolitaine : 0 810 809 810

(Service 0,05€ / min + prix appel)

9. NUMÉRO DU LOT

LOT {numéro}

10. AUTRES MENTIONS

Flacon de 1 L avec bouchon doseur

INDICATIONS D'UTILISATION

Chez les bovins, les ovins, les caprins, les équins, les porcins et les volailles : médicament homéopathique traditionnellement utilisé dans les affections aigües bénignes des voies respiratoires supérieures.

PROPRIÉTÉS PHARMACOLOGIQUES

Médicament homéopathique associant plusieurs souches dont les propriétés, dans l'indication proposée, sont reconnues par les matières médicales homéopathiques.

AMM n° FR/V/4705529 0/2012

GTIN {numéro}

Affections aigües bénignes des voies respiratoires supérieures.

Flacon de 1 L

UTILISATION EN CAS DE GESTATION OU DE LACTATION

L'innocuité de la spécialité chez la femelle pendant la gestation et la lactation n'a pas été étudiée. Cependant, ce médicament homéopathique est traditionnellement utilisé pendant la gestation et la lactation.

Les conditionnements vides et tout reliquat de produit doivent être éliminés suivant les pratiques en vigueur régies par la réglementation sur les déchets.

Consulter un vétérinaire si les symptômes persistent.

Médicament homéopathique. Usage vétérinaire.