

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
V/NRP/96/0457

Duplocillin LA suspensija injekcijām zirgiem, liellopiem, aitām, cūkām, suņiem un kaķiem

**1. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA UN RAŽOŠANAS LICENCES
TURĒTĀJA, KURŠ ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI, NOSAUKUMS UN ADRESE, JA
DAŽĀDI**

Reģistrācijas apliecības īpašnieks:

Intervet International B.V.
Wim de Kórverstraat 35
NL-5831 AN Boxmeer
Nīderlande

Par sērijas izlaidi atbildīgais ražotājs:

Intervet Productions S.r.L.
Via Nettunense 20,300
04011 Aprillia (LT)
Itālija

2. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Duplocillin LA suspensija injekcijām zirgiem, liellopiem, aitām, cūkām, suņiem un kaķiem
Procaine benzylpenicillin/Benzathine benzylpenicillin

3. AKTĪVO VIELU UN CITU VIELU NOSAUKUMS

1 ml suspensijas satur :

Aktīvās vielas:

Prokaīna benzilpenicilīns	150 000 IU
Benzatīna benzilpenicilīns	150 000 IU

4. INDIKĀCIJA(-S)

Pret penicilīniem jutīgu baktēriju izraisītu infekcijas slimību ārstēšanai zirgiem, liellopiem, aitām, cūkām, suņiem un kaķiem.

5. KONTRINDIKĀCIJAS

Nelietot gadījumos, ja konstatēta pastiprināta jutība pret aktīvajām vielām vai pret kādu no palīgvielām.

Nelietot gadījumos, ja infekcijas ierosinātāji ir β-laktamāzi producējošie stafilokoki.

6. IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS

Dažkārt novēro pastiprinātas jutības reakcijas (alerģiju). Var novērot uztūkumu injekcijas vietā un kuņģa-zarnu trakta darbības traucējumus.

Ja novērojat jebkuras būtiskas blakusparādības vai citu iedarbību, kas nav minētas šajā lietošanas instrukcijā, lūdzu, informējiet par tām savu veterinārārstu.

7. MĒRĶA SUGAS

Zirgi, liellopi, aitas, cūkas, suņi un kaķi.

8. DEVAS ATKARĪBĀ NO DZĪVNIEKU SUGAS, LIETOŠANAS VEIDA UN METODES

Intramuskulārām vai subkutānām injekcijām.

Devas:

Liellopi un zirgi: 1 ml/25 kg ķermeņa svara intramuskulāri;

Aitas un cūkas: 1 ml/20 kg ķermeņa svara intramuskulāri;

Kaķi un suņi: 1 ml/10 kg ķermeņa svara subkutāni.

Ja nepieciešams, ievadīšanas intervāls 72 stundas.

9. IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI

Atkārtotas injekcijas veikt dažādās injekciju vietās. Lai nodrošinātu atbilstošu devu, ķermeņa svars jānosaka pēc iespējas precīzāk, lai novērstu pārāk mazas vai pārāk lielas devas ievadīšanu.

10. IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Liellopi, zirgi:

Gaļai un blakusproduktiem: 14 dienas.

Audiem injekcijas vietā: 70 dienas.

Pienam: 5 slaukšanas reizes.

Zirgi:

Gaļai un blakusproduktiem: 14 dienas.

Audiem injekcijas vietā: 70 dienas.

Pienam: 5 slaukšanas reizes.

Aitas:

Gaļai un blakusproduktiem: 14 dienas.

Audiem injekcijas vietā: 56 dienas.

Pienam: 5 slaukšanas reizes.

Cūkas:

Gaļai un blakusproduktiem: 14 dienas.

Audiem injekcijas vietā: 70 dienas.

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Uzglabāt ledusskapī (2°C-8°C). Nesasaldēt.

Derīguma termiņš pēc pirmās tiešā iepakojuma atvēršanas: 28 dienas.

12. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI

Īpaši piesardzības pasākumi, lietojot dzīvniekiem:

Lietojo šīs veterinārās zāles, jāņem vērā vispārpieņemtie antibakteriālo zāļu lietošanas pamatprincipi. Kad vien iespējams, šīs zāles vajadzētu lietot balstoties uz jutīguma testu rezultātiem.

Īpaši piesardzības pasākumi, kas jāievēro personai, kura lieto veterinārās zāles dzīvnieku ārstēšanai:

Penicilīni un cefalosporīni pēc injekcijas, ieelpošanas, norīšanas vai saskares ar ādu var izraisīt pastiprinātas jutības reakcijas (alerģiju). Pastiprināta jutība pret penicilīniem var radīt krustenisko reakciju pret cefalosporīniem un otrādi. Pret šīm vielām dažkārt var būt nopietnas alerģiskas reakcijas. Personām ar pastiprinātu jutību pret penicilīniem vajadzētu izvairīties no saskares ar šīm veterinārajām zālēm. Zāles jālieto piesardzīgi, ievērojot visus ieteiktos piesardzības pasākumus.

Ja pēc zāļu lietošanas novērojami tādi simptomi kā ādas izsitumi, nekavējoties meklēt medicīnisko palīdzību un uzrādīt lietošanas instrukciju vai iepakojuma marķējumu ārstam. Ja novērojami tādi simptomi kā sejas, lūpu vai acu pietūkums vai apgrūtināta elpošana, kas ir daudz nopietnāki simptomi, nepieciešama tūlītēja medicīniskā palīdzība.

Ja notikusi nejauša (gadījuma rakstura) pašinjicēšana, nekavējoties meklēt medicīnisko palīdzību un uzrādīt lietošanas instrukciju vai iepakojuma marķējumu ārstam.

Grūsnība un laktācija:

Literatūras dati neuzrāda toksisku ietekmi uz vīriešu vai sieviešu kārtas dzīvnieku reproduktīvo sistēmu. Tomēr nav konkrētu pētījumu par mērķa sugām.

Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi:

Ir konstatēts antagonisms starp Duplocillin LA sastāvā esošajām aktīvajām vielām un bakteriostatiskās darbības pretmikrobajām zālēm.

Pastiprināta jutība pret penicilīniem var izraisīt krusteniskas pastiprinātas jutības reakcijas pret citām β-laktāma grupas antibiotikām un otrādi.

Iespējams sinerģisms mijiedarbībā ar baktericīdas darbības pretmikrobajām zālēm.

Pārdozēšana (simptomi, rīcība ārkārtas situācijā, antidoti):

Nepārsniegt noteikto devu, lai izvairītos no prokaīna pārdozēšanas īpaši jauniem dzīvniekiem, piemēram, sīvēniem. Pēc dubultas devas injicēšanas divas reizes ar 72 stundu intervālu netika novērotas nekādas blakusparādības.

Nesaderība:

Tā kā nav veikti saderības pētījumi, šīs veterinārās zāles nedrīkst lietot maisījumā ar citām veterinārajām zālēm.

13. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTU VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU IZNĪCINĀŠANAI

Jebkuras neizlietotas veterinārās zāles vai to atkritumi jāiznīcina saskaņā ar nacionālajiem tiesību aktiem.

14. DATUMS, KAD LIETOŠANAS INSTRUKCIJA PĒDĒJO REIZI TIKA APSTIPRINĀTA

12/2023

15. CITA INFORMĀCIJA

Recepšu veterinārās zāles.

Iepakojums: 100 ml un 250 ml stikla vai PET flakoni.

Ne visi iepakojuma izmēri var tikt izplatīti.