

# VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS

## 1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

ALAMYCIN, odos purškalas

## 2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS

Vienoje slėginėje talpyklėje (140 g) yra:

**veikliosios (-ių) medžiagos (-ų):**

oksitetraciklino hidrochlorido 3,6 %;

**pagalbinės (-ių) medžiagos (-ų):**

Patent Blue V (E131) 0,33 %,  
propelentinių azoto dujų.

Išsamų pagalbinių medžiagų sąrašą žr. 6.1 p.

## 3. VAISTO FORMA

Odos purškalas.

## 4. KLINIKINIAI DUOMENYS

### 4.1. Paskirties gyvūnų rūšis (-ys)

Galvijai, avys, kiaulės.

### 4.2. Naudojimo indikacijos, nurodant paskirties gyvūnų rūšis

Avims, sergančioms nagų puvinui, bei galvijams, kiaulėms ir avims, esant odos pažeidimų, sukeltų oksitetraciklinui jautrių mikroorganizmų, gydyti.

### 4.3. Kontraindikacijos

Nėra.

### 4.4. Specialieji nurodymai

Nėra.

### 4.5. Specialiosios naudojimo atsargumo priemonės

Specialiosios atsargumo priemonės, naudojant vaistą gyvūnams

Nėra.

Specialiosios atsargumo priemonės asmenims, naudojantiems vaistą gyvūnams

Būtina stengtis, kad preparato nepatektų ant odos, į akis ar kvėpavimo takus.

Po naudojimo būtina plauti rankas.

Negalima purkšti ant liepsnos ar įkaitusių daiktų.

Aerolis yra degus, todėl preparatą reikia naudoti gerai vėdinamose patalpose ir nerūkyti.

#### **4.6. Nepalankios reakcijos (dažnumas ir sunkumas)**

Nežinomos.

#### **4.7. Naudojimas vaikingoms patelėms, laktacijos ar kiaušinių dėjimo metu**

Galima naudoti vaikingumo ir laktacijos metu.

#### **4.8. Sąveika su kitais vaistais ir kitos sąveikos formos**

Nėra.

#### **4.9. Dozės ir naudojimo būdas**

Prieš gydant avis sergančias nagų puvinium, nagas būtina gerai nuvalyti ir apkarpyti. Prieš gydant žaizdas reikia išvalyti.

Prieš naudojimą reikia suplakti. Preparatą reikia purkšti ant pažeistos vietos keletą sekundžių ar kol visiškai ją padengia. Avys, gydytos nuo nagų puvinio, 1 val. turi būti laikomos ant sauso grindinio.

#### **4.10. Perdozavimas (simptomai, pirmosios pagalbos priemonės, priešnuodžiai)**

Nežinomas.

#### **4.11. Išlauka**

0 parų.

### **5. FARMAKOLOGINĖS SAVYBĖS**

Farmakoterapinė grupė: dermatologinio naudojimo antibiotikai, tetraciklinai.  
ATCvet kodas: QD06AA03.

Oksitetraciklinas yra bakteriostatiškai veikiantis antibiotikas, kuris slopina jautrių bakterijų baltymų sintezę. Mikroorganizmo ląstelės viduje jis negrįžtamai jungiasi su ribosomų 30S subvieneto receptoriais ir trukdo aminoacil-transportinei RNR jungtis prie ribosomos ir iRNR komplekso. Tokiu būdu oksitetraciklinas neleidžia pridėti amino rūgščių prie besiformuojančios baltymo grandinės ir slopina bakterijų baltymų sintezę.

### **6. FARMACINIAI DUOMENYS**

#### **6.1. Pagalbinių medžiagų sąrašas**

Magnio chlorido heksahidratas,  
povidonas K17,  
Patent Blue V (E131),  
propileno glikolis,  
išgrynintas vanduo,  
etanolaminas,  
metilo/izopropilo alkoholis.

#### **6.2. Pagrindiniai nesuderinamumai**

Nėra.

### **6.3. Tinkamumo laikas**

2 metai.

### **6.4. Specialieji laikymo nurodymai**

Negalima laikyti aukštesnėje kaip 25 °C temperatūroje.

Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių. Stengtis, kad laikymo vietos temperatūra nepakiltų aukščiau kaip 50 °C.

Slėginės talpyklės negalima perdurti ar deginti net ir po naudojimo.

### **6.5. Pirminės pakuotės pobūdis ir sudedamosios dalys**

Slėginės talpyklės po 140 g.

### **6.6. Specialiosios nesunaudoto veterinarinio vaisto ar su jo naudojimu susijusių atliekų naikinimo nuostatos**

Nesunaudotas veterinarinis vaistas ar su juo susijusios atliekos turi būti sunaikintos pagal šalies reikalavimus.

## **7. REGISTRUOTOJAS**

Norbrook Laboratories (Ireland) Limited,  
Rossmore Industrial Estate,  
Monaghan,  
Airija

## **8. REGISTRACIJOS NUMERIS**

LT/2/01/1346/001

## **9. PERREGISTRACIJOS DATA**

2006-11-27

## **10. TEKSTO PERŽIŪROS DATA**

2022-05-26

## **DRAUDIMAS PREKIAUTI, TIEKTI IR (ARBA) NAUDOTI**

Nėra.

## ŽENKLINIMAS

**DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT PIRMINĖS PAKUOTĖS**

**SLĖGINĖ TALPYKLĖ**

### **1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS**

ALAMYCIN, odos purškalas

### **2. VEIKLIOJI (-IOSIOS) MEDŽIAGA (-OS)**

Vienoje slėginėje talpyklėje (140 g) yra:

**veikliosios (-ių) medžiagos (-ų):**

oksitetraciklino hidrochlorido

3,6 %;

**pagalbiniės (-ų) medžiagos (-ų):**

Patent Blue V (E131)

propelentinių azoto dujų.

0,33 %,

### **3. VAISTO FORMA**

Odos purškalas.

### **4. PAKUOTĖS DYDIS**

140 g

### **5. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠIS (-YS)**

Galvijai, avys, kiaulės.

### **6. INDIKACIJA (-OS)**

Avims, sergančioms nagų puvinio, bei galvijams, kiaulėms ir avims, esant odos pažeidimų, sukeltų oksitetraciklinui jautrių mikroorganizmų, gydyti.

### **7. NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS**

Purkšti ant pažeistos vietos.

### **8. IŠLAUKA**

Išlauka: 0 parų.

**9. SPECIALIEJI ĮSPĖJIMAI, JEI REIKIA**

Prieš naudojant būtina perskaityti informacinį lapelį.

**10. TINKAMUMO DATA**

Tinka iki {mėnuo/metai}

**11. SPECIALIOSIOS LAIKYMO SĄLYGOS**

Negalima laikyti aukštesnėje kaip 25 °C temperatūroje.

Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių. Stengtis, kad laikymo vietos temperatūra nepakiltų aukščiau kaip 50 °C.

Slėginės talpyklės negalima perdurti ar deginti net ir po naudojimo.

**12. SPECIALIOSIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ  
NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA**

Nesunaudotas veterinarinis vaistas ar su juo susijusios atliekos turi būti sunaikintos pagal šalies reikalavimus.

**13. NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“ IR TEIKIMO BEI  
NAUDOJIMO SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI, JEI TAIKYTINA**

Tik veterinariniam naudojimui.

Parduodama tik su veterinariniu receptu.

**14. NUORODA „SAUGOTI NUO VAIKŲ“**

Saugoti nuo vaikų.

**15. REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS**

Norbrook Laboratories (Ireland) Limited,  
Rossmore Industrial Estate,  
Monaghan,  
Airija

**16. REGISTRACIJOS NUMERIS**

LT/2/01/1346/001

**17. GAMINTOJO SERIJOS NUMERIS**

Ser. Nr. {numeris}

**INFORMACINIS LAPELIS**  
ALAMYCIN odos purškalas

**1. REGISTRUOTOJO IR UŽ VAISTO SERIJOS IŠLEIDIMĄ EEE ŠALYSE ATSAKINGO GAMINTOJO, JEI JIE SKIRTINGI, PAVADINIMAS IR ADRESAS**

Registruotojas:

Norbrook Laboratories (Ireland) Limited,  
Rossmore Industrial Estate,  
Monaghan,  
Airija

Gamintojas, atsakingas už vaisto serijos išleidimą:

Norbrook Manufacturing Ltd,  
Rossmore Industrial Estate,  
Monaghan,  
Airija

Norbrook Laboratories Ltd,  
Station Works,  
Camlough Road,  
Newry, Co. Down,  
BT35 6JP,  
Jungtinė Karalystė

**2. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS**

ALAMYCIN, odos purškalas

**3. VEIKLIOJI (-IOSIOS) IR KITOS MEDŽIAGOS**

Vienoje talpyklėje (140 g) yra:

**veikliosios (-ių) medžiagos (-ų):**

oksitetraciklino hidrochlorido 3,6 %;

**pagalbinės (-ių) medžiagos (-ų):**

Patent Blue V (E131) 0,33 %,  
propelentinių azoto dujų.

**4. INDIKACIJA (-OS)**

Avims, sergančioms nagų puviniu, bei galvijams, kiaulėms ir avims, esant odos pažeidimų, sukeltų oksitetraciklinui jautrių mikroorganizmų, gydyti.

**5. KONTRAINDIKACIJOS**

Nėra.

## **6. NEPALANKIOS REAKCIJOS**

Nežinomos. Pastebėjus bet kokį sunkų poveikį ar kitą šiame informaciniame lapelyje nepaminėtą poveikį, būtina informuoti veterinarijos gydytoją ar Lietuvos valstybinę veterinarijos preparatų inspekciją.

## **7. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠIS (-YS)**

Galvijai, avys, kiaulės.

## **8. DOZĖS, NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS KIEKVIENAI RŪŠIAI**

Prieš gydant avis sergančias nagų puvinio, nagas būtina gerai nuvalyti ir apkarpyti. Prieš gydant žaizdas reikia išvalyti.

Prieš naudojimą reikia suplakti. Preparatą reikia purkšti ant pažeistos vietos keletą sekundžių ar kol visiškai ją padengia. Avys, gydytos nuo nagų puvinio, 1 val. turi būti laikomos ant sauso grindinio.

## **9. NUORODOS DĖL TINKAMO NAUDOJIMO**

Galima naudoti vaikingoms patelėms ir laktacijos metu.

## **10. IŠLAUKA**

0 parų.

## **11. SPECIALIEJI LAIKYMO NURODYMAI**

Saugoti nuo vaikų.

Negalima laikyti aukštesnėje kaip 25 °C temperatūroje.

Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių. Stengtis, kad laikymo vietos temperatūra nepakiltų aukščiau kaip 50 °C.

Slėginės talpyklės negalima perdurti ar deginti net ir po naudojimo.

## **12. SPECIALIEJI ĮSPĖJIMAI**

Būtina stengtis, kad preparato nepatektų ant odos, į akis ar kvėpavimo takus.

Po naudojimo būtina plauti rankas.

Negalima purkšti ant liepsnos ar įkaitusių daiktų.

Aerolis yra degus, todėl preparatą reikia naudoti gerai vėdinamose patalpose ir nerūkyti.

## **13. SPECIALIOSIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA**

Vaistų negalima išmesti į kanalizaciją ar su buitinėmis atliekomis.

Veterinarijos gydytojas gali patarti, ką daryti su nereikalingais vaistais. Tai turėtų padėti saugoti aplinką.

Nesunaudoto veterinarinio vaisto likučiai ar su juo susijusios atliekos turi būti sunaikintos pagal šalies reikalavimus.

#### **14. INFORMACINIO LAPELIO PASKUTINIO PATVIRTINIMO DATA**

2022-05-26

#### **15. KITA INFORMACIJA**

Tik veterinariniam naudojimui.

Parduodama tik su veterinariniu receptu.

Farmakoterapinė grupė: dermatologinio naudojimo antibiotikai, tetraciklinai.

ATCvet kodas: QD06AA03.

Oksitetraciklinas yra bakteriostatiškai veikiantis antibiotikas, kuris slopina jautrių bakterijų baltymų sintezę. Mikroorganizmo ląstelės viduje jis negrįžtamai jungiasi su ribosomų 30S subvieneto receptoriais ir trukdo aminoacil-transportinei RNR jungtis prie ribosomos ir iRNR komplekso. Tokiu būdu oksitetraciklinas neleidžia pridėti amino rūgščių prie besiformuojančios baltymo grandinės ir slopina bakterijų baltymų sintezę.

Norint gauti informacijos apie šį veterinarinį vaistą, reikia susisiekti su registruotojo vietiniu atstovu.

Magnum Veterinarija, UAB,  
Martinavos g. 8, Martinavos k.,  
LT-54463 Kauno r., Lietuva  
Tel. +370 688 96944  
[info@magnumvet.lt](mailto:info@magnumvet.lt)