

## **A. KENNZEICHNUNG**

## ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG

Faltschachtel mit 10ml; 50 ml; 100 ml

### 1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Parvoruvac, Injektionssuspension

### 2. WIRKSTOFF(E)

Porcines Parvovirus, Stamm K22, inaktiviert mind. 2 HAH.E.  
*Erysipelothrix rhusiopathiae*, Serotyp 2, Stamm IM 950, inaktiviert  $\geq 1$  pig protective dose ( $\geq 1$  EE)  
(Wirtssystem: Schweinehodenzelllinie ST)

### 3. PACKUNGSGRÖSSE(N)

10 ml (5 Dosen)  
50 ml (25 Dosen)  
100 ml (50 Dosen)

### 4. ZIELTIERART(EN)

Schweine

### 5. ANWENDUNGSGEBIETE

### 6. ARTEN DER ANWENDUNG

Zur intramuskulären Injektion  
Vor Gebrauch schütteln.

### 7. WARTEZEITEN

Wartezeit: Null Tage

### 8. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}  
Nach Anbrechen sofort verbrauchen.

### 9. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Gekühlt lagern und transportieren (2 °C – 8 °C).  
Nicht einfrieren.  
Vor Licht schützen.

**10. VERMERK „LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG DIE PACKUNGSBEILAGE.“**

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

**11. VERMERK „NUR ZUR BEHANDLUNG VON TIEREN“**

Nur zur Behandlung von Tieren.

**12. KINDERWARNHINWEIS „ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN“**

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

**13. NAME DES ZULASSUNGSINHABERS**



**14. ZULASSUNGSNUMMERN**

DE: 490a/87

AT: Z.Nr.: 8-20066

**15. CHARGENBEZEICHNUNG**

Lot {Nummer}

**100 ml Flasche**

# Parvoruvac, Injektionssuspension

|                                                                            |                              |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Porcines Parvovirus, Stamm K22, inaktiviert                                | mind. 2 HAH.E.               |
| <i>Erysipelothrix rhusiopathiae</i> , Serotyp 2, Stamm IM 950, inaktiviert | ≥ 1 pig protective dose (≥ 1 |
| EE)                                                                        |                              |
| (Wirtssystem: Schweinehodenzelllinie ST)                                   |                              |

## Schweine

Zur intramuskulären Injektion.  
Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

Wartezeit: Null Tage

Exp. {MM/JJJJ}  
Nach Anbrechen sofort verbrauchen.

Gekühlt lagern und transportieren (2 °C – 8 °C).  
Nicht einfrieren.  
Vor Licht schützen.



|                                  |
|----------------------------------|
| <b>9.     CHARGENBEZEICHNUNG</b> |
|----------------------------------|

Lot {Nummer}

**MINDESTANGABEN AUF KLEINEN BEHÄLTNISSEN**

10 ml-Flasche und 50 ml-Flasche

**1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Parvoruvac, Injektionssuspension für Schweine

**2. MENGENANGABEN ZU DEN WIRKSTOFFEN**

Porcines Parvovirus, inaktiviert  $\geq 2$  HAH.E.  
*Erysipelothrix rhusiopathiae* Serotyp 2, inaktiviert  $\geq 1$  ppd ( $\geq 1$  EE)

**3. CHARGENBEZEICHNUNG**

Lot {Nummer}

**4. VERFALLDATUM**

Exp. {MM/JJJJ}

Nach Anbrechen sofort verbrauchen.