

ЛИСТОВКА

1. Наименование на ветеринарния лекарствен продукт

Калциев Бороглюконат 20% инжекционен разтвор
Calcium Borogluconate 20% solution for injection

2. Състав

Активно вещество:
Calcium Borogluconate 0.20 g/ml

Помощни вещества:
Water for injections

3. Видове животни, за които е предназначен ВЛП

Говеда, овце, кози, коне, свине, кучета и котки.

4. Показания за употреба

При възпалителни процеси с различна етиология в началната фаза (включително при оток на белия дроб); при кръвотечения и хеморагична диатеза; при алергични състояния-уртикария, серумна болест; при акутен тотален асептичен пододерматит и др.; при хипокалцемични състояния-тетания при кравите, рахит, остеомаляция, родилна пареза; при паралитична миоглобинурия при коне; при отравяния.

5. Противопоказания

Да не се използва при свръхчувствителност към активното вещество или към някое от помощните вещества.

Да не се използва при заболявания на сърцето и бъбреците, при животни с дихателна недостатъчност, респираторна ацидоза, стомашна фибриляция, хиперкалцемиа.

6. Специални предупреждения

Специални предпазни мерки за безопасна употреба при видовете животни, за които е предназначен ВЛП:

Продуктът се прилага във ветеринарната медицина за съответния вид животни от ветеринарни специалисти.

Специални предпазни мерки, които трябва да вземе лицето, прилагащо ветеринарния лекарствен продукт на животните :

Не е приложимо.

Специални предпазни мерки за защита на околната среда:

Не е приложимо.

Бременност и лактация:

В указаната дозировка може да се прилага преди, по време на и след раждане при крави, овце, кучета и котки, както и за лечение на следродилна пареза при хипокалцемиа.

Взаимодействие с други ветеринарни лекарствени продукти и други форми на взаимодействие:

Приемането на калциеви продукти едновременно с тиазидни диуретици, витамин А, витамин Д или негови аналози може да предизвика хиперкалцемия. Калцият при парентерално приложение може да намали ефекта на неполярните миорелаксанти. Известно е, че калцият усилва действието на тубокурарина.

Предозиране:

При приемане на по-високи дози най-често се наблюдава хиперкалцемия. Има случаи на хиперкалцемия и при едновременно парентерално прилагане на калциеви продукти с витамин Д или негови аналози.

Специални ограничения за употреба и специални условия за употреба:

Не е приложимо.

Основни несъвместимости:

Приемането на калциеви продукти едновременно с тиазидни диуретици, витамин А, витамин Д или негови аналози може да предизвика хиперкалцемия. Калцият при парентерално приложение може да намали ефекта на неполярните миорелаксанти. Известно е, че калцият усилва действието на тубокурарина.

7. Неблагоприятни реакции

Говеда, овце, кози, коне, свине, кучета и котки:

Редки (1 до 10 на 10 000 третирани животни):	Оток м мястото на приложение ¹ Хиперкалцемия ² Хипотензия, сърдечна аритмия, спиране на сърцето ³
--	---

¹ При нужда се прави масаж.

² При животни със заболявания на сърцето и бъбреците.

³ При много бързо въвеждане.

Съобщаването на неблагоприятни реакции е важно. Това позволява непрекъснат мониторинг на безопасността на продукта. Ако забележите някакви неблагоприятни реакции, включително и такива, които не са описани в тази листовка или мислите, че ветеринарния лекарствен продукт не действа, свържете се първо с Вашия ветеринарен лекар. Можете също да съобщавате неблагоприятни реакции на притежателя на разрешението за търговия, като използвате данните за контакт в края на тази листовка..

8. Дозировка за всеки вид животно, начини и метод на приложение

Доза:

Едри животни	50 до 150 ml, рядко 200 ml;
Овце, свине и кози	- 10 – 20 ml
кучета	- 5 – 10 ml
котки	- 0.5 – 2.0 ml

Начин на прилагане:

Прилага се интравенозно (бавно), подкожно, интрамускулно – за предпочитане в няколко места.

9. Съвети за правилното прилагане на продукта

Винаги използвайте ветеринарния лекарствен продукт съгласно инструкциите на Вашия ветеринарен лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия ветеринарен лекар.

10. Карентни срокове

Нула дни.

11. Специални условия за съхранение

Да се съхранява далеч от погледа и на недостъпни за деца места.

Да се съхранява при температура под 25 °С.

Да се пази от светлина.

Да се съхранява на сухо място.

12. Специални предпазни мерки при унищожаване

Ветеринарните лекарствени продукти не трябва да бъдат изхвърляни чрез битови отпадъци или отпадни води.

Използвайте програми за връщане при унищожаването на неизползвани ветеринарни лекарствени продукти или остатъци от тях в съответствие с изискванията на местното законодателство и с всички приложими национални системи за събиране. Тези мерки ще помогнат за опазване на околната среда.

Попитайте Вашия ветеринарен лекар как да унищожите ненужни ветеринарни лекарствени продукти.

13. Класификация на ветеринарните лекарствени продукти

Да се отпуска само по лекарско предписание.

14. Номера на разрешението за търговия и размери опаковки

0022-1103

Размер на опаковката: 100 ml

15. Датата на последната редакция на текста

11/2025

16. Данни за връзка

Притежател на разрешението за търговия и производител, отговарящ за освобождаването на партиди:

ВЕТПРОМ АД,

ул. „Отец Паисий” №26

2400 гр. Радомир,
Р. България

Данни за връзка за съобщаване на предполагаеми неблагоприятни реакции:
ВЕТПРОМ АД
Тел.: +35924519300
e-mail: office@danhson.com

18.11.2025 г.

X

Д-Р КРАСИМИР ЗЛАТКОВ
ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ КВЛП
Signed by: KRASIMIR YANKOV ZLATKOV