

BIJSLUITER

Procipen 300 mg/ml suspensie voor injectie voor runderen, schapen en varkens

1. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN EN DE FABRIKANT VERANTWOORDELIJK VOOR VRIJGIFTE, INDIEN VERSCHILLEND

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:

Bimeda Animal Health Limited
2, 3 & 4 Airton Close
Airton Road
Tallaght
Dublin 24
Ierland

2. BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL

Procipen 300 mg/ml suspensie voor injectie voor runderen, schapen en varkens
Benzylpenicilline procaïne

3. GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) EN OVERIGE BESTANDDE(E)L(EN)

Elke ml gebroken witte vloeibare suspensie bevat:

Werkzame stof

Benzylpenicilline procaïne 300 mg
(overeenkomend met 175,8 mg benzylpenicilline)

Hulpstoffen

Methylparahydroxybenzoesaat E218 2,0 mg

4. INDICATIE(S)

Voor de behandeling van acute systemische infecties veroorzaakt door bacteriën die gevoelig zijn voor benzylpenicilline.

5. CONTRA-INDICATIES

Niet intraveneus injecteren.

Niet gebruiken bij bekende gevallen van overgevoeligheid voor penicilline, cefalosporinen, procaïne of voor een van de hulpstoffen.

Niet gebruiken in geval van ernstige nierinsufficiëntie met anurie en oligurie.

Niet gebruiken bij zeer kleine herbivoren, zoals cavia's, gerbils en hamsters.

Niet gebruiken bij aanwezigheid van β -lactamase-producerende pathogenen.

6. BIJWERKINGEN

Bij biggen en vleesvarkens kan toediening van het diergeneesmiddel soms voorbijgaande koorts, braken, rillen, lusteloosheid en incoördinatie veroorzaken.

Er zijn systemische toxische effecten waargenomen bij jonge biggen, die van voorbijgaande aard zijn maar mogelijk dodelijke gevolgen kunnen hebben, vooral bij hogere doses.

In zeldzame gevallen kunnen anafylactische reacties optreden bij runderen, als gevolg van het povidongehalte. Allergieën voor penicilline zijn waargenomen, maar komen zeer zelden voor. Reacties kunnen soms ernstig zijn en anafylactische shock omvatten.

Bij drachtige en jonge zeugen is vulvaire afscheiding gerapporteerd die kan samenhangen met abortus. In het geval van bijwerkingen moet het dier symptomatisch behandeld worden.

De frequentie van bijwerkingen wordt als volgt gedefinieerd:

- Zeer vaak (meer dan 1 op de 10 behandelde dieren vertonen bijwerking(en))
- Vaak (meer dan 1 maar minder dan 10 van de 100 behandelde dieren)
- Soms (meer dan 1 maar minder dan 10 van de 1.000 behandelde dieren)
- Zelden (meer dan 1 maar minder dan 10 van de 10.000 behandelde dieren)
- Zeer zelden (minder dan 1 van de 10.000 behandelde dieren, inclusief geïsoleerde rapporten).

Indien u bijwerkingen vaststelt, zelfs wanneer die niet in deze bijsluiter worden vermeld, of u vermoedt dat het diergeneesmiddel niet werkzaam is, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.

Als alternatief kunt u dit rapporteren via uw nationaal meldsysteem.

7. DOELDIERSOORT(EN)

Rund, schaap en varken.

8. DOSERING VOOR ELKE DOELDIERSOORT, TOEDIENINGSWEG(EN) EN WIJZE VAN GEBRUIK.

Intramusculair gebruik.

Dosering: 12 mg procaine benzylpenicilline (overeenkomend met 7 mg benzylpenicilline) per kg lichaamsgewicht (overeenkomend met 2 ml van het diergeneesmiddel per 50 kg lichaamsgewicht) per dag.

De behandeling duurt drie tot zeven dagen.

De juiste behandelingsduur moet worden gekozen op basis van de klinische behoeften en het individuele herstel van het behandelde dier. Hierbij dient rekening te worden gehouden met de toegankelijkheid van het doelweefsel en de kenmerken van het doelpathogeen.

De maximale volumes die op één plaats geïnjecteerd mogen worden, zijn 20 ml (runderen), 3 ml (varkens) en 2 ml (schapen).

De injectieflacons kunnen maximaal 30 maal aangeprikt worden.

Teneinde een juiste dosering te berekenen, dient het lichaamsgewicht zo nauwkeurig mogelijk te worden bepaald. Dit om onderdosering te vermijden.

De injectieflacon voor gebruik gedurende minimaal 10 seconden voorzichtig schudden tot alle neerslag is gedispergeerd.

9. AANWIJZINGEN VOOR EEN JUISTE TOEDIENING

Zie rubriek 8.

10. WACHTTIJD(EN)

Runderen

Vlees en slachtafval: 10 dagen voor een behandelingsduur van drie dagen,

12 dagen voor een behandelingsduur van vier tot zeven dagen.

Melk: 108 uur (4,5 dagen)

Varkens

Vlees en slachtafval: 7 dagen voor een behandelingsduur van drie dagen,
9 dagen voor een behandelingsduur van vier tot zeven dagen.

Schapen

Vlees en slachtafval: 4 dagen voor een behandelingsduur van drie dagen,
6 dagen voor een behandelingsduur van vier tot zeven dagen.

Niet goedgekeurd voor gebruik bij schapen die melk voor humane consumptie produceren.

11. BIJZONDERE BEWAARVOORSCHRIFTEN

Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.

Bewaren in een koelkast (2 °C - 8 °C).

Houdbaarheid na eerste opening van de verpakking: 28 dagen

Dit diergeneesmiddel niet gebruiken na de uiterste gebruiksdatum vermeld op de injectieflacon en de verpakking na “EXP”. De uiterste gebruiksdatum verwijst naar de laatste dag van de maand.

12. SPECIALE WAARSCHUWING(EN)Speciale waarschuwingen voor elke doeldiersoort:

Er is volledige kruisresistentie aangetoond tussen benzylpenicilline procaïne en andere penicillinen. Na absorptie dringt benzylpenicilline slecht door in de biologische membranen (bijv. de bloed-hersenbarrière) omdat het geïoniseerd is en een slechte lipideoplosbaarheid heeft. Het gebruik van dit middel voor de behandeling van meningitis of CZS-infecties als gevolg van bijv. *Streptococcus suis* of *Listeria monocytogenes* is mogelijk niet doeltreffend. Bovendien dringt benzylpenicilline niet goed zoogdiercellen binnen en heeft dit middel derhalve mogelijk weinig effect bij de behandeling van intracellulaire pathogenen, bijv. *Listeria monocytogenes*.

Verhoogde MRC-waarden of bimodale distributieprofielen die wijzen op verworven resistentie zijn gemeld voor de volgende bacteriën:

- *Glaesserella parasuis*, *Staphylococcus* spp. als veroorzaker van MMA/PPDS, *Streptococcus* spp. en *S. suis* bij varkens;
- *Fusobacterium necrophorum* als veroorzaker van metritis en *Mannheimia haemolytica* (alleen in sommige lidstaten), evenals *Bacteroides* spp., *Staphylococcus chromogenes*, *Actinobacillus lignieresii* en *Trueperella pyogenes* bij runderen.

Het gebruik van het diergeneesmiddel kan leiden tot een gebrek aan klinische werkzaamheid bij de behandeling van infecties die door deze bacteriën zijn veroorzaakt.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren:

Het gebruik van het diergeneesmiddel dient plaats te vinden op grond van gevoeligheidstesten van uit het dier geïsoleerde bacteriën. Indien dit niet mogelijk is, moet therapie gebaseerd zijn op lokale (regionale, bedrijfsniveau) epidemiologische informatie over de gevoeligheid van de betreffende bacteriën.

Wanneer het diergeneesmiddel wordt gebruikt, dient rekening gehouden te worden met het officiële, nationale en regionale beleid ten aanzien van antimicrobiële middelen. Wanneer het diergeneesmiddel anders wordt gebruikt dan aangegeven in de SPC, kan de prevalentie van bacteriën die resistent zijn tegen benzylpenicilline vergroten en kan de effectiviteit van de behandeling met andere penicillinen en cefalosporinen verminderen als gevolg van mogelijke kruisresistentie.

Kalveren voeren met restmelk die residuen antibiotica bevat dient te worden vermeden tot het einde van de wachttijd voor melk (behalve tijdens de colostrale fase), omdat dit selectie van bacteriën met

antimicrobiële resistentie in de darmmicrobiota van het kalf kan veroorzaken en de uitscheiding van deze bacteriën via de feces kan vergroten.

Speciale voorzorgsmaatregelen te nemen door de persoon die het diergeneesmiddel aan de dieren toedient:

Penicillinen en cefalosporinen kunnen na injectie, inademing, inslikken of contact met de huid sensibilisatie veroorzaken. Overgevoeligheid voor penicillinen kan leiden tot kruisreacties op cefalosporinen en vice versa. Allergische reacties op deze stoffen kunnen soms ernstig zijn. Dit diergeneesmiddel bevat tevens een parabeen-conserveringsmiddel dat een contactovergevoeligheidsreactie kan veroorzaken in eerder gesensibiliseerde individuen.

Personen met een bekende overgevoeligheid voor benzylpenicilline procaine moeten contact met het diergeneesmiddel vermijden. Personen die een reactie ontwikkelen na contact met het diergeneesmiddel moeten aanraking van het diergeneesmiddel en andere producten die penicilline en cefalosporine bevatten in de toekomst vermijden.

Om huidcontact met het diergeneesmiddel zoveel mogelijk te voorkomen wordt het dragen van handschoenen aanbevolen. Ga zorgvuldig te werk bij het hanteren van dit diergeneesmiddel om blootstelling te voorkomen.

In geval van accidentele blootstelling aan de ogen, dient onmiddellijk gespoeld te worden met overvloedige hoeveelheden water.

Bij accidenteel morsen op de huid moet onmiddellijk gewassen worden met zeep en water.

In geval van accidentele zelfinjectie dient onmiddellijk een arts te worden geraadpleegd en de bijsluiter of het etiket te worden getoond.

Als u na blootstelling symptomen ontwikkelt zoals huiduitslag, dient een arts te worden geraadpleegd en deze waarschuwing te worden getoond. Zwelling van het gezicht, de lippen, ogen of problemen met de ademhaling zijn ernstigere symptomen waarbij dringend medische zorg nodig is.

Dracht en lactatie:

Er zijn geen aanwijzingen dat dit diergeneesmiddel een specifiek gevaar vormt voor het moederdier of de foetus. Bij drachtige en jonge zeugen is echter vulvaire afscheiding gerapporteerd die kan samenhangen met abortus.

Tijdens dracht en lactatie uitsluitend gebruiken overeenkomstig de baten/risicobeoordeling door de behandelende dierenarts.

Interactie met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie:

Het effect van aminoglycosiden kan worden versterkt door penicillinen.

De bacteriedodende werking van penicilline wordt tegengewerkt door bacteriostatische medicinale producten.

De uitscheiding van benzylpenicilline wordt verlengd door acetylsalicylzuur. Cholinesteraseremmers vertragen de afbraak van procaine.

Benzylpenicilline is bacteriedodend. Vermijd gelijktijdig gebruik van bacteriedodende en bacteriostatische antibiotica aangezien ze het bacteriedodende effect van penicillinen kunnen antagoniseren.

Overdosering (symptomen, procedures in noodgevallen, antidota):

Er zijn tolerantiestudies uitgevoerd met tweemaal de aanbevolen dosering in alle drie de doeldiersoorten zonder dat enige nadelige effecten zijn waargenomen.

In het geval van overdosering, kunnen symptomen van het centraal zenuwstelsel en/of stuiptrekkingen optreden.

Onverenigbaarheden:

Aangezien er geen onderzoek is verricht naar de verenigbaarheid, mag het diergeneesmiddel niet met andere diergeneesmiddelen worden gemengd.

**13. SPECIALE VOORZORGSMATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-
GEBRUIKTE DIERGENEESMIDDELEN OF EVENTUEEL AFVALMATERIAAL**

Geneesmiddelen mogen niet verwijderd worden via afvalwater of huishoudelijk afval.
Vraag aan uw dierenarts of apotheker wat u met overtollige diergeneesmiddelen dient te doen. Deze maatregelen dragen bij aan de bescherming van het milieu.

14. DE DATUM WAAROP DE BIJSLUITER VOOR HET LAATST IS HERZIEN

Februari 2026

15. OVERIGE INFORMATIE

Verpakkingsgrootten: 1 x 100 ml, 12 x 100 ml, 48 x 100 ml, 1 x 250 ml, 12 x 250 ml, 48 x 250 ml.
Het kan voorkomen dat niet alle verpakkingsgrootten in de handel worden gebracht.

BE-V586995 (Glazen type I injectieflacons)
BE-V587004 (Glazen type III injectieflacons)

KANALISATIE

Op diergeneeskundig voorschrift

Distributeur
Dopharma B.V.
Zalmweg 24
4941 VX Raamsdonksveer
Nederland