

**PROSPECTO PARA:  
EQUIPARIN 5.000 UI/100 g GEL PARA CABALLOS**

**1. NOMBRE O RAZÓN SOCIAL Y DOMICILIO O SEDE SOCIAL DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN Y DEL FABRICANTE RESPONSABLE DE LA LIBERACIÓN DE LOS LOTES, EN CASO DE QUE SEAN DIFERENTES**

Titular de la autorización de comercialización y fabricante responsable de la liberación del lote:

aniMedica GmbH  
Im Südfeld 9  
48308 Senden-Bösensell  
Alemania

Representante del Titular:

Industrial Veterinaria, S.A.  
c/ Esmeralda 19  
08950 Esplugues de Llobregat  
Barcelona, España

**2. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO**

EQUIPARIN 5.000 UI/100 g GEL PARA CABALLOS  
Heparina sódica, salicilato de hidroxietilo, levomentol

**3. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LA(S) SUSTANCIA(S) ACTIVA(S) Y OTRA(S) SUSTANCIA(S)**

100 g gel contiene:

**Sustancias activas:**

Heparina sódica		5000 U.I..
Salicilato de Hidroxietilo	5,0 g	
Levomentol		0,5 g

**Excipientes:**

Complejo cúprico de clorofilina (E 141)		0,001 g
---	--	---------

Gel cutáneo de color verde claro.

**4. INDICACIÓN(ES) DE USO**

Para el tratamiento de inflamaciones locales y contusiones, incluyendo tendinitis, tenosinovitis, bursitis y otras condiciones inflamatorias agudas del sistema músculo-esquelético en el caballo.

Equiparin también favorece la reabsorción del hematoma y los principios de inflamación edematosa resultantes de tales condiciones.



## 5. CONTRAINDICACIONES

No usar en caso de hipersensibilidad a las sustancias activas o a algún excipiente.  
Su uso no está autorizado en yeguas cuya leche se utiliza para consumo humano.

## 6. REACCIONES ADVERSAS

Infrecuentemente los animales pueden experimentar una reacción cutánea leve (que incluye la pérdida de cabello y ampollas) tras el uso de este medicamento veterinario. Si esto ocurre se debe lavar los restos del medicamento veterinario, dejar de usar el mismo y consultar con un veterinario.

Si se observan cualquier efecto de gravedad o no mencionado en este prospecto, le rogamos informe del mismo a su veterinario.

## 7. ESPECIES DE DESTINO

Caballos

## 8. POSOLOGÍA PARA CADA ESPECIE, MODO Y VÍA(S) DE ADMINISTRACIÓN

Gel para uso cutáneo.

Antes de la aplicación garantizar que la zona a tratar esté limpia y seca. Aplicar hasta una cantidad total diaria de 50 g por día de Equiparin sobre la piel intacta mediante presión de los dedos sobre el área afectada de acuerdo con las instrucciones del veterinario, hasta que los signos y síntomas desaparezcan.

## 9. INSTRUCCIONES PARA UNA CORRECTA ADMINISTRACIÓN

Ninguna.

## 10. TIEMPO DE ESPERA

Carne: 0 días

Su uso no está autorizado en yeguas cuya leche se utiliza para consumo humano.

## 11. PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN

Mantener fuera de la vista y el alcance de los niños.

No conservar a temperatura superior a 25 ° C.

No congelar.

No usar este medicamento veterinario después de la fecha de caducidad que figura en el frasco.

Período de validez después de abierto el envase primario: 6 meses



## **12. ADVERTENCIA(S) ESPECIAL(ES)**

### **Precauciones especiales para su uso en animales:**

Evite el contacto con los ojos o las mucosas.

No aplicar en heridas abiertas o lesiones en la piel.

Deje de aplicar si se registran efectos secundarios tales como señales de malestar o hinchazón.

### **Precauciones específicas que debe tomar la persona que administre el medicamento veterinario a los animales:**

Evite el contacto con heridas abiertas o con los ojos.

Al aplicar el medicamento veterinario se deben usar guantes impermeables.

En caso de contacto accidental con los ojos o la piel, el ojo (s) afectado (s) o la piel, se deben lavar con abundante cantidad de agua y consultar con un médico según sea necesario.

En caso de ingestión accidental, consulte con un médico inmediatamente y muéstrele el prospecto o la etiqueta.

Las personas con hipersensibilidad conocida a las sustancias activas o excipientes deben evitar todo contacto con el medicamento veterinario.

### **Uso durante la gestación, la lactancia o la puesta:**

No hay datos clínicos disponibles sobre el uso tópico del medicamento veterinario durante el embarazo. No ha quedado demostrada la seguridad del medicamento veterinario durante la gestación y la lactancia.

### **Sobredosificación (síntomas, medidas de urgencia, antídotos):**

Ninguna conocida.

## **13. PRECAUCIONES ESPECIALES PARA LA ELIMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO NO UTILIZADO O, EN SU CASO, LOS RESIDUOS DERIVADOS DE SU USO**

Los medicamentos no deben ser eliminados vertiéndolos en aguas residuales o mediante los vertidos domésticos.

## **14. FECHA EN LA QUE FUE APROBADO EL PROSPECTO POR ÚLTIMA VEZ**

20 de noviembre de 2014

## **15. INFORMACIÓN ADICIONAL**

Frasco de polietileno opaco conteniendo 285 g (300 ml) de gel. El sistema de cierre consta de un tapón de rosca.

Formatos: 1 frasco y caja de cartón con 6 frascos.

Es posible que no se comercialicen todos los formatos

### **PROHIBICIÓN DE VENTA, DISPENSACIÓN Y/O USO**

Uso veterinario-Medicamento sujeto a prescripción veterinaria



Administración bajo control o supervisión del veterinario