

[Version 9.1,11/2024]

I PRIEDAS
VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS

1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

GLUCORTIN, 2 mg/ml, injekcinis tirpalas galvijams, veršeliams, ožkoms, kiaulėms, šunims ir katėms.

2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS

1 ml yra:

veikliosios medžiagos:

deksametazono (natrio fosfato druskos) 2 mg

pagalbinės medžiagos:

Kokybinė pagalbinių medžiagų ir kitų sudedamųjų medžiagų sudėtis	Kiekybinė sudėtis, jei ta informacija būtina siekiant tinkamai naudoti veterinarinį vaistą
Benzilo alkoholis	15.6 mg
Trinatio citratas	
Natrio chloridas	
Citrinų rūgštis	
Injekcinis vanduo	

Bespalvis tirpalas.

3. KLINIKINĖ INFORMACIJA

3.1 Paskirties gyvūnų rūšys

Galvijai, veršeliai, ožkos, kiaulės, šunys ir katės.

3.2 Naudojimo indikacijos, nurodant paskirties gyvūnų rūšis

Galvijams, veršeliams, ožkoms, kiaulėms, šunims ir katėms gydyti, kai reikalingas vidutinės veikimo trukmės parenterinis kortikosteroidų poveikis. Gali būti naudojamas kaip priešūždegiminis ir antialerginis vaistas, ar gydant galvijus nuo pirminės ketozės, taip pat karvėms atsivedimui sukelti. Naudotinas esant acetonemijai, alergijai, artritui, bursitui, šokui ir tendovaginitui.

3.3 Kontraindikacijos

Negalima naudoti patelėms paskutiniojo vaikingumo trimestro metu, išskyrus jei norima sukelti abortą ar paankstinti atvedimą.

Negalima naudoti gyvūnams sergantiems diabetu, lėtiniu nefritu, inkstų ligomis, esant kongestiniam širdies nepakankamumui, osteoporozei, išskyrus skubios pagalbos atvejus. Negalima naudoti gyvūnams virusinės infekcijos viremijos stadijos metu.

Negalima naudoti esant padidėjusiam jautrumui veikliajai medžiagai ar bet kuriai iš pagalbinių medžiagų.

3.4 Specialieji įspėjimai

Klinikiniai ir laboratoriniai duomenys rodo, kad patelėms paskutiniojo vaikingumo trimestro metu sugirdyti ar sušvirkšti kortikosteroidai gali sužadinti atsivedimą, kuris kartais gali būti komplikuotas vaisiaus distocija, gaišimu, susilaikiusiomis nuovalomis ir metritu. Kortikosteroidai naudoti vaikingoms kalėms, triušėms ir graužikams sukėlė vaisių vilko gomurį, kalėms – ir kitokius šuniukų apsigimimus, pvz., deformuotas priekines galūnes. Sisteminių kortikosteroidų negalima naudoti gyvūnams, sergantiems inkstų ligomis ir cukriniu diabetu.

3.5 Specialiosios naudojimo atsargumo priemonės

Specialiosios atsargumo priemonės, naudojant vaistą paskirties gyvūnų rūšims:

Gyvūnus, kuriems naudojamas šis veterinarinis vaistas, būtina įdėmiai stebėti. Kortikosteroidai veikia priešuždegimiškai ir gali maskuoti infekcijos požymius, todėl iki bus nustatyta tiksli diagnozė, gali tekti nustoti naudoti veterinarinį vaistą. Kai kurių gliukokortikoidų perdozavimas gali skatinti natrio ir skysčių susilaikymą, kalio netekimą ir svorio prieaugį.

Specialiosios atsargumo priemonės asmenims, naudojantiems vaistą gyvūnams:

Būtina saugotis ir neįsišvirkšti žmogui. Atsitiktinai įsišvirkštus, reikia nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti šio veterinarinio vaisto pakuotės lapelį ar etiketę. Būtina vengti vaisto patekimo ant odos ar į akis. Atsitiktinai patekus ant odos ar į akis, būtina plauti dideliu kiekiu vandens. Sudirgimui išliekant ilgesnį laiką būtina kreiptis į gydytoją.

Žmonės, kuriems nustatytas padidėjęs jautrumas deksametazonui, turi vengti sąlyčio su šiuo veterinariniu vaistu.

Vaistą būtina naudoti apdairiai, laikantis saugumo reikalavimų. Naudojus veterinarinį vaistą, reikia plauti rankas.

Specialiosios aplinkos apsaugos atsargumo priemonė:

Netaikytinos.

3.6 Nepageidaujami reiškiniai

Galvijai, veršeliai, ožkos, kiaulės, šunys ir katės:

Priešuždegimiškai veikiantys kortikosteroidai, pvz., deksametazonas, gali kelti daug šalutinių poveikių. Jei vienkartinė didesnė dozė dažniausiai yra gerai toleruojama, tai naudojant ilgą laiką ar ilgo veikimo esterius, gali pasireikšti sunkūs nepageidaujami reiškiniai. Jei veterinarinį vaistą reikia naudoti ilgiau, būtina skirti mažiausias vaisto dozes, tiek kiek būtina simptomams kontroliuoti.

Nenustatytas dažnis (negali būti apskaičiuotas remiantis turimais duomenimis):	Poliuriją, polidipsiją ir polifagiją. ¹ Natrio susilaikymas, vandens susilaikymas, hipokalemija. ² Odos kalcinozė (calcinosis cutis). Uždelstas žaizdų gijimas, susilpnėjęs atsparumas esamoms infekcijoms arba jų paūmėjimas. ³
--	--

	Virškinimo trakto išopėjimas. ⁴ Hepatomegalija, padidėjęs kepenų fermentų kiekis. Laikina hiperglikemija.
--	--

¹Po sisteminio vartojimo, ypač ankstyvose gydymo stadijose.

²Ilgai naudojant.

³Esant bakterinei infekcijai, vartojant steroidus, dažniausiai reikalingas antibakterinis preparatas. Esant virusinėms infekcijoms, steroidai gali pabloginti arba paspartinti ligos progresavimą.

⁴Gali pasunkėti naudojant nesteroidinius vaistus nuo uždegimo, ir gyvūnams, patyrusiems nugaros smegenų traumą.

Svarbu teikti informaciją apie nepageidaujamus reiškinius. Tai leidžia nuolat stebėti veterinarinio vaisto saugumą. Pranešimus, pageidautina, turėtų siųsti veterinarijos gydytojas registruotojui arba nacionalinei kompetentingai institucijai per nacionalinę pranešimų teikimo sistemą. Taip pat žr. atitinkamus kontaktinius duomenis pakuotės lapelyje.

3.7 Naudojimas vaikingumo, laktacijos ar kiaušinių dėjimo metu

Išskyrus jei norima sukelti atsivedimą karvėms, vaikingoms patelės kortikosteroidų naudoti nerekomenduojama. Naudojus laboratorinių gyvūnų patelėms ankstyvuojų vaikingumo metu, buvo nustatyti vaisiaus apsigimimo atvejai. Naudojamas vėlyvuojų vaikingumo metu, veterinarinis vaistas gali sukelti abortą ar ankstyvąjį atsivedimą.

Naudojus vaistą karvėms atsivedimui sukelti, dažnai gali susilaikyti nuovalos, o vėliau pasireikšti metritas ir (ar) karvės gali sunkiau apsisėklinti.

Naudojus vaistą karvėms laktacijos metu, gali sumažėti primilžis.

3.8 Sąveika su kitais vaistais ir kitos sąveikos formos

Nenaudoti vienu metu su fenitoinu, rifampinu ir barbituratais, nes šie vaistai gali skatinti gliukortikoidų biotransformavimą ir mažinti deksametazono kiekį kraujyje.

Nenaudoti vienu metu su makrolidų antibiotikais (eritromicinu, klaritromicinu, tilozinu), ketokonazoliu ir kitais azolo priešgrybiniais vaistais, nes jie gali lėtinti gliukortikoidų biotransformavimą ir didinti deksametazono kiekį kraujyje.

Naudojami vienu metu su opėjimą skatinančiais vaistais, pvz., nesteroidiniais vaistais nuo uždegimo, kortikosteroidai gali didinti virškinimo trakto opėjimo pavojų.

Kadangi kortikosteroidai gali slopinti imuninį atsaką į vakciną, vaisto negalima naudoti vienu metu su vakcinomis.

Kortikosteroidų negalima leisti į veną tuo pat metu su kalcio tirpalais. Negalima maišyti su kitais vaistais.

3.9 Dozės ir naudojimo būdas

Švirkšti į raumenis ar į veną:

galvijui – 5–15 ml,

veršeliui, ožkai ar kiaulei – 1-2,5 ml,

šuniui – 0,25-1 ml,

katei – 0,25 ml.

Jei reikia, pakartotinai gydyti galima po 24-48 val.

Būtina laikytis įprastų aseptikos reikalavimų.

3.10 Perdozavimas simptomai (pirmosios pagalbos priemonės ir priešnuodžiai, jei būtina)

Perdozavus gali pasireikšti poliurija, polidipsija ar polifagija. Ilgas kortikosteroidų naudojimas gali sukelti sunkius nepageidaujamus reiškinius. Žr. 3.6. p.

3.11 Specialieji naudojimo apribojimai ir specialiosios naudojimo sąlygos, įskaitant antimikrobinių ir antiparazitinių veterinarinių vaistų naudojimo apribojimus, kuriais siekiama apriboti atsparumo išsivystymo riziką

Netaikytinos.

3.12 Išlauka

Galvijienai, ožkienai – 7 paros,
kiaulienai – 2 paros,
pienui – 72 val. (6 melžimai).

4. FARMAKOLOGINĖS SAVYBĖS

4.1 ATCvet kodas: QH02AB02.

4.2 Farmakodinamika

Deksametazonas yra sintetinis gliukokortikosteroidas, kuriam būdingas stiprus priešūždegiminis, antialerginis ir įvairus hormoninis bei metabolinis poveikis.

Deksametazonas veikia apie 25 kartus stipriau nei natūraliai organizme susidarantis kortizolis. Kortikosteroidai yra svarbūs normaliai baltymų, angliavandenių ir riebalų apykaitai vykti bei kontroliuojant uždegimą. Jie slopina uždegiminio atsako vystymąsi, t.y. paraudimą, tinimą, skausmą, taip pat kapiliarų išsiplėtimą bei fagocitozę ir užkerta kelią padidėjusio jautrumo reakcijoms, kurios gali pasireikšti po antigeno ir antikūno sąveikos.

Daugiausiai deksametazonas veikia gliukoneogenezę, glikogeno atsidėjimą ir baltymų bei kalcio apykaitai, be to, neleidžia išsiskirti kortikotropinui. Gliukortikoidai taip pat veikia riebalų mobilizaciją, oksidaciją, sintezę bei kaupimąsi organizme. Išskyrus jei naudojamas esant antinksčių nepakankamumui, deksametazonas negydo sergančio gyvūno, o daugiausiai naudojamas ligos simptomams lengvinti dėl savo farmakologinių savybių, t.y., priešūždegiminio ir antialerginio poveikio. Didelėmis dozėmis jis yra švirkščiamas skubiais anafilaksinių reakcijų, nugaros smegenų pažeidimo ar šoko atvejais.

4.3 Farmakokinetika

Deksametazonas ima veikti greitai (per 5–45 min.), veikia vidutiniškai ilgai. Šio vaisto sudėtyje yra deksametazono dinatrio fosfato esteris. Sušvirkštas ne į kraujagyslę (į raumenis, po oda, į sąnarį), esteris greitai absorbuojasi iš injekcijos vietos ir nedelsiant hidrolizuojamas į deksametazoną, kuris ima veikti greitai ir veikia 24–48 val.

Švirkštus į raumenis, didžiausia deksametazono koncentracija (C_{max}) galvijų, arklių, kiaulių ir šunų kraujo plazmoje susidaro per 20 min. Kraujyje su baltymais jungiasi nedidelis deksametazono kiekis.

Biologinis prieinamumas švirkštus į raumenis, lyginant su injekcija į veną, visų rūšių gyvūnų yra didelis. Deksametazonas patenka į audinių skysčius, tarp jų ir smegenų skystį. Vaistas

biotransformuojamas inkstuose ir kepenyse, iš organizmo išsiskiria su šlapimu. Pusinės eliminacijos laikas arkliams švirkštus į veną yra 3,5 val. Švirkštus į raumenis, pusinės eliminacijos laikas įvairių rūšių gyvūnams buvo nuo 1 iki 20 val.

5. FARMACINIAI DUOMENYS

5.1 Pagrindiniai nesuderinamumai

Deksametazono natrio fosfato negalima derinti su daunorubicino hidrochloridu, doksorubicino hidrochloridu, metaraminolio bitartratu ir vankomicinu. Šio veterinarinio vaisto negalima maišyti su kitais veterinariniais vaistais. Žr. 3.8. p.

5.2 Tinkamumo laikas

Veterinarinio vaisto tinkamumo laikas, nepažeidus originalios pakuotės, – 3 metai.

Tinkamumo laikas, atidarius pirminę pakuotę, – 2 sav.

5.3 Specialieji laikymo nurodymai

Laikyti žemesnėje kaip 25 °C temperatūroje.

Atidarius laikyti šaldytuve (2–8 °C).

Talpyklę laikyti sandariai uždarytą.

Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių.

5.4 Pirminės pakuotės pobūdis ir sudedamosios dalys

II tipo rudo stiklo buteliukai po 50 ml, užkimšti brombutilinės gumos kamšteliais ir apgaubti aliumininiais gaubteliais.

5.5 Specialiosios nesunaudotų veterinarinių vaistų ar su jų naudojimu susijusių atliekų naikinimo nuostatos

Vaistų negalima išmesti į kanalizaciją ar su buitinėmis atliekomis.

Nesunaudotas veterinarinis vaistas ar su juo susijusios atliekos turi būti sunaikintos pagal šalies reikalavimus ir visas atitinkamam veterinariniam vaistui taikytinas nacionalines surinkimo sistemas.

6. REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS

UAB „Interchemie werken „De Adelaar“ LT“

7. REGISTRACIJOS NUMERIS

LT/2/10/2010/001

8. REGISTRAVIMO DATA

Registravimo data: 2010-12-10

9. PASKUTINĖ VETERINARINIO VAISTO APRAŠO PERŽIŪROS DATA

2025-11-14

10. VETERINARINIŲ VAISTŲ KLASIFIKACIJA

Parduodama tik su veterinariniu receptu.

Išsamią informaciją apie šį veterinarinį vaistą galima rasti Sąjungos vaistų duomenų bazėje (<https://medicines.health.europa.eu/veterinary>).

III PRIEDAS

ŽENKLINIMAS IR PAKUOTĖS LAPELIS

A. ŽENKLINIMAS

DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT ANTRINĖS PAKUOTĖS

Kartoninė dėžutė

1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

GLUCORTIN, 2 mg/ml, injekcinis tirpalas

2. VEIKLIOJI MEDŽIAGA

1 ml yra:
deksametazono (natrio fosfato druskos) 2 mg

3. PAKUOTĖS DYDIS

50 ml

4. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠIS (-YS)

Galvijai, veršeliai, ožkos, kiaulės, šunys ir katės

5. INDIKACIJA (-OS)**6. NAUDOJIMO BŪDAS**

Švirkšti į raumenis ar į veną.

7. IŠLAUKA

Išlauka:
galvijienai, ožkienai – 7 paros,
kiaulienai – 2 paros,
pienui – 72 val. (6 melžimai).

8. TINKAMUMO DATA

Exp.:
Atidarius, sunaudoti per 2 sav.

9. SPECIALIEJI LAIKYMO NURODYMAI

Laikyti žemesnėje kaip 25 °C temperatūroje.
Atidarius laikyti šaldytuve (2–8 °C).

Talpyklę laikyti sandariai uždarytą.
Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių.

10. NUORODA „PRIEŠ NAUDOJIMĄ PERSKAITYTI PAKUOTĖS LAPELĮ“
--

Prieš naudojimą perskaityti pakuotės lapelį.

11. NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“

Tik veterinariniam naudojimui.

12. NUORODA „SAUGOTI NUO VAIKŲ“
--

Saugoti nuo vaikų.

13. REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS

UAB „Interchemie werken „De Adelaar“ LT“

14. REGISTRACIJOS NUMERIS

LT/2/10/2010/001

15. SERIJOS NUMERIS

Lot: {numeris}

**DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT PIRMINĖS PAKUOTĖS
BUTELIUKAS**

1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

GLUCORTIN, 2 mg/ml, injekcinis tirpalas

2. VEIKLIOJI MEDŽIAGA

1 ml yra:
deksametazono (natrio fosfato druskos) 2 mg

3. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠIS (-YS)

Galvijai, veršeliai, ožkos, kiaulės, šunys ir katės.

4. NAUDOJIMO BŪDAS (-AI)

Švirkšti į raumenis ar į veną.
Prieš naudojimą būtina perskaityti pakuotės lapelį.

5. IŠLAUKA

Išlauka:
galvijienai, ožkienai – 7 paros,
kiaulienai – 2 paros,
pienui – 72 val. (6 melžimai).

6. TINKAMUMO DATA

Exp.:
Atidarius, sunaudoti per 2 sav.

7. SPECIALIEJI LAIKYMO NURODYMAI

Laikyti žemesnėje kaip 25 °C temperatūroje.
Atidarius laikyti šaldytuve (2–8 °C).
Talpyklę laikyti sandariai uždarytą.
Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių.

8. REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS

UAB „Interchemie werken „De Adelaar“ LT“

9. SERIJOS NUMERIS

Lot: {numeris}

B. PAKUOTĖS LAPELIS

PAKUOTĖS LAPELIS

1. Veterinarinio vaisto pavadinimas

GLUCORTIN, 2 mg/ml, injekcinis tirpalas galvijams, veršeliams, ožkoms, kiaulėms, šunims ir katėms

2. Sudėtis

1 ml yra:

veikliosios medžiagos:

deksametazono (natrio fosfato druskos) 2 mg,

pagalbinės medžiagos:

benzilo alkoholio 15,6 mg

Bespalvis tirpalas.

3. Paskirties gyvūnų rūšys

Galvijai, veršeliai, ožkos, kiaulės, šunys ir katės.

4. Naudojimo indikacijos

Galvijams, veršeliams, ožkoms, kiaulėms, šunims ir katėms gydyti, kai reikalingas vidutinės veikimo trukmės parenterinis kortikosteroidų poveikis. Gali būti naudojamas kaip prieš uždegiminis ir antialerginis vaistas, ar gydant galvijus nuo pirminės ketozės, taip pat karvėms atsivedimui sukelti. Naudotinas esant acetonemijai, alergijai, artritui, bursitui, šokui ir tendovaginitui.

5. Kontraindikacijos

Negalima naudoti patelėms paskutiniojo vaikingumo trimestro metu, išskyrus jei norima sukelti abortą ar paankstinti atvedimą.

Negalima naudoti gyvūnams sergantiems diabetu, lėtiniu nefritu, inkstų ligomis, esant kongestiniam širdies nepakankamumui, osteoporozei, išskyrus skubios pagalbos atvejus. Negalima naudoti gyvūnams virusinės infekcijos viremijos stadijos metu.

Negalima naudoti esant padidėjusiam jautrumui veikliajai medžiagai ar bet kuriai iš pagalbinių medžiagų.

6. Specialieji įspėjimai

Specialieji įspėjimai:

Klinikiniai ir laboratoriniai duomenys rodo, kad patelėms paskutiniojo vaikingumo trimestro metu sugirdyti ar sušvirkšti kortikosteroidai gali sužadinti atsivedimą, kuris kartais gali būti komplikotas vaisiaus distocija, gaišimu, susilaikiusiomis nuovalomis ir metritu.

Kortikosteroidai naudoti vaikingoms kalėms, triušėms ir graužikams sukėlė vaisių vilko gomurį, kalėms – ir kitokius šuniukų apsigimimus, pvz., deformuotas priekines galūnes. Sisteminių kortikosteroidų negalima naudoti gyvūnams, sergantiems inkstų ligomis ir cukriniu diabetu.

Specialiosios atsargumo priemonės, naudojant vaistą paskirties gyvūnų rūšims:

Gyvūnus, kuriems naudojamas šis veterinarinis vaistas, būtina įdėmiai stebėti. Kortikosteroidai veikia priešuždegimiškai ir gali maskuoti infekcijos požymius, todėl iki bus nustatyta tiksli diagnozė, gali tekti nustoti naudoti veterinarinį vaistą. Kai kurių gliukokortikoidų perdozavimas gali skatinti natrio ir skysčių susilaikymą, kalio netekimą ir svorio prieaugį.

Specialiosios atsargumo priemonės asmenims, naudojančiams vaistą gyvūnams:

Būtina saugotis ir neį(si)švirkšti žmogui. Atsitiktinai įsišvirkštus, reikia nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti šio veterinarinio vaisto pakuotės lapelį ar etiketę.

Būtina vengti vaisto patekimo ant odos ar į akis. Atsitiktinai patekus ant odos ar į akis, būtina plauti dideliu kiekiu vandens. Sudirgimui išliekant ilgesnį laiką būtina kreiptis į gydytoją.

Žmonės, kuriems nustatytas padidėjęs jautrumas deksametazonui, turi vengti sąlyčio su šiuo veterinariniu vaistu.

Vaistą būtina naudoti apdairiai, laikantis saugumo reikalavimų. Naudojus veterinarinį vaistą, reikia plauti rankas.

Specialiosios aplinkos apsaugos priemonės:

Netaikytinos.

Vaikingumas ir laktacija:

Išskyrus jei norima sukelti atsivedimą karvėms, vaikingoms patelėms kortikosteroidų naudoti nerekomenduojama. Naudojus laboratorinių gyvūnų patelėms ankstyvuojų vaikingumo metu, buvo nustatyti vaisiaus apsigimimo atvejai. Naudojamas vėlyvuojų vaikingumo metu, veterinarinis vaistas gali sukelti abortą ar ankstyvąjį atsivedimą.

Naudojus vaistą karvėms atsivedimui sukelti, dažnai gali susilaikyti nuovalos, o vėliau pasireikšti metritas ir (ar) karvės gali sunkiau apsisėklinti.

Naudojus vaistą karvėms laktacijos metu, gali sumažėti primilžis.

Sąveika su kitais vaistais ir kitos sąveikos formos:

Nenaudoti vienu metu su fenitoinu, rifampinu ir barbituratais, nes šie vaistai gali skatinti gliukokortikoidų biotransformavimą ir mažinti deksametazono kiekį kraujyje.

Nenaudoti vienu metu su makrolidų antibiotikais (eritromicinu, klaritromicinu, tilozinu), ketokonazoliu ir kitais azolo priešgrybiniais vaistais, nes jie gali lėtinti gliukokortikoidų biotransformavimą ir didinti deksametazono kiekį kraujyje.

Naudojami vienu metu su opėjimą skatinančiais vaistais, pvz., nesteroidiniais vaistais nuo uždegimo, kortikosteroidai gali didinti virškinimo trakto opėjimo pavojų.

Kadangi kortikosteroidai gali slopinti imuninį atsaką į vakciną, vaisto negalima naudoti vienu metu su vakcinomis.

Kortikosteroidų negalima leisti į veną tuo pat metu su kalcio tirpalais. Negalima maišyti su kitais vaistais.

Perdozavimas:

Perdozavus gali pasireikšti poliurija, polidipsija ar polifagija. Ilgas kortikosteroidų naudojimas gali sukelti sunkius nepageidaujamus reiškinius. Žr.7.p. „Nepageidaujami reiškiniai“.

Specialūs naudojimo apribojimai ir specialiosios naudojimo sąlygos:

Netaikytinos.

Pagrindiniai nesuderinamumai:

Deksametazono natrio fosfato negalima derinti su daunorubicino hidrochloridu, doksorubicino hidrochloridu, metaraminolio bitartratu ir vankomicinu. Šio veterinarinio vaisto negalima maišyti su kitais veterinariniais vaistais. Žr. „Sąveika su kitais vaistais ir kitos sąveikos formos“.

7. Nepageidaujami reiškiniai

Galvijai, veršeliai, ožkos, kiaulės, šunys ir katės.

Priešuždegimiškai veikiantys kortikosteroidai, pvz., deksametazonas, gali kelti daug šalutinių poveikių. Jei vienkartinė didesnė dozė dažniausiai yra gerai toleruojama, tai naudojant ilgą laiką ar ilgo veikimo esterius, gali pasireikšti sunkūs nepageidaujami reiškiniai. Jei veterinarinį vaistą reikia naudoti ilgiau, būtina skirti mažiausias vaisto dozes, tiek kiek būtina simptomams kontroliuoti.

Nenustatytas dažnis (negali būti apskaičiuotas remiantis turimais duomenimis):	Poliuriją, polidipsiją ir polifagiją. ¹ Natrio susilaikymas, vandens susilaikymas, hipokalemija. ² Odos kalcinozė (calcinosis cutis). Uždelstas žaizdų gijimas, susilpnėjęs atsparumas esamoms infekcijoms arba jų paūmėjimas. ³ Virškinimo trakto išopėjimas. ⁴ Hepatomegalija, padidėjęs kepenų fermentų kiekis Laikina hiperglikemija.
--	---

¹Po sisteminio vartojimo, ypač ankstyvose gydymo stadijose.

²Ilgai naudojant.

³Esant bakterinei infekcijai, vartojant steroidus, dažniausiai reikalingas antibakterinis preparatas. Esant virusinėms infekcijoms, steroidai gali pabloginti arba paspartinti ligos progresavimą.

⁴Gali pasunkėti naudojant nesteroidinius vaistus nuo uždegimo, ir gyvūnams, patyrusiems nugaros smegenų traumą.

Svarbu teikti informaciją apie nepageidaujamus reiškinius. Tai leidžia nuolat stebėti vaisto saugumą. Pastebėjus bet kokią šalutinį poveikį, net ir nepaminėtą šiame pakuotės lapelyje, arba manant, kad vaistas neveikė, pirmiausia būtina informuoti veterinarijos gydytoją. Apie bet kokius nepageidaujamus reiškinius taip pat galite pranešti registruotojui arba jo vietiniam atstovui naudodamiesi šio lapelio pabaigoje pateiktais kontaktiniais duomenimis arba perduodami informaciją per savo nacionalinę pranešimų sistemą:

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba

El. paštas: vaistu.registracija@vmvt.lt

Pranešimo forma:

<https://vmvt.lrv.lt/lt/fb/>

8. Dozės, naudojimo būdai ir metodas kiekvienai rūšiai

Švirkšti į raumenis ar į veną

galvijui – 5–15 ml,

veršeliui, ožkai ar kiaulei – 1-2,5 ml,

šuniui – 0,25-1 ml,

katei – 0,25 ml.
Jei reikia, pakartotinai gydyti galima po 24-48 val.

9. Nuorodos dėl tinkamo naudojimo

Būtina laikytis įprastų aseptikos reikalavimų.

10. Išlauka

Galvijienai, ožkienai – 7 paros,
kiaulienai – 2 paros,
pienui – 72 val. (6 melžimai).

11. Specialieji laikymo nurodymai

Saugoti nuo vaikų.

Laikyti žemesnėje kaip 25 °C temperatūroje.

Atidarius laikyti šaldytuve (2–8 °C).

Talpyklę laikyti sandariai uždarytą.

Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių.

Šio veterinarinio vaisto negalima naudoti pasibaigus tinkamumo laikui, nurodytam ant etiketės ir dėžutės po {Exp.}. Vaistas tinkamas naudoti iki paskutinės nurodyto mėnesio dienos.

.

Tinkamumo laikas, pirmą kartą atidarius pirminę pakuotę, – 2 sav.

12. Specialiosios atliekų naikinimo nuostatos

Vaistų negalima išmesti į kanalizaciją ar su buitinėmis atliekomis.

Nesunaudotas veterinarinis vaistas ar su juo susijusios atliekos turi būti sunaikintos pagal šalies reikalavimus ir visas atitinkamam veterinariniam vaistui taikytinas nacionalines surinkimo sistemas. Šios priemonės turi padėti apsaugoti aplinką.

Veterinarijos gydytojas arba vaistininkas gali patarti, ką daryti su nereikalingais vaistais.

13. Veterinarinių vaistų klasifikacija

Parduodama tik su veterinariniu receptu.

14. Registracijos numeriai ir pakuočių dydžiai

LT/2/10/2010/001

Pakuočių dydžiai: 50 ml

15. Pakuotės lapelio paskutinės peržiūros data

2026-01-17

Išsamią informaciją apie šį veterinarinį vaistą galima rasti Sąjungos vaistų duomenų bazėje (<https://medicines.health.europa.eu/veterinary>).

16. Kontaktiniai duomenys

Registruotojas ir kontaktiniai duomenys, skirti pranešti apie įtariamus nepageidaujamus reiškinius:

UAB „Interchemie werken „De Adelaar“ LT“

Terminalo g. 13, Biruliškės

LT-54469, Kauno r.

Lietuva

Tel.: +37065571517

E-mail: marius@interchemie.lt

Gamintojas, atsakingas už vaisto serijos išleidimą:

Interchemie werken „De Adelaar“ Eesti AS,

Vanapere tee 14, Püüsi, Viimsi,

Harjumaa 74013,

Estija

Tel: +372 6 00 50 05

E-mail: coo@interchemie.com

PharmaPark Production OÜ

Nuia tn 2 Tallinn Harjumaa 11415

Estija