

ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG

FALTSCHACHTEL (250 ml oder 500 ml)

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

DUOWIN, Spray zur Anwendung auf der Haut, Lösung für Hunde

2. WIRKSTOFF(E)

100 ml Lösung enthalten:

Wirkstoff(e):

Permethrin	1,88 g
Pyriproxyfen	20,00 mg

3. DARREICHUNGSFORM

Spray zur Anwendung auf der Haut, Lösung.

4. PACKUNGSGRÖSSE(N)

Sprühdose mit 250 ml

Sprühdose mit 500 ml

5. ZIELTIERART(EN)

Hund

6. ANWENDUNGSGEBIET(E)

Zur Behandlung und Vorbeugung von Floh- (*Ctenocephalides felis*) und Zeckenbefall (*Rhipicephalus sanguineus*, *Ixodes ricinus*).

Bei Flöhen:

Zur Behandlung und Vorbeugung eines erneuten Befalls mit ausgewachsenen Flöhen bis zu 6 Wochen.

Zur Vorbeugung gegen die Vermehrung von Flöhen bis zu 10 Wochen durch Sterilisierung der Eier.

Bei Zecken:

Zur Behandlung und Vorbeugung eines erneuten Befalls bis zu 4 Wochen.

7. ART DER ANWENDUNG

Nur zur äußerlichen Anwendung.

Ein Pumpstoß ergibt ca. 3,0 ml Lösung.

Die Dosierung beträgt 5 ml der Lösung pro kg Körpergewicht, d.h. etwa 5 Pumpstöße pro 3 kg Körpergewicht.

Dies entspricht 94 mg Permethrin und 1 mg Pyriproxyfen pro kg Körpergewicht.

Gewicht des Hundes	3 kg	7 kg	10 kg	15 kg	20 kg	30 kg	40 kg
Anzahl der Pumpstöße	5	12	17	25	34	50	67

Die Lösung auf das Fell des Tieres sprühen (Augenumgebung vermeiden), so dass es völlig durchfeuchtet ist. Während des Einsprühens das Fell gegen den Strich anheben, damit das Präparat gut bis zur Haut vordringt. Man sollte darauf achten, dass das Produkt nicht in die Augen des Tieres gelangt. Das Produkt auf natürliche Weise trocknen lassen, ohne das Fell trocken zu reiben.

Hunde nach der Behandlung weder waschen noch einshampoonieren.

Müssen Sie Ihren Hund shampoonieren, wird empfohlen, anschließend die Behandlung mit dem Präparat zu wiederholen, um den Schutz gegen Floh- und Zeckenbefall zu gewährleisten.

Hunde, die mehrfach heftigen Regenfällen ausgesetzt wurden oder öfters in Gewässer geschwommen sind, sollten erneut behandelt werden.

Das Präparat ist ein verschreibungspflichtiges Tierarzneimittel und wird je nach parasitärem Befall angewendet. Bei starkem Flohbefall können neue Behandlungen im monatlichen Abstand vorgenommen werden.

8. WARTEZEIT(EN)

9. BESONDERE WARNHINWEISE, SOWEIT ERFORDERLICH

Nicht bei Katzen anwenden, da Nebenwirkungen und sogar Todesfälle auftreten können.

Nicht bei Welpen unter 2 Monaten anwenden.

Nicht bei kranken oder rekonvaleszenten Hunden anwenden.

Es ist zu vermeiden, dass behandelte Tiere sich lecken und in Haushalten mit mehreren Tieren, dass andere Tiere den behandelten Hund lecken, zumindest bis das Fell trocken ist.

BRENNBAR!

Halten Sie behandelte Tiere von offenen Flammen und anderen Hitzequellen, zumindest bis zu 30 Minuten nach der Behandlung und bis das Fell vollständig trocken ist, fern.

Unterdosierung sollte vermieden werden, um die Wirkungsdauer zu gewährleisten.

Das Gewicht des Tieres sollte genau ermittelt werden, um beim Auftragen des Produktes die empfohlene Anzahl von Pumpstößen einzuhalten.

Sollte der Befall anhalten oder Zeichen einer Erkrankung auftreten, ist der Tierarzt aufzusuchen.

Flöhe befallen häufig das Körbchen und die Umgebung des Haustieres (Teppiche und Gardinen), die mit einem angemessenen Ungeziefermittel behandelt und regelmäßig staubgesaugt werden sollten. Diese Maßnahmen tragen zur Reduzierung des Flohbefalls in der Umgebung bei und verlängern den Schutzeffekt gegen Neubefall.

Lesen Sie die Packungsbeilage hinsichtlich Informationen zu den besonderen Vorsichtsmaßnahmen für den Anwender.

10. VERFALLDATUM

Verwendbar bis:

11. BESONDERE LAGERUNGSBEDINGUNGEN

Das Behältnis senkrecht lagern.
Die Flasche in der Faltschachtel aufbewahren.

12. BESONDERE VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DIE ENTSORGUNG VON NICHT VERWENDETEN ARZNEIMITTELN ODER VON ABFALLMATERIALIEN, SOFERN ERFORDERLICH

Gefährlich für Fische und Krustentiere.
Nicht in Räumen anwenden, in denen sich Aquarien befinden.
Gewässer und Gräben mit Produktresten und leeren Behältnissen nicht verseuchen.
Abfallmaterialien sind entsprechend den nationalen Vorschriften zu entsorgen

13. VERMERK "FÜR TIERE" SOWIE BEDINGUNGEN ODER BESCHRÄNKUNGEN FÜR EINE SICHERE UND WIRKSAME ANWENDUNG DES TIERARZNEIMITTELS, SOFERN ZUTREFFEND

Für Tiere.
Rezept- und apothekenpflichtig.

14. KINDERWARNHINWEIS "ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN"

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

15. NAME UND ANSCHRIFT DES ZULASSUNGSINHABERS

Zulassungsinhaber:
Virbac
1ère avenue - L.I.D. - 2065 m
06516 CARROS
FRANKREICH

Vertrieb:
Virbac Österreich GmbH A-1204 Wien

16. ZULASSUNGSNUMMER(N)

Z.Nr.: 8-00428

17. CHARGENBEZEICHNUNG DES HERSTELLERS

Ch.-B. {Nummer}

ANGABEN AUF DEM BEHÄLTNIS

Sprühdose (250 ml oder 500 ml)

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

DUOWIN, Spray zur Anwendung auf der Haut, Lösung für Hunde

2. WIRKSTOFF(E)

100 ml Lösung enthalten:

Wirkstoff(e):

Permethrin	1,88 g
Pyriproxyfen	20,00 mg

3. DARREICHUNGSFORM

Spray zur Anwendung auf der Haut, Lösung.

4. PACKUNGSGRÖSSE(N)

Sprühdose mit 250 ml

Sprühdose mit 500 ml

5. ZIELTIERART(EN)

Hund

6. ANWENDUNGSGEBIET(E)

Zur Behandlung und Vorbeugung von Floh- (*Ctenocephalides felis*) und Zeckenbefall (*Rhipicephalus sanguineus*, *Ixodes ricinus*).

Bei Flöhen:

Zur Behandlung und Vorbeugung eines erneuten Befalls mit ausgewachsenen Flöhen bis zu 6 Wochen.

Zur Vorbeugung gegen die Vermehrung von Flöhen bis zu 10 Wochen durch Sterilisierung der Eier.

Bei Zecken:

Zur Behandlung und Vorbeugung eines erneuten Befalls bis zu 4 Wochen.

7. ART DER ANWENDUNG

Nur zur äußerlichen Anwendung.

Ein Pumpstoß ergibt ca. 3,0 ml Lösung.

Die Dosierung beträgt 5 ml der Lösung pro kg Körpergewicht, d.h. etwa 5 Pumpstöße pro 3 kg Körpergewicht.

Dies entspricht 94 mg Permethrin und 1 mg Pyriproxyfen pro kg Körpergewicht.

Gewicht des Hundes	3 kg	7 kg	10 kg	15 kg	20 kg	30 kg	40 kg
Anzahl der Pumpstöße	5	12	17	25	34	50	67

Die Lösung auf das Fell des Tieres sprühen (Augenumgebung vermeiden), so dass es völlig durchfeuchtet ist. Während des Einsprühens das Fell gegen den Strich anheben, damit das Präparat gut bis zur Haut vordringt. Man sollte darauf achten, dass das Produkt nicht in die Augen des Tieres gelangt. Das Produkt auf natürliche Weise trocknen lassen, ohne das Fell trocken zu reiben.

Hunde nach der Behandlung weder waschen noch einshampoonieren.

Müssen Sie Ihren Hund shampoonieren, wird empfohlen, anschließend die Behandlung mit dem Präparat zu wiederholen, um den Schutz gegen Floh- und Zeckenbefall zu gewährleisten.

Hunde, die mehrfach heftigen Regenfällen ausgesetzt wurden oder öfters in Gewässer geschwommen sind, sollten erneut behandelt werden.

Das Präparat ist ein verschreibungspflichtiges Tierarzneimittel und wird je nach parasitärem Befall angewendet. Bei starkem Flohbefall können neue Behandlungen im monatlichen Abstand vorgenommen werden.

8. WARTEZEIT(EN)

9. BESONDERE WARNHINWEISE, SOWEIT ERFORDERLICH

Nicht bei Katzen anwenden, da Nebenwirkungen und sogar Todesfälle auftreten können.

Nicht bei Welpen unter 2 Monaten anwenden.

Nicht bei kranken oder rekonvaleszenten Hunden anwenden.

Es ist zu vermeiden, dass behandelte Tiere sich lecken und in Haushalten mit mehreren Tieren, dass andere Tiere den behandelten Hund lecken, zumindest bis das Fell trocken ist.

BRENNBAR!

Halten Sie behandelte Tiere von offenen Flammen und anderen Hitzequellen, zumindest bis zu 30 Minuten nach der Behandlung und bis das Fell vollständig trocken ist, fern.

Unterdosierung sollte vermieden werden, um die Wirkungsdauer zu gewährleisten.

Das Gewicht des Tieres sollte genau ermittelt werden, um beim Auftragen des Produktes die empfohlene Anzahl von Pumpstößen einzuhalten.

Sollte der Befall anhalten oder Zeichen einer Erkrankung auftreten, ist der Tierarzt aufzusuchen.

Flöhe befallen häufig das Körbchen und die Umgebung des Haustieres (Teppiche und Gardinen), die mit einem angemessenen Ungeziefermittel behandelt und regelmäßig staubgesaugt werden sollten. Diese Maßnahmen tragen zur Reduzierung

des Flohbefalls in der Umgebung bei und verlängern den Schutzeffekt gegen Neubefall.

Lesen Sie die Packungsbeilage hinsichtlich Informationen zu den besonderen Vorsichtsmaßnahmen für den Anwender.

10. VERFALLDATUM

Verwendbar bis:

11. BESONDERE LAGERUNGSBEDINGUNGEN

Das Behältnis senkrecht lagern.
Die Flasche in der Faltschachtel aufbewahren.

12. BESONDERE VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DIE ENTSORGUNG VON NICHT VERWENDETEN ARZNEIMITTELN ODER VON ABFALLMATERIALIEN, SOFERN ERFORDERLICH

Gefährlich für Fische und Krustentiere.
Nicht in Räumen anwenden, in denen sich Aquarien befinden.
Gewässer und Gräben mit Produktresten und leeren Behältnissen nicht verseuchen.
Abfallmaterialien sind entsprechend den nationalen Vorschriften zu entsorgen

13. VERMERK "FÜR TIERE" SOWIE BEDINGUNGEN ODER BESCHRÄNKUNGEN FÜR EINE SICHERE UND WIRKSAME ANWENDUNG DES TIERARZNEIMITTELS, SOFERN ZUTREFFEND

Für Tiere.
Rezept- und apothekenpflichtig.

14. KINDERWARNHINWEIS "ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN"

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

15. NAME UND ANSCHRIFT DES ZULASSUNGSINHABERS

Zulassungsinhaber:
Virbac
1ère avenue - L.I.D. - 2065 m
06516 CARROS
FRANKREICH

Vertrieb:
Virbac Österreich GmbH A-1204 Wien

16. ZULASSUNGSNUMMER(N)

Z.Nr.: 8-00428

17. CHARGENBEZEICHNUNG DES HERSTELLERS

Ch.-B. {Nummer}