

ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЕ ИЗПИСВА ВЪРХУ ВЪНШНАТА ОПАКОВКА

Картонена кутия

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНИЯ ЛЕКАРСТВЕН ПРОДУКТ

DYNACAN 50 mg/60 mg разтвор за прилагане върху ограничен участък за котки и фретки

2. КОЛИЧЕСТВО НА АКТИВНИТЕ ВЕЩЕСТВА

Всяка пипета от 0.5 ml съдържа:

Активни вещества:

Fipronil	50.00 mg
(S)-methoprene	60.00 mg

3. РАЗМЕР НА ОПАКОВКАТА

1 x 0.5 ml
2 x 0.5 ml
3 x 0.5 ml
2 блистера x 2 x 0.5 ml
2 блистера x 3 x 0.5 ml

4. ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВЛП

Котки и фретки.

5. ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ

При котки:

За лечение и предотвратяване на опаразитяване с бълхи, самостоятелно или при съвместно опаразитяване с кърлежи и/или хапещи въшки.

- Елиминиране на бълхи (*Ctenocephalides* spp.). Продължителността на инсектицидната ефикасност срещу нови опаразитявания с възрастни бълхи е 4 седмици. Продължителността на предпазването от размножаване на бълхите, чрез потискане развитието на техните яйца (овицидна активност), ларви и какавиди (ларвицидна активност), свързано със снасянето на яйца от страна на възрастните бълхи, е шест седмици след прилагането на продукта.

- Елиминиране на кърлежи (*Ixodes* spp., *Dermacentor* spp., *Rhipicephalus sanguineus*). Продължителността на акарицидната ефикасност срещу кърлежи е до 2 седмици (основано на експериментални данни).

- Елиминиране на хапещи въшки (*Felicola subrostratus*).

Ветеринарният лекарствен продукт може да бъде използван като част от терапевтичната стратегия за контрол на алергичния дерматит, причинен от бълхи (FAD).

При фретки:

- За лечение и предотвратяване на опаразитяване с бълхи, самостоятелно или при съвместно опаразитяване с кърлежи.
- Елиминиране на бълхи (*Ctenocephalides* spp.). Продължителността на инсектицидната ефикасност срещу нови опаразитявания с възрастни бълхи е 4 седмици.
- Продължителността на предпазването от размножаване на бълхите, чрез потискане развитието на техните яйца (овицидна активност), ларви и какавиди (ларвицидна активност), свързано със снасянето на яйца от страна на възрастните бълхи, е 4 седмици след прилагането на продукта.
- Елиминиране на кърлежи (*Ixodes ricinus*). Продължителността на акарицидната ефикасност срещу кърлежи е 4 седмици (основано на експериментални данни).

6. НАЧИНИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Разтвор за прилагане върху ограничен участък.

7. КАРЕНТНИ СРОКОВЕ

Не е приложимо

8. СРОК НА ГОДНОСТ

Ехр. { мм/гггг }

След отваряне използвай незабавно.

9. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ

Да се съхранява в оригиналната опаковка.

Този ветеринарен лекарствен продукт не изисква никакви специални условия за съхранение.

10. НАДПИСЪТ „ПРЕДИ УПОТРЕБА ПРОЧЕТЕТЕ ЛИСТОВКАТА“

Преди употреба прочетете листовката.

11. НАДПИСЪТ “САМО ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКА УПОТРЕБА”

Само за ветеринарномедицинска употреба.

12. НАДПИСЪТ “ДА СЕ СЪХРАНЯВА ДАЛЕЧ ОТ ПОГЛЕДА И НА НЕДОСТЪПНИ ЗА ДЕЦА МЕСТА”

Да се съхранява далеч от погледа и на недостъпни за деца места.

13. ИМЕ НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ТЪРГОВИЯ

LABORATORIOS CALIER, S.A.

14. НОМЕРА НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА ТЪРГОВИЯ НА ВЛП
--

0022-2953

15. ПАРТИДЕН НОМЕР

Lot {номер}

**МИНИМУМ ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО ТРЯБВА ДА БЪДЕ ИЗПИСАНА ВЪРХУ
МАЛКИ ОПАКОВКИ ВЛП, КОИТО СЪДЪРЖАТ ЕДИНИЧНА ДОЗА**

Пипета

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНИЯ ЛЕКАРСТВЕН ПРОДУКТ

DYNACAN 50 mg/60 mg разтвор за прилагане върху ограничен участък за котки и фретки

2. КОЛИЧЕСТВО НА АКТИВНИТЕ ВЕЩЕСТВА

Всяка пипета от 0.5 ml съдържа:

Активни вещества:

Fipronil	50.00 mg
(S)-methoprene	60.00 mg

3. ПАРТИДЕН НОМЕР

Lot {номер}

4. СРОК НА ГОДНОСТ

Ехр. {мм/гггг}

След отваряне използвай незабавно.

X

Д-Р КРАСИМИР ЗЛАТКОВ
ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ КВЛП