

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Bobi Star 744 mg rácsepegtető oldat kutyák részére A.U.V.

1. A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY JOGOSULTJÁNAK, TOVÁBBÁ AMENNYIBEN ETTŐL ELTÉR, A GYÁRTÁSI TÉTELEK FELSZABADÍTÁSÁÉRT FELELŐS GYÁRTÓNAK A NEVE ÉS CÍME

A forgalomba hozatali engedély jogosultja:

FORTEVIT Kft. (7100 Szekszárd, Rákóczi u. 142-146.)

A gyártási tételek felszabadításáért felelős gyártó:

Primavet Produkt Kft., H-1108 Budapest, Gumigyár utca 5-7.

Forgalmazó: Tolnagro Kft., H-7100 Szekszárd Rákóczi utca 142.-146.

2. AZ ÁLLATGYÓGYÁSZATI KÉSZÍTMÉNY NEVE

Bobi Star 744 mg rácsepegtető oldat kutyák részére A.U.V.

3. HATÓANYAGOK ÉS EGYÉB ÖSSZETEVŐK MEGNEVEZÉSE

Egy ml készítmény tartalmaz:

Hatóanyag

Permetrin (cisz:transz/25:75) 744 mg

4. JAVALLAT(OK)

Bolhák (*Ctenocephalides felis*), valamint kullancsok (*Ixodes ricinus* és *Rhipicephalus sanguineus*) okozta fertőzöttség kezelésére kutyákban.

A bolhák elleni inszekticid hatás 4 hétig tart.

A készítmény kullancsok ellen (*Ixodes ricinus* és *Rhipicephalus sanguineus*) 4 hétig tartó folyamatos atkaölő hatással rendelkezik.

5. ELLENJAVALLATOK

Nem alkalmazható három hónaposnál fiatalabb kutyákon.

Nem alkalmazható 2 kg alatti testtömegű kutyákon.

Nem alkalmazható beteg, lábadozó, illetve bőrsérüléssel rendelkező állaton.

A KÉSZÍTMÉNY NEM ALKALMAZHATÓ MACSKÁK KEZELÉSÉRE. Rendkívül mérgező macskára, használata az állat elpusztulását is okozhatja. Meg kell akadályozni, hogy a macska közvetlen érintkezésbe kerüljön a termékkel, ezért a kutyákat kezelés után 72 óráig távol kell tartani a macskáktól. Véletlen érintkezés esetén azonnal állatorvoshoz kell fordulni. Nem alkalmazható a hatóanyaggal vagy bármely segédanyaggal szembeni túlérzékenység esetén.

6. MELLÉKHATÁSOK

Néhány esetben a készítmény a kezelés helyén enyhe, körülírt irritációt válthat ki, amely 48 órán belül

elmúlik. A kezelés helyén átmenetileg alopecia előfordulhat.

Átmeneti túlérzékenység, illetve vakaródzás előfordulása lehetséges a kezelés után.

Ritkán a központi idegrendszer akut intoxikációja, valamint a gyomor-, bélcsatorna rendellenességeire utaló tünetek előfordulhatnak.

Ha súlyos nemkívánatos hatást vagy egyéb, ebben a használati utasításban nem szereplő hatásokat észlel, értesítse erről a kezelő állatorvost!

7. CÉLÁLLAT FAJ(OK)

Kutya

8.-9. ADAGOLÁS, ALKALMAZÁSI MÓD(OK) CÉLÁLLAT FAJONKÉNT, A HELYES ALKALMAZÁSRA VONATKOZÓ JAVASLAT

Kizárólag külsőleges alkalmazásra.

2-15 kg közötti testtömegű kutyák részére:

Az állat hátán a lapockák közötti területen hajtogassuk szét a szőrzetet, úgy, hogy a bőr jól láthatóvá váljon. A tubus végének levágása után a tubus megnyomásával juttassuk a készítményt közvetlenül a bőrre. Ügyeljünk arra, hogy az oldat a bőrfelületre, és ne a szőrre kerüljön! Csak ép bőrfelületen alkalmazzuk!

15 kg fölötti testtömegű kutyák részére:

Két tubus szükséges. Az első tubust az előzőhöz hasonlóan, a második tubust pedig a faroktő tájékánál cseppentsük a bőrfelületre.

Ismételt kezelés az alkalmazást követően leghamarabb 14 nap múlva lehetséges.

10. ÉLELMÉZÉS-EGÉSZSÉGÜGYI VÁRAKOZÁSI IDŐ(K)

Nem értelmezhető.

11. KÜLÖNLEGES TÁROLÁSI ELŐÍRÁSOK

Gyermekek elől gondosan el kell zárni!

25 °C alatt, fénytől védve, az eredeti csomagolásban tárolandó. Hűtőben nem tárolható. Ezt az állatgyógyászati készítményt csak a címkén feltüntetett lejáratidőn belül szabad felhasználni! A lejáratidő az adott hónap utolsó napjára vonatkozik.

12. KÜLÖNLEGES FIGYELMEZTETÉS(EK)

Különleges figyelmeztetések minden célállat fajra vonatkozóan:

A készítmény első használata során az állat bőrének kezelt területén átmenetileg zsíros folt képződhet.

Világos szőrzetű kutyánál ez a folt sárgás színben jelenhet meg. Ha a foltok nem múlnak el, javasolt felkeresni az állatorvost.

A kezelt állatokra vonatkozó különleges óvintézkedések:

Kezelést követően az állatokat nem szabad természetes vízben úszni hagyni, mert a készítmény mérgező lehet a halakra és más vízi élőlényekre. Kerüljük a kezelt állat gyakori úsztatását, fürdetését, valamint samponozását, mert mindez csökkenti a készítmény hatékonyságát.

Egy házban több kutya tartása esetén minden állat egyidejű kezelése szükséges. Ezekben a házakban élő macskákat azonos javallatra engedélyezett készítménnyel kell kezelni. Az állatokról származó bolhák gyakran elszaporodnak az állatok kosarában, fekvő-, és pihenőhelyén, a padlón és a kárpitokon. Ezeket a helyeket megfelelő rovarirtó szerrel kell kezelni és rendszeresen porszívózni kell.

Meg kell akadályozni, hogy a kutyák a kezelés helyét nyalogassák. A kutyákat az esti órákban ajánlott kezelni. A kezelt állatokat ne engedjük együtt aludni az emberekkel, különösen a gyermekekkel.

Az állatok kezelését végző személyre vonatkozó különleges óvintézkedések:

A termék kézzel való közvetlen érintkezése kerülendő. Véletlen bőrre kerülés esetén az érintett bőrfelületet meleg szappanos vízzel azonnal le kell mosni. Emberekben a permetrin érintése egy-két órás lappangási idő után fonákérzést, úgynevezett paresztéziát válthat ki. A készítmény használata során védőkesztyűt kell viselni. A készítmény többszöri használata esetén, pl. kutyatenyészetekben, a 0,3 mm vastag neoprén, vagy nitril anyagból készült kesztyűt kell viselni.

A kezelt bőrfelületet a kezelés után 3-6 órán át nem szabad megérinteni.

A termék nyálkahártya- és szemirritációt okozhat. Ezért el kell kerülni a terméknek a szembe, illetve szájba jutását. Ha szembe kerül, bő vízzel azonnal ki kell mosni. Tartós bőrizgató hatás és/vagy szemizgató hatás esetén orvoshoz kell fordulni.

Véletlen lenyelés esetén haladéktalanul orvoshoz kell fordulni, bemutatva a készítmény használati utasítását vagy címkéjét. Szintetikus piretroidok iránti ismert túlérzékenység esetén kerülni kell az állatgyógyászati készítménnyel való érintkezést.

A kezelés alatt enni, inni, dohányozni tilos. Kezelés után meleg szappanos vízzel kezét kell mosni.

Ne engedjük nyílt láng közelébe a készítménnyel kezelt állatokat a kezelt bőrfelület megszáradásáig.

Vemhesség, laktáció:

Patkányon végzett laboratóriumi vizsgálatok eredményei a készítmény főtotoxicitását mutatták ki.

Vemhesség és laktáció ideje alatt nem alkalmazható.

Túladagolás (tünetek, sürgősségi intézkedések, antidotumok):

A javasolt dózis kétszerese nem okozott mellékhatásokat felnőtt kutyáknál. A túladagolás klinikai tünetei jellemzőek a szintetikus piretroidok által okozott mérgezésekre. Ezek a túlzott mértékű nyálzás, hasmenés, izomremegés, és túlérzékenység. Súlyosabb esetben hipotermia, hipertermia, diszpnóe és rángatózás léphet fel. Ha a túladagolás tünetei jelentkeznek, a kutyát antiparazitikumtól mentes samponnal kell megfürdetni, majd tüneti kezelés javasolt. A piretroidok által okozott mérgezésnek nincs specifikus antidotuma.

13. A FEL NEM HASZNÁLT KÉSZÍTMÉNY VAGY HULLADÉKAINAK ÁRTALMATLANNÁ TÉTELÉRE VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK (AMENNYIBEN SZÜKSÉGESEK)

A Bobi Star 744 mg rácsepegtető oldat kutyák részére A.U.V. készítmény nem kerülhet természetes vizekbe, valamint a csatornába, mert nagyon mérgező a halakra és más vízi élőlényekre. Mérgező a méhekre.

Kérdezze meg a kezelő állatorvost, hogy milyen módon semmisítse meg a továbbiakban nem szükséges állatgyógyászati készítményeket! Ezek az intézkedések a környezetet védik.

14. A HASZNÁLATI UTASÍTÁS UTOLSÓ JÓVÁHAGYÁSÁNAK IDŐPONTJA 2023.szeptember 14.

15. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

Rendelhetőség:

Kizárólag állatgyógyászati felhasználásra. Vénymentes.

Forgalmazhatóság:

Szabadon forgalmazható.

Kiszerezési egységek:

1 ml oldat fehér polietilén tubusban, propilén csavaros kupakkal lezárva.
1,2 vagy 3 tubus kartondobozban.

Előfordulhat, hogy nem minden kiszerezés kerül kereskedelmi forgalomba.

Az állatgyógyászati készítménnyel kapcsolatos további kérdéseivel forduljon a forgalomba hozatali engedély jogosultjának helyi képviselőjéhez.