

## ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG: Umkarton

### 1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

**Vetramycin DC - Salbe zur intramammären Anwendung für Rinder**

### 2. WIRKSTOFF(E) UND SONSTIGE BESTANDTEILE

1 Injektor zu 9 g enthält

**Wirkstoffe:**

1 Mio. I.E. Benzylpenicillin-Procaïn, 1 Mio. I.E. Dihydrostreptomycinsulfat,  
10.000 I.E. Retinolpalmitat (= Vitamin A-Palmitat), 100 mg Calcium-d-Pantothenat,

**Sonstige Bestandteile**

Butylhydroxytoluol (Konservierungsmittel)

Aluminiummonostearat

### 3. DARREICHUNGSFORM

entfällt – ist in der Bezeichnung enthalten.

### 4. PACKUNGSGRÖSSE(N)

4 x 9g, 12 x 9g, 24 x 9g

### 5. ZIELTIERART(EN)

Rind (trockenstehende Milchkühe)

### 6. ANWENDUNGSGEBIET(E)

Zur Behandlung subklinischer Euterentzündungen zum Zeitpunkt des Trockenstellens sowie zur Behandlung akuter Euterentzündungen während der Trockenstehzeit verursacht durch gegenüber Penicillin oder Streptomycin empfindliche Streptokokken und Staphylokokken (nicht Penicillinase-bildende). Zur präventiven Behandlung von Euterentzündungen verursacht durch gegenüber Penicillin oder Streptomycin empfindliche *Trueperella pyogenes* (*Arcanobacterium pyogenes*) während der Trockenstehzeit.

### 7. ART DER ANWENDUNG

Zur intramammären Anwendung

### 8. WARTEZEIT

Wartezeit:

Essbare Gewebe: 21 Tage

Milch: bei Applikation früher als 35 Tage vor dem Abkalben: 5 Tage ab Laktationsbeginn

bei Applikation innerhalb von 35 Tagen vor dem Abkalben: 40 Tage ab Verabreichung

**9. BESONDERE WARNHINWEISE, SOWEIT ERFORDERLICH**

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

**10. VERFALLDATUM**

Verwendbar bis {MM/JJJJ}

**11. BESONDERE LAGERUNGSBEDINGUNGEN**

Nicht über 25°C lagern.

In der Originalverpackung aufbewahren, um den Inhalt vor Licht zu schützen.

**12. BESONDERE VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DIE ENTSORGUNG VON NICHT VERWENDETEN ARZNEIMITTELN ODER VON ABFALLMATERIALIEN, SOFERN ERFORDERLICH**

Entsorgungshinweis: Siehe Packungsbeilage !

**13. VERMERK "FÜR TIERE" SOWIE BEDINGUNGEN ODER BESCHRÄNKUNGEN FÜR EINE SICHERE UND WIRKSAME ANWENDUNG DES TIERARZNEIMITTELS, SOFERN ZUTREFFEND**

Für Tiere

Rezept- und apothekenpflichtig

**14. KINDERWARNHINWEIS " ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN"**

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

**15. NAME UND ANSCHRIFT DES ZULASSUNGSINHABERS**

V.M.D.n.v.  
Hoge Mauw 900  
2370 Arendonk  
Belgium

**16. ZULASSUNGSNUMMER(N)**

Z. Nr.: 17939

**17. CHARGENBEZEICHNUNG DES HERSTELLERS**

Ch.-B. {Nummer}

**MINDESTANGABEN AUF KLEINEN BEHÄLTNISSEN**

Injektor zu 9g

**1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Vetramycin DC - Salbe zur intramammären Anwendung für Rinder

**2. WIRKSTOFF(E) NACH ART UND MENGE**

1 Injektor zu 9 g enthält

**Wirkstoffe:**

1 Mio. I.E. Benzylpenicillin-Procain, 1 Mio. I.E. Dihydrostreptomycinsulfat,  
10.000 I.E. Retinolpalmitat (= Vitamin A-Palmitat), 100 mg Calcium-d-Pantothenat

**3. INHALT NACH GEWICHT, VOLUMEN ODER STÜCKZAHL**

9 g

**4. ART(EN) DER ANWENDUNG**

intramammär

**5. WARTEZEIT**

Wartezeit: siehe Umkarton

**6. CHARGENBEZEICHNUNG**

Ch.-B. {Nummer}

**7. VERFALLDATUM**

Verwendbar bis {MM/JJJJ}

**8. VERMERK " FÜR TIERE"**

Für Tiere