

Wortlaut der für die äußere Umhüllung vorgesehenen Angaben

ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG

Umkarton für 1 Flasche à 125 ml
Umkarton für 1 Flasche à 250 ml
Umkarton für 1 Flasche à 500 ml
Umkarton für 1 Flasche à 1 l

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Gabbrovet Multi 140 mg/ml Lösung zum Eingeben über das Trinkwasser/die Milch für noch nicht wiederkäuende Kälber und Schweine

2. WIRKSTOFF(E)

1 ml enthält 140,0 mg Paromomycin (als Sulfat), entsprechend 140.000 IE Paromomycinaktivität oder etwa 200 mg Paromomycinsulfat.

3. PACKUNGSGRÖSSE(N)

125 ml
250 ml
500 ml
1 l

4. ZIELTIERART(EN)

Rind (Kalb, noch nicht wiederkäuend und Kalb, neugeboren) und Schwein

5. ANWENDUNGSGEBIETE

6. ARTEN DER ANWENDUNG

Zum Eingeben.

7. WARTEZEITEN

Wartezeiten:

Rinder (Kalb, noch nicht wiederkäuend und Kalb, neugeboren):

- Kolibazillose: Dosierung: 25–50 mg/kg/Tag für 3–5 Tage. Essbare Gewebe: 20 Tage
- Kryptosporidiose: Dosierung: 150 mg/kg/Tag für 5 Tage. Essbare Gewebe: 110 Tage

Schweine: Essbare Gewebe: 3 Tage

Wegen der Akkumulation von Paromomycin in der Leber und den Nieren sind jegliche wiederholte Behandlungszyklen während der Wartezeit zu vermeiden.

8. VERFALLDATUM

Exp.:

Für 125-ml-, 250-ml-, 500-ml- und 1-l-HDPE-Flaschen:

Nach erstmaligem Öffnen innerhalb von 6 Monaten bis __/__/__ verbrauchen. Nach Verdünnen in Trinkwasser innerhalb von 24 Stunden verbrauchen. Nach Verdünnen in Milch oder Milchaustauscher innerhalb von 6 Stunden verbrauchen.

Für 250-ml-, 500-ml- und 1-l-HDPE/EVOH/HDPE-Flaschen:

Nach erstmaligem Öffnen innerhalb von 3 Monaten bis __/__/__ verbrauchen. Nach Verdünnen in Trinkwasser innerhalb von 24 Stunden verbrauchen. Nach Verdünnen in Milch oder Milchaustauscher innerhalb von 6 Stunden verbrauchen.

9. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Flasche nach erstmaligem Öffnen/Anbruch fest verschlossen halten.

Für 125-ml- und 250-ml-HDPE-Flaschen: Nicht über 25 °C lagern.

10. VERMERK „LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG DIE PACKUNGSBEILAGE.“

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

11. VERMERK „NUR ZUR BEHANDLUNG VON TIEREN“

Nur zur Behandlung von Tieren.

12. KINDERWARNHINWEIS „ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN“

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

13. NAME DES ZULASSUNGSINHABERS



14. ZULASSUNGSNUMMERN

DE: V7005865.00.00

AT: Z.Nr.: 841400

15. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot:

Wortlaut der für das Behältnis vorgesehenen Angaben

ANGABEN AUF DEM BEHÄLTNIS

Kennzeichnung für 1 Flasche à 125 ml

Kennzeichnung für 1 Flasche à 250 ml

Kennzeichnung für 1 Flasche à 500 ml

Kennzeichnung für 1 Flasche à 1 l

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Gabbrovet Multi 140 mg/ml Lösung zum Eingeben über das Trinkwasser/die Milch für noch nicht wiederkäuende Kälber und Schweine

2. WIRKSTOFF(E)

1 ml enthält 140,0 mg Paromomycin (als Sulfat), entsprechend 140.000 IE Paromomycinaktivität oder etwa 200 mg Paromomycinsulfat.

3. ZIELTIERART(EN)

Rind (Kalb, noch nicht wiederkäuend und Kalb, neugeboren) und Schwein

4. ARTEN DER ANWENDUNG

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

5. WARTEZEITEN

Wartezeiten:

Rinder (Kalb, noch nicht wiederkäuend und Kalb, neugeboren):

- Kolibazillose: Dosierung: 25–50 mg/kg/Tag für 3–5 Tage. Essbare Gewebe: 20 Tage
- Kryptosporidiose: Dosierung: 150 mg/kg/Tag für 5 Tage. Essbare Gewebe: 110 Tage

Schweine: Essbare Gewebe: 3 Tage

Wegen der Akkumulation von Paromomycin in der Leber und den Nieren sind jegliche wiederholte Behandlungszyklen während der Wartezeit zu vermeiden.

6. VERFALLDATUM

Exp.:

Für 125-ml-, 250-ml-, 500-ml- und 1-l-HDPE-Flaschen:

Nach erstmaligem Öffnen innerhalb von 6 Monaten bis __/__/__ verbrauchen. Nach Verdünnen in Trinkwasser innerhalb von 24 Stunden verbrauchen. Nach Verdünnen in Milch oder Milchaustauscher innerhalb von 6 Stunden verbrauchen.

Für 250-ml-, 500-ml- und 1-l-HDPE/EVOH/HDPE-Flaschen:

Nach erstmaligem Öffnen innerhalb von 3 Monaten bis __/__/__ verbrauchen. Nach Verdünnen in Trinkwasser innerhalb von 24 Stunden verbrauchen. Nach Verdünnen in Milch oder Milchaustauscher innerhalb von 6 Stunden verbrauchen.

7. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Flasche nach erstmaligem Öffnen/Anbruch fest verschlossen halten.

Für 125-ml- und 250-ml-HDPE-Flaschen: Nicht über 25 °C lagern.

8. NAME DES ZULASSUNGSINHABERS



9. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot: