

ETIKETTERING EN BIJSLUITER

GEGEVENS DIE OP <DE BUITENVERPAKKING> <EN> <DE PRIMAIRE VERPAKKING> MOETEN WORDEN VERMELD>

{AARD/TYPE}

1. BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL

Kenocidin Chloorhexidine digluconaat 5mg/ml, tepeldip oplossing voor runderen (melkkoeien)

2. GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) EN OVERIGE BESTANDDE(E)L(EN)

Chloorhexidine digluconaat: 5.0 mg/ml (Equivalent aan chloorhexidine: 2.815 mg/ml)

Briljantblauw 85% (E133): 0.035 mg/ml

Glycerol: 51 mg/ml

Allantoïne: 1 mg/ml

3. FARMACEUTISCHE VORM

Tepeldip oplossing

Blauwe viskeuze vloeistof

4. VERPAKKINGSGROOTTE

1L, 5L, 10L, 20L, 25L, 60L, 200L. Het kan voorkomen dat niet alle verpakkingsgrootten in de handel worden gebracht.

5. DIERSOORT(EN) WAARVOOR HET DIERGENEESMIDDEL BESTEMD IS

Runderen (melkkoeien)

6. INDICATIE(S)

Ontsmetten van de spenen als onderdeel van de strategie ter preventie van mastitis bij melkkoeien. Voor het behouden van een goede conditie van de speenhuid en speensfincter.

7. WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

Toediening op de tepel

Het product is een gebruiksklaar speendipmiddel, toe te passen maximaal twee maal per dag na het melken.

Gebruik tenminste 5 ml per koe per applicatie.

Dip de spenen onmiddellijk na het melken. Zorg ervoor dat de speen voor drievierde van zijn totale lengte wordt afgedekt.

De dipbeker moet indien nodig bijgevuld worden.

Als er een gemeenschappelijke dipbeker wordt gebruikt voor de toepassing, moet er altijd een nieuwe oplossing worden gebruikt bij elke melkbeurt. De dipbeker moet worden geledigd, gereinigd en gespoeld na elke melkbeurt of wanneer de beker wordt verontreinigd tijdens het melken. De resterende oplossing niet terug gieten in de originele verpakking. Gebruik het product voor het reinigen en / of ontsmetten van melkapparatuur

8. WACHTTERMIJN

(Orgaan)vlees: Nul dagen

Melk: Nul uren

9. SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NOODZAKELIJK

Zorg ervoor dat de uier en spenen proper en droog zijn vóór de volgende melkbeurt.

Kan tijdens dracht en lactatie worden gebruikt.

Chloorhexidine kan geïnactiveerd worden door anionische en niet ionische surfactanten (bijv. zeep, zelfs natuurlijke) of anorganische anionen, dus niet vermengen met leiding water, andere chemicaliën, ontsmettingsmiddelen en andere producten voor speen-en uierverzorging.

Dit diergeneesmiddel is voor uitwendig gebruik, significante absorptie treedt niet op.

- **Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren**

Enkel voor uitwendig gebruik.

Bij aanwezigheid van letsels aan de spenen, kan het gebruik van dit product leiden tot vertraging van het herstel. Het wordt aangeraden om de behandeling te onderbreken totdat de spenen hersteld zijn.

De aanwezigheid van organisch materiaal (eter, bloed, enz.) kan de werking van het ontsmettingsmiddel chloorhexidine beperken.

Bij vriestemperaturen, de spenen laten drogen vooraleer de koeien buiten te laten.

Als symptomen van ziekte verschijnen, raadpleeg dan een dierenarts.

Het product laten drogen vooraleer het vee aan natte (regenachtige), koude of winderige omstandigheden bloot te stellen.

- **Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door diegene die het geneesmiddel aan de dieren toedient**

Contact met de ogen vermijden. Bij contact met de ogen onmiddellijk met stromend water spoelen en medisch advies inwinnen.

In geval van accidentele inname, grote hoeveelheden water drinken en dient onmiddellijk een arts te worden geraadpleegd en de bijsluiter of het etiket te worden getoond.

Verwijderd houden van voeding en diervoeding.

Handen wassen na gebruik.

Personen met een bekende overgevoeligheid voor chloorhexidine, moeten contact met het diergeneesmiddel vermijden

- **Bijwerkingen (frequentie en ernst)**

Verandering van het type werkzame bestanddeel speen dip kan in zeer zeldzame gevallen huidirritatie veroorzaken.

Indien u ernstige bijwerkingen of andersoortige reacties vaststelt die niet in deze etiket worden vermeld, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.

- **Contra-indicaties**

Niet gebruiken bij een gekende overgevoeligheid voor chloorhexidine of de hulpstoffen.

10. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP maand/jaar

Houdbaarheid na eerste opening van de container: 6 maanden.

Uiterste gebruiksdatum: ____/____/____

11. SPECIALE VOORZORGSMATREGELEN BIJ BEWAREN

Houd de container zorgvuldig gesloten.

Vrijwaren tegen bevrozing.

Indien het product bevroren is, het product laten dooien in een warme plaats en goed schudden voor gebruik.

Bescherm tegen licht.

Niet te gebruiken na de vervaldatum vermeld op het etiket.

De multidose containers van 200 liter mogen niet teruggeven worden om opnieuw gevuld te worden.

12. SPECIALE VOORZORGSMATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET- GEBRUIKTE DIERGENEESMIDDELEN OF EVENTUELE RESTANTEN HIERVAN
--

Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de lokale vereisten te worden verwijderd.

SCHADELIJK VOOR VISSSEN EN waterorganismen. Geen verontreinig vijvers, waterlopen of sloten met het product of gebruikte container.

13. VERMELDING “UITSLUITEND VOOR DIERGENEESKUNDIG GEBRUIK” EN VOORWAARDEN OF BEPERKINGEN TEN AANZIEN VAN DE LEVERING EN HET GEBRUIK, INDIEN VAN TOEPASSING

Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik. Vrije aflevering.

14. VERMELDING “BUITEN HET BEREIK EN ZICHT VAN KINDEREN BEWAREN”

Buiten het bereik en zicht van kinderen bewaren.

15. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN
--

CIDLINES NV
Waterpoortstraat 2
8900 Ieper
België
Tel. +32 (0) 57 21 78 77
Fax. +32 (0) 57 21 78 79
Mail: info@cidlines.com

16. NUMMER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

BE-V384693

17. PARTIJNUMMER FABRIKANT

Lot