

Bipacksedel

## Denagard vet.

### INNEHAVARE AV FÖRSÄLJNINGSTILLSTÅND/ INFORMATION LÄMNAS AV

Elanco GmbH  
Heinz-Lohmann-Str. 4  
27472 Cuxhaven  
Tyskland

### Tillverkare

Elanco France S.A.S., 26 rue de la Chapelle, F-68330 Huningue, Frankrike

### LÄKEMEDELSFORM OCH –STYRKA

125 mg/ml lösning för användning i dricksvatten.

### DEKLARATION

1 ml Denagard vet. 125 mg/ml lösning innehåller 125 mg tiamulinhydrogenfumarat.

Hjälpämnen: Metylparahydroxibensoat, propylparahydroxibensoat

### INDIKATIONER

Infektioner hos svin orsakade av mikroorganismer känsliga för tiamulin, exempelvis svindysenteri orsakat av *Brachyspira hyodysenteriae*, proliferativ enteropati orsakad av *Lawsonia intracellularis* och spiroketal diarré orsakad av *Brachyspira pilosicoli*.

### KONTRAINDIKATIONER

Denagard vet ska inte användas tillsammans med foder innehållande koccidiosmedlen monensin, narasin, salinomycin eller lasalocid, eftersom samtidig behandling kan orsaka akuta förgiftningssymtom.

Observera: Varken 7 dagar före eller 7 dagar efter behandling med Denagard vet ska dessa ämnen ha använts eller användas.

### Dräktighet och laktation

Kan användas.

### BIVERKNINGAR

I enstaka fall kan erytem förekomma.

### DJURSLAG

Svin.

### DOSERING

8 mg tiamulin per kg kroppsvikt (motsvarar 1 ml lösning/15 kg kroppsvikt).

Alternativt inblandas Denagard vet. i dricksvattnet motsvarande en koncentration på 0,006% (60 ppm) under hela behandlingstiden. Behandlingen bör pågå under 5 – 7 dagar. Under denna tid skall allt annat dricksvatten undvikas. Koncentrationen 0,006% erhålles genom att 5 ml lösning inblandas

i ca 10 liter dricksvatten, alternativt 500 ml lösning till 1000 liter dricksvatten.

Vid användning av medicinblandare inställd på 1%, framställs stamlösning genom blandning av 0,5 l Denagard vet lösning och 9,5 l vatten.

### **ÖVERDOSERING**

Vid peroral giva är risken för överdosering liten, eftersom läkemedlet då ger en kraftig bismak på foder/vatten och intaget därigenom minskas.

### **KARENSTID**

Slakt: Svin 4 dygn.

### **FÖRVARING**

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Användes före utgångsdatum som finns på förpackningen.

### **SKYDDSFÖRESKRIFTER FÖR PERSONER SOM ADMINISTRERER DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLET TILL DJUR**

Direkt kontakt med hud och slemhinnor kan ge irritationer.

### **SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄND PRODUKT OCH AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL**

Överbliven medicin återlämnas till apoteket.

Bipacksedeln reviderades senast  
2020-03-05