

A. ЕТИКЕТ

ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЕ ИЗПИСВА ВЪРХУ ВЪНШНАТА ОПАКОВКА

Картонена кутия

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ

Болфо противопаразитна кашка за малки кучета и котки
propoxur

2. СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНИТЕ СУБСТАНЦИИ И ЕКСПИРИЕНТИТЕ

Всяка кашка съдържа:

Propoxur 1,23 g

3. ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА



4. РАЗМЕР НА ОПАКОВКАТА

38 cm

5. ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП

Котки и кучета (< 10 kg).

6. ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ

За профилактика и лечение на опаразитяване с бълхи и кърлежи при кучета и котки.

7. МЕТОД И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Преди употреба прочети листовката.

8. КАРЕНТЕН СРОК

9. СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, АКО Е НЕОБХОДИМО

Преди употреба прочети листовката.

10. СРОК НА ГОДНОСТ

Годен до {месец/година}

11. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ

**12. СПЕЦИАЛНИ МЕРКИ ЗА УНИЩОЖАВАНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАН ПРОДУКТ
ИЛИ ОСТАТЬЦИ ОТ НЕГО, АКО ИМА ТАКИВА**

Унищожаване: Преди употреба прочети листовката.

**13. НАДПИСЪТ “САМО ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКА УПОТРЕБА” И
УСЛОВИЯ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ ОТНОСНО РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО И
УПОТРЕБАТА, АКО Е ПРИЛОЖИМО**

Само за ветеринарномедицинска употреба. Без лекарско лекарско предписание.

**14. НАДПИСЪТ “ДА СЕ СЪХРАНЯВА ДАЛЕЧ ОТ ПОГЛЕДА И НА НЕДОСТЪПНИ
ЗА ДЕЦА МЕСТА”**

Да се съхранява далеч от погледа и на недостъпни за деца места.

15. ИМЕ И ПОСТОЯНЕН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА

Elanco Animal Health GmbH, Alfred-Nobel-Str. 50, 40789 Monheim, Германия

16. НОМЕР НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА НА ВМП

0022-1827

17. ПАРТИДЕН НОМЕР

<Партида> <Lot> {номер}

**МИНИМУМ ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО ТРЯБВА ДА БЪДЕ ИЗПИСАНА ВЪРХУ
БЛИСТЕРИ ИЛИ ЛЕНТИ
Фолиева опаковка за една кашка**

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ

Bolfo® противопаразитна кашка за малки кучета и котки
Propoxur 1,23 g

2. НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА

Elanco [логотип]

3. СРОК НА ГОДНОСТ

EXP {месец/година}

4. ПАРТИДЕН НОМЕР

Lot {номер}

5. НАДПИСЪТ “САМО ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКА УПОТРЕБА”

Само за ветеринарномедицинска употреба.

**Д-Р ВАЛЕНТИН АТАНАСОВ
ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР**

ЛИСТОВКА ЗА:

Болфо противопаразитна каишка за малки кучета и котки
Болфо противопаразитна каишка за кучета

1. ИМЕ И ПОСТОЯНЕН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ

Притежател на лиценза за употреба:

Elanco Animal Health GmbH
Alfred-Nobel-Str. 50, 40789 Monheim, Германия

Производител, отговорен за освобождаване на партидата: KVP Pharma + Veterinär Produkte GmbH, Kiel, Germany

2. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ

Болфо противопаразитна каишка за малки кучета и котки
Болфо противопаразитна каишка за кучета
propoxur

3. СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНАТА СУБСТАНЦИЯ И ЕКСПИРИЕНТИТЕ

Активна субстанция:

propoxur 98,7 mg/g

Всяка каишка Bolfo collar for small dogs and cats с дължина 38 см и тегло 12,5 g съдържа 1,23 g propoxur.

Всяка каишка Bolfo collar for dogs с дължина 70 см и тегло 45 g съдържа 4,442 g propoxur.

4. ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ

За профилактика и лечение на опаразитяване с бълхи и кърлежи при кучета и котки.

5. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Да не се използва при животни с механична обструкция на храносмилателния тракт или пикочните пътища, бронхиална астма или други белодробни и сърдечносъдови заболявания, тъй като карбаматите могат да предизвикат контракция на гладката мускулатура.

Да не се използва при кученца под 3-месечна възраст.

Да не се използва при животни с кожни увреждания.

Да не се използва при свръхчувствителност към активната субстанция или към някой от експириентите.

6. НЕБЛАГОПРИЯТНИ РЕАКЦИИ

Честотата на неблагоприятните реакции се определя чрез следната класификация:

- много чести (повече от 1 на 10 животни проявляващи неблагоприятни реакции по време на курса на едно лечение)
- чести (повече от 1, но по-малко от 10 животни на 100 животни)

- не чести (повече от 1, но по-малко от 10 животни на 1 000 животни)
- редки (повече от 1, но по-малко от 10 животни на 10 000 животни)
- много редки (по-малко от 1 животно на 10 000 животни, включително изолирани съобщения).

В много редки случаи на мястото на приложение могат да се появят реакции, като сърбеж, зачервяване, лезии и загуба на козина.

В много редки случаи някои животни могат да получат лек сърбеж или зачервяване на кожата след поставяне на кашката.

Симптоми като повръщане, диария или отделяне на слюнка могат да се появят много рядко след попадане на продукта в устата.

Ако забележите някакво сериозно въздействие или други ефекти, вследствие от употребата на този ВМП, които не са описани в тази листовка, моля незабавно да уведомите Вашия ветеринарен лекар.

7. ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП

Болфо противопаразитна кашка за малки кучета и котки:
кучета с телесна маса под 10 kg и котки.

Болфо противопаразитна кашка за кучета: кучета с телесна маса 10 kg и над 10 kg ($\geq 10 \text{ kg}$).

8. ДОЗИРОВКА ЗА ВСЕКИ ВИД ЖИВОТНО, МЕТОД И НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ

Болфо противопаразитна кашка за малки кучета и котки (38 cm) е предназначена за употреба при кучета с телесна маса под 10 kg и котки ($< 10 \text{ kg}$). Болфо противопаразитна кашка за кучета (70 cm) е предназначена за употреба при кучета с телесна маса 10 kg и над 10 kg ($\geq 10 \text{ kg}$).

Само за външно приложение!

Кашката е ефективна в продължение на 4 месеца срещу бълхи и 10 седмици срещу кърлежи. Кашката е ефективна срещу бълхи и кърлежи ако се носи постоянно. Бълхите върху кучето умират за няколко часа след поставянето на кашката. Кърлежите, смучещи кръв умират приблизително за един ден. Мъртвите кърлежи падат от кучето или могат да бъдат отстранени лесно.

Кърлежите, попаднали върху кучето ще бъдат убити и ще паднат в рамките на 72 часа, обикновено без да са смукали кръв. Прикрепянето на единични кърлежи не е изключено. Поради тази причина, предаването на заразни заболявания от кърлежи не може да бъде напълно изключено при неблагоприятни условия.

Загубата на активност може да бъде проверена, като се надраска повърхността на кашката с оstry метален предмет. Ако мястото на надраскването е бяло на цвят, кашката е все още активна. В противен случай, кашката трябва да бъде заменена с нова.

9. СЪВЕТ ЗА ПРАВИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ

Извадете противопаразитната кашка от опаковката и я развийте.

Уверете се, че няма остатъци от пластмасовите конектори от вътрешната ѝ страна.

Поставете кашката около врата на животното без да я стягате прекалено (трябва да е възможно да се поставят два пръста между кашката и врата на животното).

Изтеглете остатъка от кашката през халката и отрежете излишната част на 2 см от халката.

Правилно поставената кашка трябва да се проверява и регулира периодично, особено при млади животни.

Оптималният ефект от действието на кaiшката се достига 24 часа след поставянето ѝ на врата на животното. Продължителността и ефикасността на действие на кaiшката зависят от дълбината и състоянието на козината, от активността на животното и степента на опаразитяване.

Когато козината на животното е замърсена, е препоръчително то да бъде изкъпано преди поставяне на кaiшката. Кaiшката е водоустойчива, но не се препоръчва животното да се къпе с нея. В такива случаи е добре кaiшката да се свали и след подсушаване на козината да се постави отново.

Освен бълхите нападнали кучето, заобикалящата среда също може да е заразена с яйца, ларви и какавиди на бълхи. От тях могат да се развият нови бълхи. Поради тази причина е важно да се осъществява ефективен контрол на тези ранни стадии от развитието на паразитите в непосредственото обкръжение на кучето, посредством прилагането на подходящ, разрешен инсектицид.

10. КАРЕНТЕН СРОК

Не е приложимо.

11. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ПРОДУКТА

Да се съхранява далеч от погледа и на недостъпни за деца места.

Този ветеринарномедицински продукт не изиска никакви специални условия за съхранение.

Да не се използва този ветеринарномедицински продукт след изтичане срока на годност, посочен върху картона след {EXP}. Срокът на годност отговаря на последния ден от този месец.

12. СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Децата трябва да избягват контакт с животни, носещи кaiшката.

Да се съхранява далеч от храна и фураж.

Кaiшката да не се използва за игра, в частност от деца.

Кaiшката да не се дъвче или смуче, в частност от деца.

Специални предпазни мерки за животните при употребата на продукта

Бълхите могат да бъдат междинен гостоприемник на тени, поради това е препоръчително да бъдат прилагани и продукти за вътрешно обезпаразитяване. За ефективен контрол на бълхите е важно да бъде обработена и средата, заобикаляща кучето, с подходящ одобрен инсектицид срещу ларвните стадии.

Специални предпазни мерки за лицата, прилагачи ветеринарномедицинския продукт на животните

Да се избягва контакт с очите и кожата.

Да не се пие, яде или пуши по време на работа с продукта.

След работа с кaiшката, ръцете да се измиват старательно с вода и сапун.

Хора с установена свръхчувствителност към активната субстанция Propoxur трябва да избягват контакт с ветеринарномедицинския продукт.

Този ветеринарномедицински продукт съдържа карбамат (propoxur). При симптоми на отравяне, моля потърсете медицинска помощ.

Бременност:

Безопасността на ветеринарномедицинския продукт не е доказана по време на бременност.

Активната субстанция не е класифицирана като ембриотоксична, тератогенна или като

репродуктивно токсична, поради което не се очакват такива ефекти при бременни или кърмещи животни.

Взаимодействие с други ветеринарномедицински продукти и други форми на взаимодействие:
Не са известни.

Предозиране (симптоми, спешни мерки, антидоти):

Поради естеството на фармацевтичната форма, предозирането е невъзможно.

При случайно поглъщане или дъвчене на кайшката е възможно да се появят симптоми на карбаматно отравяне, като повишено слюноотделяне, свиване на зениците, повръщане и диария. При клинични признаци на карбаматно отравяне се прилага симптоматично лечение и антидот атропин, интравенозно.

Несъвместимости:

Да не се прилага едновременно с други инсектициди.

Влияние върху околната среда:

Този продукт е силно токсичен за водни организми, птици и пчели.

Да не се допуска кучета с поставени кайшки да плуват във водни басейни, в които има водни организми.

Този продукт може да причини дълготрайни неблагоприятни ефекти във водната среда.

13. СПЕЦИАЛНИ МЕРКИ ЗА УНИЩОЖАВАНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАН ПРОДУКТ ИЛИ ОСТАТЪЦИ ОТ НЕГО, АКО ИМА ТАКИВА

Опаковката да не се използва повторно. Празните опаковки трябва да бъдат унищожени или изхвърлени, в съответствие с изискванията на местното законодателство.

Попитайте Вашия ветеринарен лекар какво да правите с ненужните ВМП. Тези мерки ще помогнат за опазване на околната среда.

14. ДАТАТА НА ПОСЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ НА ТЕКСТА

01/2024

15. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

За всяка информация относно този ветеринарномедицински продукт, моля свържете се с териториалния представител на притежателя на лиценза за употреба.

Д-Р ВАЛЕНТИН АТАНАСОВ
ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР