

**ANEKS III**  
**OZNAKOWANIE OPAKOWAŃ I ULOTKA INFORMACYJNA**

## **A. OZNAKOWANIE OPAKOWAŃ**

**INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIU ZEWNĘTRZNYM**

Pudełko tekturowe (100 ml)

**1. NAZWA WETERYNARYJNEGO PRODUKTU LECZNICZEGO**

Baycox 25 mg/ml roztwór doustny

**2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH**

Toltrazuryl 25 mg/ml

**3. WIELKOŚĆ OPAKOWANIA**

100 ml

**4. DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT**

Kury (brojlery, kury reprodukcyjne), indyki.

**5. WSKAZANIA LECZNICZE****6. DROGI PODANIA**

Podanie w wodzie picia.

**7. OKRESY KARENCJI**

Okresy karencji:

Tkanki jadalne: kury -14 dni; indyki -16 dni.

Produkt niedopuszczony do stosowania u ptaków produkujących jaja lub odchowywanych z zamiarem pozyskiwania jaj przeznaczonych do spożycia przez ludzi. Nie stosować na 6 tygodni przed rozpoczęciem okresu nieśności.

**8. TERMIN WAŻNOŚCI SERII**

Exp. {mm/rrrr}

Zawartość otwartego opakowania należy zużyć w ciągu 12 tygodni.

Produkt rozcieńczony zużyć w ciągu 48 godzin.

**9. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS PRZECHOWYWANIA**

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

**10. NAPIS „PRZED UŻYCIEM NALEŻY PRZECZYTAĆ ULOTKĘ.”**

Przed użyciem należy przeczytać ulotkę.

**11. NAPIS „WYŁĄCZNIE DLA ZWIERZĄT”**

Wyłącznie dla zwierząt.

**12. NAPIS „PRZECHOWYWAĆ W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI”**

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

**13. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO**

Elanco 

**14. NUMERY POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU**

360/97

**15. NUMER SERII**

Lot {numer}

**INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIU BEZPOŚREDNIM****Butelka HDPE (1000 ml)****1. NAZWA WETERYNARYJNEGO PRODUKTU LECZNICZEGO**

Baycox 25 mg/ml roztwór doustny

**2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH**

Toltrazuryl 25 mg/ml

**3. WIELKOŚĆ OPAKOWANIA**

1000 ml

**4. DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT**

Kury (brojlery, kury reprodukcyjne), indyki.

**5. WSKAZANIA LECZNICZE****6. DROGI PODANIA**

Podanie w wodzie picia

**7. OKRESY KARENCJI**

Okresy karencji:

Tkanki jadalne: kury - 14 dni; indyki - 16 dni.

Produkt niedopuszczony do stosowania u ptaków produkujących jaja lub odchowywanych z zamiarem pozyskiwania jaj przeznaczonych do spożycia przez ludzi. Nie stosować na 6 tygodni przed rozpoczęciem okresu nieśności.

**8. TERMIN WAŻNOŚCI SERII**

Exp. {mm/rrrr}

Zawartość otwartego opakowania należy zużyć w ciągu 12 tygodni.

Produkt rozcieńczony zużyć w ciągu 48 godzin.

**9. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS PRZECHOWYWANIA**

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

**10. NAPIS „PRZED UŻYCIEM NALEŻY PRZECZYTAĆ ULOTKĘ.”**

Przed użyciem należy przeczytać ulotkę.

**11. NAPIS „WYŁĄCZNIE DLA ZWIERZĄT”**

Wyłącznie dla zwierząt.

**12. NAPIS „PRZECHOWYWAĆ W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI”**

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

**13. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO**

Elanco 

**14. NUMERY POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU**

360/97

**15. NUMER SERII**

Lot {numer}

**INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIU BEZPOŚREDNIM****Butelka HDPE (100 ml)****1. NAZWA WETERYNARYJNEGO PRODUKTU LECZNICZEGO**

Baycox 25 mg/ml roztwór doustny

**2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH**

Toltrazuryl 25 mg/ml

**3. DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT**

Kury (brojlery, kury reprodukcyjne), indyki.

**4. DROGI PODANIA**

Podanie w wodzie do picia.

Przed użyciem należy przeczytać ulotkę.

**5. OKRESY KARENCJI**

Okresy karencji:

Tkanki jadalne: kury - 14 dni; indyki - 16 dni.

Produkt niedopuszczony do stosowania u ptaków produkujących jaja lub odchowywanych z zamiarem pozyskiwania jaj przeznaczonych do spożycia przez ludzi. Nie stosować na 6 tygodni przed rozpoczęciem okresu nieśności.

**6. TERMIN WAŻNOŚCI SERII**

Exp. {mm/rrrr}

Zawartość otwartego opakowania należy zużyć w ciągu 3 miesięcy.

Produkt rozcieńczony zużyć w ciągu 48 godzin.

**7. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS PRZECHOWYWANIA**

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

**8. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO**Elanco **9. NUMER SERII**

Lot {numer}

