

KENNZEICHNUNG**ANGABEN AUF DER UMVERPACKUNG****Karton mit 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 oder 24 Pipetten, enthält 0,5 ml-Pipetten****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

PestiGon Combo 50 mg/60 mg Lösung zum Auftröpfen für Katzen und Frettchen
Fipronil
S-Methopren

2. WIRKSTOFF(E)

Pro 0,5 ml-Pipette:

50 mg Fipronil
60 mg (S)-Methopren

3. DARREICHUNGSFORM

Lösung zum Auftröpfen.

4. PACKUNGSGRÖSSE

1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 oder 24 0,5 ml-Pipetten

5. ZIELTIERART(EN)

Katze und Frettchen.

6. ANWENDUNGSGEBIET(E)

Bei Katzen:

Zur Anwendung gegen Flohbefall, allein oder vergesellschaftet mit Zecken und/oder Haarlingen.

- Abtötung von Flöhen (*Ctenocephalides spp.*). Insektizide Wirksamkeit gegen erneuten Befall mit adulten Flöhen bleibt 4 Wochen erhalten. Verhindert die Vermehrung von Flöhen durch Hemmung der Entwicklung von Eiern (ovizide Wirkung) bzw. Larven und Puppen (larvicide Wirkung) aus Eiern adulter Flöhe bis zu 6 Wochen nach Anwendung.
- Abtötung von Zecken (*Ixodes ricinus*, *Dermacentor variabilis*, *Rhipicephalus sanguineus*). Die akarizide Wirkung gegen Zecken hält bis zu zwei Wochen an (basierend auf experimentellen Daten).
- Abtötung von Haarlingen (*Felicola subrostratus*).

Bei Frettchen:

Zur Anwendung gegen Flohbefall, allein oder vergesellschaftet mit Zecken.

- Abtötung von Flöhen (*Ctenocephalides spp.*). Die insektizide Wirksamkeit gegen erneuten Befall mit adulten Flöhen hält vier Wochen an. Verhindert die Vermehrung von Flöhen durch Hemmung der Entwicklung von Eiern (ovizide Wirkung) bzw. Larven und Puppen (larvicide Wirkung) aus Eiern adulter Flöhe.

- Abtötung von Zecken (*Ixodes ricinus*). Die akarizide Wirkung gegen Zecken hält 4 Wochen an (basierend auf experimentellen Daten).

7. ART DER ANWENDUNG

Nur zur äußerlichen Anwendung. Auftröpfen.

Für Katzen mit Körpergewicht über 1 kg. Für Frettchen ab einem Alter von sechs Monaten.

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

8. WARTEZEIT(EN)

Nicht zutreffend.

9. BESONDERE WARNHINWEISE, SOWEIT ERFORDERLICH

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

10. VERFALLDATUM

EXP: MM/JJJJ

11. BESONDERE LAGERUNGSBEDINGUNGEN

In der Originalverpackung aufbewahren, um den Inhalt vor Licht und Feuchtigkeit zu schützen.

12. BESONDERE VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DIE ENTSORGUNG VON NICHT VERWENDETN ARZNEIMITTELN ODER VON ABFALLMATERIALIEN, SOFERN ERFORDERLICH

Entsorgung: Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

13. VERMERK "FÜR TIERE" SOWIE BEDINGUNGEN ODER BESCHRÄNKUNGEN FÜR EINE SICHERE UND WIRKSAME ANWENDUNG DES TIERARZNEIMITTELNS, SOFERN ZUTREFFEND

Für Tiere.

Rezeptfrei

14. KINDERWARNHINWEIS "ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN"

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

15. NAME UND ANSCHRIFT DES ZULASSUNGSHABERS

Norbrook Laboratories (Ireland) Limited
Rossmore Industrial Estate
Monaghan
Ireland

16. ZULASSUNGSNUMMER(N)

BE-V519591

17. CHARGENBEZEICHNUNG DES HERSTELLERS

LOT :

MINDESTANGABEN AUF KLEINEN PRIMÄRVERPACKUNGEN**Beutelchen für 0,5 ml-Pipette/Blisterverpackung****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

PestiGon Combo 50 mg/60 mg Lösung zum Auftropfen für Katzen und Frettchen
Fipronil
S-Methopren

2. WIRKSTOFF(E) NACH MENGE

Pro 0,5 ml-Pipette:
50 mg Fipronil
60 mg (S)-Methopren

3. INHALT NACH GEWICHT, VOLUMEN ODER STÜCKZAHL

0,5 ml

4. ART DER ANWENDUNG

Auftropfen.
Pipette erst direkt vor Anwendung aus dem Beutelchen nehmen.
<Piktogramm einer Spot-on-Pipette>

5. WARTEZEIT(EN)

Nicht zutreffend.

6. CHARGENBEZEICHNUNG

LOT:

7. VERFALLDATUM

EXP: MM/JJJJ

8. VERMERK "FÜR TIERE"

Für Tiere.
Katze <Piktogramm einer Katze>. Frettchen <Piktogramm eines Frettchens>

9. NAME DES ZULASSUNGSHABERS

Norbrook Laboratories (Ireland) Limited



10. ZULASSUNGSNUMMER(N)

BE-V519591

MINDESTANGABEN AUF BLISTERVERPACKUNGEN ODER FOLIENSTREIFEN

0,5 ml-Pipette/Blisterverpackung

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

PestiGon Combo

2. ZULASSUNGSHABER

Norbrook

3. VERFALLDATUM

MM/JJJJ

4. CHARGENBEZEICHNUNG

XXXX XXX

5. VERMERK "FÜR TIERE"

<Piktogramm einer Katze> <Piktogramm eines Frettchens>

6. DARREICHUNGSFORM

<Piktogramm einer Spot-on-Pipette>

7. ARZNEILICH WIRKSAMER INHALT

50 mg / 60 mg

8. MENGE

0,5 ml

