

**MENTIONS DEVANT FIGURER SUR L'EMBALLAGE EXTÉRIEUR**

**SEAU CONTENANT 24 SERINGUES**  
**SEAU CONTENANT 120 SERINGUES**

**1. NOM DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE**

Multishield DC, Suspension intramammaire pour bovins.

**2. COMPOSITION EN SUBSTANCES ACTIVES**

Néomycine 70 000 UI (100 mg de sulfate de néomycine) par seringue.  
Pénéthamate 77,2 mg (100 mg d'iodhydrate de pénéthamate) par seringue.  
Benzylpénicilline 227,2 mg (400 mg de benzylpénicilline procaïne) par seringue.

**3. TAILLE DE L'EMBALLAGE**

24 seringues  
120 seringues

**4. ESPÈCES CIBLES**

Bovins (vaches au tarissement).

**5. INDICATION(S)****6. VOIES D'ADMINISTRATION**

Utilisation intramammaire.

**7. TEMPS D'ATTENTE**

Temps d'attente :

Viande et abats : 28 jours.

Lait : 96 heures après le vêlage chez les vaches en période de tarissement depuis plus de 50 jours.  
50 jours plus 96 heures après le traitement des vaches en période de tarissement depuis 50 jours ou moins.

**8. DATE DE PÉREMOPTION**

Exp. {mm/aaaa}

**9. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION**

À conserver à une température ne dépassant pas 25 °C  
Ne pas mettre au réfrigérateur. Ne pas congeler.

**10. LA MENTION « LIRE LA NOTICE AVANT UTILISATION »**

Lire la notice avant utilisation.

**11. LA MENTION « À USAGE VÉTÉRINAIRE UNIQUEMENT »**

À usage vétérinaire uniquement

**12. LA MENTION « TENIR HORS DE LA VUE ET DE LA PORTÉE DES ENFANTS »**

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

**13. NOM DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ**

Bimeda Animal Health Limited.

**14. NUMÉROS D'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ**

FR/V/9473258 8/2013

**15. NUMÉRO DU LOT**

Lot : {numéro}

**MENTIONS DEVANT FIGURER SUR L'EMBALLAGE EXTÉRIEUR**

**SEAU CONTENANT 24 SERINGUES**  
**SEAU CONTENANT 120 SERINGUES**

**1. NOM DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE**

Multishield DC, Suspension intramammaire pour bovins.

**2. COMPOSITION EN SUBSTANCES ACTIVES**

Néomycine 70 000 UI (100 mg de sulfate de néomycine) par seringue.  
Pénéthamate 77,2 mg (100 mg d'iodhydrate de pénéthamate) par seringue.  
Benzylpénicilline 227,2 mg (400 mg de benzylpénicilline procaïne) par seringue.

**3. TAILLE DE L'EMBALLAGE**

24 seringues  
120 seringues

**4. ESPÈCES CIBLES**

Bovins (vaches au tarissement).

**5. INDICATION(S)****6. VOIES D'ADMINISTRATION**

Utilisation intramammaire.

**7. TEMPS D'ATTENTE**

Temps d'attente :

Viande et abats : 28 jours.

Lait : 96 heures après le vêlage chez les vaches en période de tarissement depuis plus de 50 jours.  
50 jours plus 96 heures après le traitement des vaches en période de tarissement depuis 50 jours ou moins.

**8. DATE DE PÉREMOPTION**

Exp. {mm/aaaa}

**9. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION**

À conserver à une température ne dépassant pas 25 °C  
Ne pas mettre au réfrigérateur. Ne pas congeler.

**10. LA MENTION « LIRE LA NOTICE AVANT UTILISATION »**

Lire la notice avant utilisation.

**11. LA MENTION « À USAGE VÉTÉRINAIRE UNIQUEMENT »**

À usage vétérinaire uniquement

**12. LA MENTION « TENIR HORS DE LA VUE ET DE LA PORTÉE DES ENFANTS »**

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

**13. NOM DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ**

Bimeda Animal Health Limited.

**14. NUMÉROS D'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ**

FR/V/9473258 8/2013

**15. NUMÉRO DU LOT**

Lot : {numéro}

**MENTIONS MINIMALES DEVANT FIGURER SUR LES UNITÉS DE CONDITIONNEMENTS PRIMAIRE S DE PETITE TAILLE**

**SERINGUE - TEXTE DE L'ÉTIQUETTE**

**1. NOM DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE**

Multishield DC, Suspension intramammaire pour bovins.

**2. COMPOSITION QUANTITATIVE DES SUBSTANCES ACTIVES**

Néomycine 70 000 UI (100 mg de sulfate de néomycine) par seringue.

Pénéthamate 77,2 mg (100 mg d'iodhydrate de pénéthamate) par seringue.

Benzylpénicilline 227,2 mg (400 mg de benzylpénicilline procaïne) par seringue.

**3. NUMÉRO DU LOT**

Lot {numéro}

**4. DATE DE PÉREMOPTION**

Exp. {MM/AAAA}