

**ЕТИКЕТ**



**10. СРОК НА ГОДНОСТ**

<EXP {месец/година}>

След отваряне, използвайте преди 28 дни. След изтичане на този срок изхвърлете останалия продукт в опаковката.

**11. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ НА СЪХРАНЕНИЕ**

Да се пази от пряка слънчева светлина.

**12. СПЕЦИАЛНИ МЕРКИ ЗА УНИЩОЖАВАНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАН ПРОДУКТ ИЛИ ОСТАТЪЦИ ОТ НЕГО, АКО ИМА ТАКИВА**

Всеки неизползван ветеринарномедицински продукт или остатъци от него, трябва да бъдат унищожени, в съответствие с изискванията на местното законодателство.

**13. НАДПИСЪТ „САМО ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКА УПОТРЕБА” И УСЛОВИЯ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ ОТНОСНО РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО И УПОТРЕБАТА, АКО Е ПРИЛОЖИМО**

Само за ветеринарномедицинска употреба. Да се отпуска само по лекарско предписание.

**14. НАДПИСЪТ „ДА СЕ СЪХРАНЯВА ДАЛЕЧ ОТ ПОГЛЕДА И НА НЕДОСТЪПНИ ЗА ДЕЦА МЕСТА”**

Да се съхранява далеч от погледа и на недостъпни за деца места.

**15. ИМЕ И ПОСТОЯНЕН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА**

“БИОВЕТ” АД  
ул. “Петър Раков” № 39,  
Пещера 4550  
Телефон: (0350) 656-19  
Факс: (0350) 656-36; (0350) 656-07  
E-mail: [biovet@biovet.com](mailto:biovet@biovet.com)

**16. НОМЕР НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА НА ВМП****17. ПАРТИДЕН НОМЕР**

<Batch> <Lot> <BN> {number}



**9. НАДПИСЪТ „САМО ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКА УПОТРЕБА” И УСЛОВИЯ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ ОТНОСНО РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО И УПОТРЕБАТА, АКО Е ПРИЛОЖИМО**

Само за ветеринарномедицинска употреба. Да се отпуска само по лекарско предписание.

**10. ИМЕ И ПОСТОЯНЕН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА**

“БИОВЕТ” АД  
ул. “Петър Раков” № 39,  
Пещера 4550  
Телефон: (0350) 656-19  
Факс: (0350) 656-36; (0350) 656-07  
E-mail: [biovet@biovet.com](mailto:biovet@biovet.com)

**11. ПАРТИДЕН НОМЕР**

<Batch> <Lot> <BN> {number}

## **ЛИСТОВКА**

## ЛИСТОВКА ЗА:

ПАНДЕКС® 1% инжекционен разтвор за говеда, овце, кози и свине.  
Ивермектин

### 1. ИМЕ И ПОСТОЯНЕН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ

Притежател на лиценза за употреба и производител, отговорни за освобождаване на партидата:

“БИОВЕТ” АД  
ул. “Петър Раков” № 39,  
Пещера 4550  
България  
Телефон: (0350) 656-19  
Факс: (0350) 656-36; (0350) 656-07  
E-mail: [biovet@biovet.com](mailto:biovet@biovet.com)

### 2. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ

ПАНДЕКС® 1% инжекционен разтвор за говеда, овце, кози и свине.  
Ивермектин

### 3. СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНАТА СУБСТАНЦИЯ И ЕКСЦИПИЕНТИТЕ

Ivermectin 10 mg /ml

Бледо-жълт разтвор.

### 4. ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ

*Говеда* – при стомашно-чревни и белодробни нематодози (остертагиози, хемонхозии, трихостронгилидозии, коопериозии, парафилариозии, езофагостомозии, буностомозии, нематодирозии, диктиокаулози); при очни нематодози (телазииоза); при инвазия с инсекти и акари (въшки, пасищни кърлежи); при псороптесова, саркоптесова и хориоптесова краста, при хиподермоза.

*Овце и кози* – при стомашно-чревни и белодробни нематодози (остертагиози, хемонхозии, трихостронгилидозии, коопериозии, езофагостомозии, стронгилоидозии, хаберциозии, трихурозии, гайгериозии, диктиокаулози); при инвазия с инсекти и акари (въшки, мелофаги, пасищни кърлежи, крастни кърлежи, псороптесови и хриоптесови); при естрозаа.

*Свине* – при нематодози (аскаридоза, стронгилоидоза, хиостронгилидоза, метастронгилидоза, езофагостомоза), при инвазия с въшки и при саркоптесова краста.

### 5. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Лекарственият продукт е противопоказан за кучета от породите Коли, Шелти и Бобтейл и за костенурки.

Да не се прилага при животни в лактационен период, чието мляко е предназначено за човешка консумация.

## 6. НЕБЛАГОПРИЯТНИ РЕАКЦИИ

Преходен дискомфорт може да се наблюдава при някои говеда след подкожно прилагане. Често се наблюдава оток на меките тъкани на мястото на инжектиране, като реакцията отшумява без да изисква лечение.

## 7. ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП

Говеда, овце, кози и свине.

## 8. ДОЗИРОВКА ЗА ВСЕКИ ВИД ЖИВОТНО, МЕТОД И НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ

### Начин на приложение:

За подкожно прилагане. Да не се прилага интрамускулно или интравенозно!

### Дозировка:

Говеда – 200 µg/kg телесна маса.

Телесна маса (kg)	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
Обем на дозата (ml)	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	11.0	12.0

Овце и кози – 200 µg/kg телесна маса.

Телесна маса (kg)	25	50	75
Обем на дозата (ml)	0.5	1.0	1.5

Свине – 300 µg/kg телесна маса.

Телесна маса (kg)	16	33	66	100	133	166	200
Обем на дозата (ml)	0.5	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0

## 9. СЪВЕТИ ЗА ПРАВИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ

Само за подкожно прилагане. Да не се прилага интрамускулно или интравенозно!

## 10. КАРЕНТНИ СРОКОВЕ

### **Месо и вътрешни органи:**

Говеда: 49 дни.

Овце, кози и свине: 14 дни.

### **Мляко:**

Да не се прилага при животни в лактационен период, млякото от които е предназначено за човешка консумация.

## 11. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ПРОДУКТА

Да се съхранява далеч от погледа и на недостъпни за деца места!

Да се пази от пряка слънчева светлина.



## **12. СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ**

### Специални предпазни мерки за животните при употребата на продукта

Ивермектинът не се понася добре от всички неприцелни видове животни. Съобщава се за случаи на непоносимост с фатален изход при кучета и по-специално от порода Коли и Бобтейл, както и при някои морски костенурки/костенурки.

### Специални предпазни мерки за лицата, прилагащи ветеринарномедицинския продукт на животните

При прилагане на продукта да не се яде, пише или пуши. След прилагане ръцете да се измият с вода и сапун.

При случайно изливане на продукта или контакт с кожата, поразените места се почистват със спирт и след това се измиват обилно с вода.

### Употреба по време на бременност, лактация или яйценосене

Лабораторните проучвания при мишки, плъхове, зайци и кучета не показват никакви доказателства за тератогенност и токсичност за майчиния организъм.

Да не се прилага при бременни юници 60 дни преди отелване.

ПАНДЕКС® може да се прилага при крави по всяко едно време от лактацията при условие, че млякото не е предназначено за човешка консумация.

Да не се прилага при млеконадойни крави по време на лактационния период или по време на сухостойния период, когато млякото е предназначено за човешка консумация.

### Взаимодействия с други лекарствени продукти и други форми на взаимодействие

Не са известни.

### Предозиране (симптоми, спешни мерки, антидоти)

При предозиране при говеда може да се наблюдава атаксия, депресия и безпокойство. При свинете симптомите, наблюдавани при предозиране, са летаргия, атаксия, тремор, мидриаза.

### Несъвместимости

Не са известни.

## **13. СПЕЦИАЛНИ МЕРКИ ЗА УНИЩОЖАВАНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАН ПРОДУКТ ИЛИ ОСТАТЪЦИ ОТ НЕГО, АКО ИМА ТАКИВА**

Всеки неизползван ветеринарномедицински продукт или остатъци от него, трябва да бъдат унищожени, в съответствие с изискванията на местното законодателство.

## **14. ДАТА НА ПОСЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ НА ТЕКСТА**

Ноември 2014 г.

## **15. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ**

ПАНДЕКС® 1% инжекционен разтвор се предлага в стъклени флакони по 25 ml, 50 ml и 100 ml.

За допълнителна информация относно ветеринарномедицинския продукт се свържете с представител на притежателя на лиценза за употреба.