

## ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG

### 1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Virbagen Puppy 2b – Injektionssuspension für Hunde

### 2. WIRKSTOFF:

Jede Dosis (1 ml) enthält:

Canines Parvovirus 2b, lebend, attenuiert, Stamm CPV39  $10^{5,6}$  bis  $10^{7,5}$  GKID<sub>50</sub>\*

\*Gewebekultur-infektiöse Dosis 50%

### 3. DARREICHUNGSFORM:

Farblose Injektionssuspension

### 4. PACKUNGSGRÖSSE(N):

Packung mit 10 oder 50 Fläschchen mit je 1 ml Impfstoffsuspension

### 5. ZIELTIERART(N):

Hund (Welpen)

### 6. ANWENDUNGSGEBIET(E):

Zur aktiven Immunisierung von Hunden ab einem Alter von 5 Wochen gegen die canine Parvovirose, um die Virusausscheidung zu reduzieren und Mortalität sowie typische klinische Zeichen (enterische Form) zu vermeiden.

Beginn der Immunität: 2 Wochen nach der Impfung

Dauer der Immunität: bis zum Alter von 11 Wochen nachgewiesen

### 7. ART DER ANWENDUNG:

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

Eine Dosis (1 ml) Virbagen Puppy 2b wird an Welpen im Alter von 5 Wochen subkutan verabreicht.

Aufgrund der heterogenen Verteilung der maternalen Antikörper bei den Welpen wird eine zweite Impfung 2 Wochen später empfohlen. Um einen langfristigen Schutz zu gewährleisten, sollte nach dem klassischen Impfschema mit einem Impfstoff, der eine Parvovirus-Komponente enthält, vor dem Alter von 11 Wochen zu Impfen begonnen werden.

### 8. WARTEZEIT(EN):

Nicht zutreffend.

## **9. BESONDERE WARNHINWEISE, SOWEIT ERFORDERLICH:**

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

Das Impfvirus ist für Menschen nicht pathogen, jedoch sollten die üblichen Vorsichtsmaßnahmen berücksichtigt werden, um jeglichen Kontakt mit Haut und Schleimhaut sowie eine Selbstinjektion zu vermeiden. Bei versehentlicher Selbstinjektion ist unverzüglich ein Arzt zu Rate zu ziehen und die Packungsbeilage oder das Etikett vorzuzeigen.

Ein leichter vorübergehender (maximal 1 Minute andauernder) Pruritus kann bis zu 30 Minuten nach der Impfung an der Injektionsstelle beobachtet werden, der mit leichten Schmerzen verbunden sein kann. Eine geringgradige vorübergehende Schwellung kann ebenfalls an der Injektionsstelle auftreten, die innerhalb von 2-3 Stunden spontan abklingt.

Überempfindlichkeitsreaktionen können gelegentlich beobachtet werden. Im Falle einer Anaphylaxie sind sofort Kortikoide oder Antihistaminika zu verabreichen, verbunden mit der üblichen Behandlung gegen anaphylaktische Reaktionen.

## **10. VERFALLDATUM:**

Verwendbar bis:

## **11. BESONDERE LAGERUNGSBEDINGUNGEN:**

Kühl lagern und transportieren (2°-8° C). Nicht einfrieren. Vor Licht schützen.

## **12. BESONDERE VORSICHTSMAßNAHMEN FÜR DIE ENTSORGUNG VON NICHT VERWENDETEN ARZNEIMITTELN ODER VON ABFALLMATERIALIEN, SOFERN ERFORDERLICH:**

Abfallmaterialien sind entsprechend den nationalen Vorschriften zu entsorgen.

## **13. VERMERK „FÜR TIERE“ SOWIE BEDINGUNGEN ODER BESCHRÄNKUNGEN FÜR EINE SICHERE UND WIRKSAME ANWENDUNG DES TIERARZNEIMITTELS, SOFERN ZUTREFFEND:**

Für Tiere.

DE: Verschreibungspflichtig

AT: Rezept- und apothekenpflichtig

## **14. KINDERWARNHINWEIS „ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN“:**

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

**15. NAME UND ANSCHRIFT DES ZULASSUNGSINHABERS:**

VIRBAC  
1<sup>ère</sup> avenue 2065 m L.I.D.  
06516 Carros  
Frankreich

**16. ZULASSUNGSNUMMER(N):**

Für Deutschland:  
Zul.-Nr.: PEI.V.01708.01.1

Für Österreich:  
Z.Nr.: 8-20276

**17. CHARGENBEZEICHNUNG DES HERSTELLERS:**

Ch.-B.

## MINDESTANGABEN AUF KLEINEN BEHÄLTNISSEN

### 1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Virbagen Puppy 2b, Injektionssuspension für Hunde

### 2. WIRKSTOFF(E) NACH MENGE

Canines Parvovirus 2b:  $10^{5,6}$  bis  $10^{7,5}$  GKID<sub>50</sub>

### 3. INHALT NACH GEWICHT, VOLUMEN ODER STÜCKZAHL

1 ml

### 4. ART(EN) DER ANWENDUNG

s.c.

### 5. WARTEZEIT(EN)

Nicht zutreffend

### 6. CHARGENBEZEICHNUNG

Ch.-B.:

### 7. VERFALLDATUM

Verwend. bis:

### 8. VERMERK „FÜR TIERE“

Für Tiere