

ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG

Karton für 1x100 ml, 10x100ml und 1x 50 ml und 10x 50ml und 1x 250ml

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Excenel Flow 50 mg/ml Injektionssuspension für Schweine und Rinder

2. WIRKSTOFF(E)

1 ml enthält: Ceftiofur (als Hydrochlorid) 50,0 mg

3. DARREICHUNGSFORM

Injektionssuspension

4. PACKUNGSGRÖSSE(N)

1 x 100 ml

10 x 100 ml

1 x 50 ml

10 x 50 ml

1 x 250 ml

5. ZIELTIERARTEN

Schwein und Rind

6. ANWENDUNGSGEBIETE

Schwein:

Zur Therapie von bakteriellen Atemwegserkrankungen.

Rind:

Zur Therapie von bakteriellen Atemwegserkrankungen, zur Therapie der akuten interdigitalen Nekrobazillose (Panaritium) und zur Therapie der bakteriellen Komponente der akuten post-partalen (puerperalen) Metritis innerhalb von 10 Tagen nach dem Abkalben.

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

7. ART DER ANWENDUNG

Die Flasche vor der Anwendung kräftig schütteln, um eine gute Durchmischung der Suspension zu erreichen.

Schwein:

Zur intramuskulären Injektion.

3,0 mg Ceftiofur/kg Körpergewicht/Tag, entsprechend 1 ml/16 kg KGW/Tag an 3 aufeinander folgenden Tagen.

Rind:

Zur subkutanen Injektion.

1,0 mg Ceftiofur/kg Körpergewicht/Tag, entsprechend 1 ml/50 kg KGW/Tag an 3 bis 5 aufeinander folgenden Tagen bei respiratorischen Erkrankungen, an 3 Tagen bei akuter interdigitaler Nekrobazillose und an 5 aufeinander folgenden Tagen bei akuter post-partaler Metritis.

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

8. WARTEZEITEN**Schwein:**

Essbare Gewebe: 2 Tage

Rind:

Essbare Gewebe: 6 Tage

Milch: 0 Stunden

9. BESONDERE WARNHINWEISE, SOWEIT ERFORDERLICH

Nicht zur intravenösen Verabreichung.

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

10. VERFALLDATUM

Verwendbar bis:

Nach erstmaligem Anbrechen/Öffnen innerhalb von 28 Tagen aufbrauchen.

11. BESONDERE LAGERUNGSBEDINGUNGEN

Nicht über 25 °C lagern.

12. BESONDERE VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DIE ENTSORGUNG VON NICHT VERWENDETEN ARZNEIMITTELN ODER VON ABFALLMATERIALIEN, SOFERN ERFORDERLICH

Nicht verwendete Tierarzneimittel oder davon stammende Abfallmaterialien sind entsprechend den nationalen Vorschriften zu entsorgen.

13. VERMERK "FÜR TIERE" SOWIE BEDINGUNGEN ODER BESCHRÄNKUNGEN FÜR EINE SICHERE UND WIRKSAME ANWENDUNG DES TIERARZNEIMITTELS, SOFERN ZUTREFFEND

Für Tiere.

Rezept- und apothekenpflichtig.

14. KINDERWARNHINWEIS "ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN"

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

15. NAME UND ANSCHRIFT DES ZULASSUNGSINHABERS
--

Zoetis Österreich GmbH,
Floridsdorfer Hauptstraße 1,
A- 1210 Wien

16. ZULASSUNGSNUMMER(N)

Z.Nr.: 8-00321

17. CHARGENBEZEICHNUNG DES HERSTELLERS

Ch.-B.:

ANGABEN AUF KLEINEN BEHÄLTNISSEN

Etikett für 1x 100 ml und 1x 50 ml und 1x 250 ml

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Excenel Flow 50 mg/ml Injektionssuspension für Schweine und Rinder

2. WIRKSTOFF(E) NACHG MENGE

1 ml enthält: Ceftiofur (als Hydrochlorid) 50,0 mg

3. INHALT NACH GEWICHT, VOLUMEN ODER STÜCKZAHL

50 ml oder 100 ml oder 250 ml

4. ART DER ANWENDUNG

Die Flasche vor der Anwendung kräftig schütteln, um eine gute Durchmischung der Suspension zu erreichen.

Schwein:

Zur intramuskulären Injektion.

3,0 mg Ceftiofur/kg Körpergewicht/Tag, entsprechend 1 ml/16 kg KGW/Tag.

Rind:

Zur subkutanen Injektion.

1,0 mg Ceftiofur/kg Körpergewicht/Tag, entsprechend 1 ml/50 kg KGW/Tag.

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

5. WARTEZEIT

Schwein:

Essbare Gewebe: 2 Tage

Rind:

Essbare Gewebe: 6 Tage

Milch: 0 Stunden

6. CHARGENBEZEICHNUNG

Ch.-B.:

7. VERFALLDATUM

Verwendbar bis:

Nach erstmaligem Anbrechen/Öffnen innerhalb von 28 Tagen aufbrauchen.

8. VERMERK " FÜR TIERE "

Für Tiere.

Rezept- und apothekenpflichtig.

Ch.-B.: