

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

Kartonska škatla

1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Rapidexon 2 mg/ml raztopina za injiciranje
[Piktogram farmacevtske oblike]

2. NAVEDBA UČINKOVIN


Vsak ml vsebuje:
Deksametazon (kot natrijev deksametazonfosfat) 2,0 mg

3. VELIKOST PAKIRANJA

25 ml
50 ml
100 ml

4. CILJNE ŽIVALSKÉ VRSTE

Konji, govedo, prašiči, psi in mačke.



5. INDIKACIJE

6. POTI UPORABE

Konji: Intravenska, intramuskularna, intraartikularna, intra-bursalna ali lokalna uporaba.
Govedo, prašiči, psi in mačke: Intramuskularna uporaba.

7. KARENCA

Karenca:

Govedo Meso in organi: 8 dni

Mleko: 72 ur

Prašiči Meso in organi: 2 dni

Konji Meso in organi: 8 dni

Ni dovoljena uporaba pri konjih, katerih mleko je namenjeno prehrani ljudi.

8. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

Exp. {mm/llll}

Rok uporabnosti po prvem odpiranju stične ovojnine: 28 dni.

Načeto zdravilo uporabite do ...

9. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Ne shranjujte pri temperaturi nad 25 °C. Ne zamrzujte.

Vialo shranjujte v zunanji ovojnini.

10. BESEDILO "PRED UPORABO PREBERITE NAVODILO ZA UPORABO"

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

11. BESEDILO "SAMO ZA ŽIVALI"

Samo za živali.

12. BESEDILO "ZDRAVILO SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM"

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom.

13. IME IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET

[Logotip imetnika dovoljenja za promet]

14. ŠTEVILKA DOVOLJENJA ZA PROMET

MR/V/0291/001

15. ŠTEVILKA SERIJE

Lot {številka}

PODATKI NA STIČNI OZ. PRIMARNI OVOJNINI

100 ml viala

1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI


Rapidexon 2 mg/ml raztopina za injiciranje
[Piktogram farmacevtske oblike]

2. NAVEDBA UČINKOVIN

Vsak ml vsebuje:
Deksametazon (kot natrijev deksametazonfosfat) 2,0 mg

3. CILJNE ŽIVALSKÉ VRSTE

Konji, govedo, prašiči, psi in mačke.



4. POTI UPORABE

Konji: Intravenska, intramuskularna, intraartikularna, intra-bursalna ali lokalna uporaba.
Govedo, prašiči, psi in mačke: Intramuskularna uporaba.

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

5. KARENCA

Karenca:

Govedo Meso in organi: 8 dni

Mleko: 72 ur

Prašiči Meso in organi: 2 dni

Konji Meso in organi: 8 dni

Ni dovoljena uporaba pri konjih, katerih mleko je namenjeno prehrani ljudi.

6. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

Exp. {mm/llll}

Rok uporabnosti po prvem odpiranju stične ovojnine: 28 dni.

Načeto zdravilo uporabite do ...

7. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE
--

Ne shranjujte pri temperaturi nad 25 °C. Ne zamrzujte.
Vialo shranjujte v zunanji ovojnini.

8. IME IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET

[Logotip imetnika dovoljenja za promet]

9. ŠTEVILKA SERIJE


Lot {številka}

**PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA MANJŠIH STIČNIH
OVOJNINAH**

25 / 50 ml viala

1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Rapidexon



2. KOLIČINA UČINKOVIN

Deksametazon (kot natrijev deksametazonfosfat) 2,0 mg/ml

3. ŠTEVILKA SERIJE

Lot {številka}

4. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

Exp {mm/llll}

Rok uporabnosti po prvem odpiranju stične ovojnine: 28 dni.

Načeto zdravilo uporabite do ...

[Logotip družbe]