Etikettering FR-versie BAYTRIL 100 MG/ML

ÉTIQUETAGE

MENTIONS DEVANT FIGURER SUR L'EMBALLAGE EXTÉRIEUR

Boite en carton

1. DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE

Baytril 100 mg/ml solution pour administration dans l'eau de boisson pour poulet, dinde et lapin Enrofloxacine

2. LISTE DE LA (DES) SUBSTANCE(S) ACTIVE(S)

1 ml contient:

Substance active:

Enrofloxacine 100 mg

3. FORME PHARMACEUTIQUE

Solution pour administration dans l'eau de boisson.

Solution claire jaunâtre.

4. TAILLE DE L'EMBALLAGE

100 ml

500 ml

1000 ml

5. ESPÈCES CIBLES

Poulet, dinde et lapin.

6. INDICATION(S)

Lire la notice avant utilisation.

7. MODE ET VOIE(S) D'ADMINISTRATION

Dans l'eau de boisson. Lire la notice avant utilisation.

8. TEMPS D'ATTENTE

Poulets: viande et abats : 7 jours. Dindes : viande et abats : 13 jours. Lapins : viande et abats : 3 jours. Ne pas utiliser chez les oiseaux producteurs d'œufs destinés à la consommation humaine.

Ne pas utiliser au cours des 2 semaines précédant le début de la période de ponte.

9. MISE(S) EN GARDE ÉVENTUELLE(S)

Précautions d'emploi pour l'utilisateur :

Les personnes présentant une hypersensibilité connue aux (fluoro)quinolones doivent éviter tout contact avec ce produit.

Eviter le contact avec la peau et les yeux.

En cas de contact avec les yeux ou la peau, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau.

Se laver les mains et la peau exposée après utilisation.

Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.

Lire la notice avant utilisation.

10. DATE DE PÉREMPTION

 $EXP: \{MM/AAAA\}$

Après le premier prélèvement, utiliser dans les 12 semaines.

Eliminer tout produit non utilisé.

L'eau médicamenteuse doit être préparée quotidiennement. L'eau médicamenteuse restant après 24 heures doit être jetée.

La date de premier prélèvement doit être inscrite sur l'étiquette.

11. CONDITIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION

Pas de précautions particulières de conservation.

12. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES POUR L'ÉLIMINATION DES MÉDICAMENTS VÉTÉRINAIRES NON UTILISÉS OU DES DÉCHETS DÉRIVÉS DE CES MÉDICAMENTS, LE CAS ÉCHÉANT

Tous médicaments vétérinaires non utilisés ou déchets dérivés de ces médicaments doivent être éliminés conformément aux exigences locales.

13. LA MENTION «À USAGE VÉTÉRINAIRE» ET CONDITIONS OU RESTRICTIONS DE DÉLIVRANCE ET D'UTILISATION, LE CAS ECHEANT

À usage vétérinaire

A ne délivrer que sur ordonnance vétérinaire.

14. LA MENTION « TENIR HORS DE LA VUE ET DE LA PORTÉE DES ENFANTS»

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

15. NOM ET ADRESSE DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ

Etikettering FR-versie BAYTRIL 100 MG/ML

Elanco Animal Health GmbH Alfred-Nobel-Str. 50 40789 Monheim Allemagne

16. NUMÉRO(S) D'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ

BE-V140314

17. NUMÉRO DU LOT DE FABRICATION

Lot: {numéro}

MENTIONS DEVANT FIGURER SUR LE CONDITIONNEMENT PRIMAIRE

Etiquette

1. DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE

Baytril 100 mg/ml solution pour administration dans l'eau de boisson pour poulet, dinde et lapin Enrofloxacine

2. LISTE DE LA (DES) SUBSTANCE(S) ACTIVE(S)

1 ml de Baytril 100 mg/ml solution pour administration dans l'eau de boisson pour poulet, dinde et lapin contient :

Substance active:

Enrofloxacine 100 mg;

3. FORME PHARMACEUTIQUE

Solution pour administration dans l'eau de boisson. Solution claire jaunâtre.

4. TAILLE DE L'EMBALLAGE

100 ml 500 ml 1000 ml

5. ESPÈCES CIBLES

Poulet, dinde et lapin.

6. INDICATION(S)

Lire la notice avant utilisation.

7. MODE ET VOIE(S) D'ADMINISTRATION

Dans l'eau de boisson. Lire la notice avant utilisation.

8. TEMPS D'ATTENTE

Poulets: viande et abats: 7 jours. Dindes: viande et abats: 13 jours. Lapins: viande et abats: 3 jours. Ne pas utiliser chez les oiseaux pondeurs d'œufs destinés à la consommation humaine.

Ne pas utiliser au cours des 2 semaines précédant le début de la période de ponte.

9. MISE(S) EN GARDE ÉVENTUELLE(S)

Précautions d'emploi pour l'utilisateur :

Les personnes présentant une hypersensibilité connue aux (fluoro)quinolones doivent éviter tout contact avec ce produit.

Eviter le contact avec la peau et les yeux.

En cas de contact avec les yeux ou la peau, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau.

Se laver les mains et la peau exposée après utilisation.

Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.

Lire la notice avant utilisation.

10. DATE DE PÉREMPTION

EXP: {MM/AAAA}

Après le premier prélèvement, utiliser dans les 12 semaines.

Eliminer tout produit non utilisé.

L'eau médicamenteuse doit être préparée quotidiennement. L'eau médicamenteuse restant après 24 heures doit être jetée.

La date de premier prélèvement doit être inscrite sur l'étiquette.

11. CONDITIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION

Pas de précautions particulières de conservation.

12. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES POUR L'ÉLIMINATION DES MÉDICAMENTS VÉTÉRINAIRES NON UTILISÉS OU DES DÉCHETS DÉRIVÉS DE CES MÉDICAMENTS, LE CAS ÉCHÉANT

Tous médicaments vétérinaires non utilisés ou déchets dérivés de ces médicaments doivent être éliminés conformément aux exigences locales.

13. LA MENTION «À USAGE VÉTÉRINAIRE» ET CONDITIONS OU RESTRICTIONS DE DÉLIVRANCE ET D'UTILISATION, LE CAS ECHEANT

À usage vétérinaire

A ne délivrer que sur ordonnance vétérinaire.

14. LA MENTION « TENIR HORS DE LA VUE ET DE LA PORTÉE ET DES ENFANTS»

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

15. NOM ET ADRESSE DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ

Etikettering FR-versie BAYTRIL 100 MG/ML

Elanco Animal Health GmbH Alfred-Nobel-Str. 50 40789 MonheimAllemagne

16. NUMÉRO(S) D'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ

BE-V140314

17. NUMÉRO DU LOT DE FABRICATION

Lot: {numéro}