

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ DEN YTTRE FÖRPACKNINGEN**KARTONG****1. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMIDLETS NAMN**

Scalibor vet. 0,76 g, medicinskt halsband för hund

2. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

Deltametrin 0,76 g

3. FÖRPACKNINGSTORLEK

Ett halsband till små och medelstora hundar med halsomfång mindre än 43 cm.

4. DJURSLAG

Hund

5. INDIKATIONER

Förebyggande mot fästingangrepp (*Ixodes ricinus*, *Rhipicephalus sanguineus*) under en tid av fem till sex månader.

Förebyggande mot blodsugning från fjärilmyggor (*Phlebotomus perniciosus*) under en tid av fem till sex månader.

Förebyggande mot blodsugning från vuxna myggor (*Culex pipiens pipiens*) under en tid av sex månader.

6. ADMINISTRERINGSVÄGAR

För användning på huden.

7. KARENSTIDER**8. UTGÅNGSDATUM**

Exp. {mm/åååå}

9. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvara halsbandet i den förseglade innerpåsen i ytterkartongen.

Förvaras vid högst 25 °C.

10. TEXTEN "LÄS BIPACKSEDELN FÖRE ANVÄNDNING"

Läs bipacksedeln före användning.

11. TEXTEN "FÖR DJUR"

För djur.

12. TEXTEN "FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN"

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

13. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Intervet International B.V.

14. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

MTnr 18105

15. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot {nummer}

16. SÄRSKILD(A) VARNING(AR), OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

Använd inte till valpar yngre än sju veckor.

Använd inte till hundar med hudskador.

Använd inte till hundar med överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något av hjälpämnena.

Använd inte till katter.

Använd inte tillsammans med andra ektoparasitocida medel innehållande organofosfater.

I sällsynta fall kan fästingar förekomma på en hund som bär halsbandet. Överföring av infektionssjukdom via fästingar eller fjärilmyggor kan under ogynnsamma omständigheter därför inte helt uteslutas.

Om hudskador uppkommer ska halsbandet tas av tills dess att symtomen försvunnit.

Påverkan av schamponering på effektens varaktighet har inte undersökts.

Eftersom halsbandet utövar sin fulla effekt efter en vecka, bör halsbandet sättas på en vecka innan hunden förväntas bli exponerat för angrepp.

Tvätta händerna med tvål och kallt vatten efter tillpassning av halsbandet.

Personer med känd överkänslighet mot trifenylfosfat bör undvika kontakt med läkemedlet och det behandlade djuret. Rådgör med sjukvården vid överkänslighetsreaktioner.

Läkemedlet innehåller deltametrin som kan orsaka övergående stickningar, klåda och fläckig rodnad på exponerad hud.

Tillåt inte barn, särskilt barn yngre än 2 år, att hantera halsbandet, leka med det eller stoppa det i sin mun.

Se till att små barn inte tillåts ha långvarig, intensiv kontakt, t.ex. sova, med en hund som bär halsbandet.

Även om normal kontakt med vatten inte minskar effekten hos halsbandet bör halsbandet alltid tas av innan hunden ska simma eller bada, eftersom den aktiva substansen är skadlig för fisk och vattenlevande organismer. Hunden ska avhållas från bad under de första fem dagarna efter halsbandets applicering.

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ SMÅ INRE LÄKEMEDELSFÖRPACKNINGAR
INNERPÅSE

1. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

Scalibor vet.



2. KVANTITATIVA UPPGIFTER OM DE AKTIVA SUBSTANSERNA

0,76 g

3. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot {nummer}

4. UTGÅNGSDATUM

Exp. {mm/åååå}

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ DEN YTTRE FÖRPACKNINGEN**KARTONG****1. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDELTS NAMN**

Scalibor vet. 1 g, medicinskt halsband för hund

2. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

Deltametrin 1,0 g

3. FÖRPACKNINGSTORLEK

Ett halsband till stora hundar med halsomfång överstigande 43 cm men mindre än 60 cm.

4. DJURSLAG

Hund

5. INDIKATIONER

Förebyggande mot fästingangrepp (*Ixodes ricinus*, *Rhipicephalus sanguineus*) under en tid av fem till sex månader.

Förebyggande mot blodsugning från fjärilmyggor (*Phlebotomus perniciosus*) under en tid av fem till sex månader.

Förebyggande mot blodsugning från vuxna myggor (*Culex pipiens pipiens*) under en tid av sex månader.

6. ADMINISTRERINGSVÄGAR

För användning på huden.

7. KARENSTIDER**8. UTGÅNGSDATUM**

Exp. {mm/åååå}

9. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvara halsbandet i den förseglade innerpåsen i yterkartongen.

Förvaras vid högst 25 °C.

10. TEXTEN "LÄS BIPACKSEDELN FÖRE ANVÄNDNING"

Läs bipacksedeln före användning.

11. TEXTEN "FÖR DJUR"

För djur.

12. TEXTEN "FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN"

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

13. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Intervet International B.V.

14. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

MTnr 18106

15. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot {nummer}

16. SÄRSKILD(A) VARNING(AR), OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

Använd inte till valpar yngre än sju veckor.

Använd inte till hundar med hudskador.

Använd inte till hundar med överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något av hjälpämnen.

Använd inte till katter.

Använd inte tillsammans med andra ektoparasitocida medel innehållande organofosfater.

I sällsynta fall kan fästingar förekomma på en hund som bär halsbandet. Överföring av infektionssjukdom via fästingar eller fjärilmyggor kan under ogynnsamma omständigheter därför inte helt uteslutas.

Om hudskador uppkommer ska halsbandet tas av tills dess att symtomen försvunnit.

Påverkan av schamponering på effektens varaktighet har inte undersökts.

Eftersom halsbandet utövar sin fulla effekt efter en vecka, bör halsbandet sättas på en vecka innan hunden förväntas bli exponerat för angrepp.

Tvätta händerna med tvål och kallt vatten efter tillpassning av halsbandet.

Personer som är överkänsliga mot något innehållsämne i halsbandet ska undvika kontakt med läkemedlet och det behandlade djuret. Rådgör med sjukvården vid överkänslighetsreaktioner.

Tillåt inte barn, särskilt barn yngre än 2 år, att hantera halsbandet, leka med det eller stoppa det i sin mun.

Läkemedlet innehåller deltametrin som kan orsaka övergående stickningar, klåda och fläckig rodnad på exponerad hud.

Se till att små barn inte tillåts ha långvarig, intensiv kontakt, t.ex. sova, med en hund som bär halsbandet.

Även om normal kontakt med vatten inte minskar effekten hos halsbandet bör halsbandet alltid tas av innan hunden ska simma eller bada, eftersom den aktiva substansen är skadlig för fisk och vattenlevande organismer. Hunden ska avhållas från bad under de första fem dagarna efter halsbandets applicering.

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ SMÅ INRE LÄKEMEDELSFÖRPACKNINGAR
INNERPÅSE

1. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

Scalibor vet.



2. KVANTITATIVA UPPGIFTER OM DE AKTIVA SUBSTANSERNA

1,0 g

3. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot {nummer}

4. UTGÅNGSDATUM

Exp. {mm/åååå}