

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

Škatla

1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

ORBENIN DC 500 mg intramamarna suspenzija za krave v presušitvi

2. NAVEDBA ZDRAVILNE(IH) UČINKOVIN(E) IN DRUGIH SNOVI

1 injektor vsebuje:

Zdravilna učinkovina: 500 mg kloksacilina.

Pomožne snovi: stearinska kislina, aluminijev stearat, parafin, tekoči

3. FARMACEVTSKA OBLIKA

Intramamarna suspenzija

4. VELIKOST PAKIRANJA

Škatla s 24 intramamarnimi injektorji

Škatla s 50 intramamarnimi injektorji

Škatla s 120 intramamarnimi injektorji

Škatla s 300 intramamarnimi injektorji

Škatla s 350 intramamarnimi injektorji

5. CILJNE ŽIVALSKÉ VRSTE

Krave

6. INDIKACIJA(E)

7. NAČIN IN POT(I) UPORABE

Intramamarno

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

8. KARENCA

Karenca:

Mleko: 4 dni po telitvi.

Če se krava predčasno oteli ali povrže, oziroma če ji zdravilo damo v obdobju, krajšem od 28 dni do datuma telitve, je mleko primerno za prehrano 28. dan plus 96 ur po vnosu zdravila.

Meso: 0 dni

9. POSEBNO(A) OPOZORILO(A), ČE JE/SO POTREBNO(A)

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

10. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP {mesec/leto}:

11. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Shranjujte pri temperaturi do 25 °C.

12. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEPORABLJENEGA ZDRAVILA ALI ODPADNIH SNOVI, ČE OBSTAJAJO

Odstranjevanje: preberite navodilo za uporabo.

13. BESEDILO “SAMO ZA ŽIVALI” IN POGOJI ALI OMEJITVE GLEDE OSKRBE IN UPORABE, če je navedba smiselna

Samo za živali. Rp-Vet.

14. BESEDILO “ZDRAVILO SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM ”

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom.

15. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Zoetis Belgium SA,
Rue Laid Burniat 1,
1348 Louvain-la-Neuve,
Belgija

16. ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJ(A) ZA PROMET

NP/V/0244/001

17. IZDELOVALČEVA ŠTEVILKA SERIJE

Serijska:

PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA MANJŠIH STIČNIH OVOJNINAH

Injektor

1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

ORBENIN DC 500 mg intramamarna suspenzija za krave v presušitvi

2. KOLIČINA ZDRAVILNE(IH) UČINKOVIN(E)

Kloksacilin 500 mg

3. VSEBINA, IZRAŽENA Z MASO, PROSTORNINO ALI ŠTEVILOM ODMERKOV

3g

4. POT(I) UPORABE ZDRAVILA

i/mam

5. KARENCA

Karenca:

Mleko: Preberite navodilo za uporabo.

Meso: 0 dni

6. ŠTEVILKA SERIJE

Serija:

7. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP {mesec/leto}:

8. BESEDILO "SAMO ZA ŽIVALI"

Samo za živali.