

ETIKETTERING**GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD****KARTONNEN DOOS****1. NAAM VAN HET DIERGENEESMIDDEL**

Fordexin 2 mg/ml oplossing voor injectie

2. GEHALTE AAN WERKZAME BESTANDELEN

1 ml bevat:

Werkzame bestanddelen:

Dexamethason	2,0 mg
(als dexamethason natriumfosfaat)	

3. VERPAKKINGSGROOTTE

20 ml, 6 x 20 ml, 12 x 20 ml

50 ml, 6 x 50 ml, 12 x 50 ml

100 ml, 6 x 100 ml, 12 x 100 ml

4. DOELDIERSOORTEN

Paarden, runderen, geiten, varkens, honden, katten

5. INDICATIES**6. TOEDIENINGSWEGEN**

Paarden:	i.v., i.m., intra-articulair en peri-articulair gebruik
Runderen, geiten en varkens:	i.v., i.m.
Honden en katten:	i.v., i.m., s.c.

7. WACHTTIJDEN

Wachttijden:

Vlees en slachtafval:

Runderen, geiten: 8 dagen.

Varkens: 2 dagen na de intramusculaire toediening.
6 dagen na de intraveneuze toediening.

Paarden: 8 dagen.

Melk:

Runderen, geiten: 72 uur.

Paarden: Niet goedgekeurd voor gebruik bij paarden die melk voor humane consumptie produceren.

8. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

Exp. {mm/jjjj}

Na aanbreken gebruiken binnen 28 dagen.

9. BIJZONDERE BEWAARVOORSCHRIFTEN

Bewaar de injectieflacon in de buitenverpakking ter bescherming tegen licht.

10. VERMELDING “LEES VÓÓR GEBRUIK DE BIJSLUITER”

Lees vóór gebruik de bijsluiters.

11. VERMELDING “UITSLUITEND VOOR DIERGENEESKUNDIG GEBRUIK”

Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik.

12. VERMELDING “BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN BEWAREN”

Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.

13. NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Industrial Veterinaria, S.A.

(De naam van de vergunninghouder kan worden vervangen door een logo).

14. NUMMERS VAN DE VERGUNNINGEN VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

BE-V540026

15. PARTIJNUMMER

Lot {nummer}

GEGEVENS DIE OP DE PRIMAIRE VERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD
ETIKET, 100 ML**1. NAAM VAN HET DIERGENEESMIDDEL**

Fordexin 2 mg/ml oplossing voor injectie

2. GEHALTE AAN WERKZAME BESTANDDELEN

1 ml bevat:

Werkzame bestanddelen:

Dexamethason	2,0 mg
(als dexamethason natriumfosfaat)	

3. DOELDIERSOORTEN

Paarden, runderen, geiten, varkens, honden, katten

4. TOEDIENINGSWEGEN

Paarden:	i.v., i.m., intra-articulair en peri-articulair gebruik
Runderen, geiten en varkens:	i.v., i.m.
Honden en katten:	i.v., i.m., s.c.

Lees vóór gebruik de bijsluiter.

5. WACHTTIJDEN

Wachttijden:

Vlees en slachtafval:

Runderen, geiten:	8 dagen.
Varkens:	2 dagen na de intramusculaire toediening. 6 dagen na de intraveneuze toediening.
Paarden:	8 dagen.

Melk:

Runderen, geiten:	72 uur.
Paarden:	Niet goedgekeurd voor gebruik bij paarden die melk voor humane consumptie produceren.

6. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

Exp. {mm/jjjj}

Na aanbreken gebruiken binnen 28 dagen.
Na openen gebruiken voor.....

7. BIJZONDERE BEWAARVOORSCHRIFTEN

Bewaar de injectieflacon in de buitenverpakking ter bescherming tegen licht.

**8. NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL
BRENGEN**

Industrial Veterinaria, S.A.

(De naam van de vergunninghouder kan worden vervangen door een logo).

9. PARTIJNUMMER

Lot {nummer}

**MINIMALE GEGEVENS DIE OP KLEINE PRIMAIRE VERPAKKINGSEENHEDEN
MOETEN WORDEN VERMELD****ETIKET, 20 ML, 50 ML****1. NAAM VAN HET DIERGENEESMIDDEL**

Fordexin

**2. KWANTITATIEVE GEGEVENS OVER DE WERKZAME BESTANDELEN****Werkzame bestanddelen:**

Dexamethason

2,0 mg/ml

3. PARTIJNUMMER

Lot {nummer}

4. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

Exp. {mm/jjjj}

Na aanbreken gebruiken binnen 28 dagen.