

**ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG**

Faltschachtel (50 ml / 100 ml / 250 ml / 500 ml)

**1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Macrosyn 100 mg/ml Injektionslösung

**2. WIRKSTOFF(E)**

Tulathromycin 100 mg/ml

**3. PACKUNGSGRÖSSE(N)**

50 ml  
100 ml  
250 ml  
500 ml

**4. ZIELTIERART(EN)**

Rinder, Schweine und Schafe

**5. ANWENDUNGSGEBIETE****6. ARTEN DER ANWENDUNG**

Rinder: subkutane Anwendung.  
Schweine und Schafe: intramuskuläre Anwendung.

**7. WARTEZEITEN**

Wartezeit:  
Essbare Gewebe:  
Rinder: 22 Tage  
Schweine: 13 Tage  
Schafe: 16 Tage

Nicht bei Tieren anwenden, deren Milch für den menschlichen Verzehr vorgesehen ist.  
Bei trächtigen Tieren, deren Milch für den menschlichen Verzehr vorgesehen ist, nicht innerhalb von 2 Monaten vor dem voraussichtlichen Geburtstermin anwenden.

**8. VERFALLDATUM**

Exp.  
Nach erstmaligem Öffnen innerhalb von 28 Tagen verbrauchen.

**9. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE****10. VERMERK „LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG DIE PACKUNGSBEILAGE.“**

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

**11. VERMERK „NUR ZUR BEHANDLUNG VON TIEREN“**

Nur zur Behandlung von Tieren.

**12. KINDERWARNHINWEIS „ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN“**

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

**13. NAME DES ZULASSUNGSINHABERS**

Bimeda Animal Health Limited

**14. ZULASSUNGSNUMMERN**

Z.Nr.: 840341

**15. CHARGENBEZEICHNUNG**

Lot

**ANGABEN AUF DEM BEHÄLTNIS****Durchstechflasche (100 ml / 250 ml / 500 ml)****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Macrosyn 100 mg/ml Injektionslösung

**2. WIRKSTOFF(E)**

Tulathromycin 100 mg/ml

**3. ZIELTIERARTEN**

Rinder, Schweine und Schafe

**4. ARTEN DER ANWENDUNG**

Rinder: subkutane Anwendung.

Schweine und Schafe: intramuskuläre Anwendung.

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

**5. WARTEZEITEN**

Wartezeit:

Essbare Gewebe:

Rinder: 22 Tage

Schweine: 13 Tage

Schafe: 16 Tage

Nicht bei Tieren anwenden, deren Milch für den menschlichen Verzehr vorgesehen ist.

Bei trächtigen Tieren, deren Milch für den menschlichen Verzehr vorgesehen ist, nicht innerhalb von 2 Monaten vor dem voraussichtlichen Geburtstermin anwenden.

**6. VERFALLDATUM**

Exp.

Nach erstmaligem Öffnen innerhalb von 28 Tagen verbrauchen.

Nach erstmaligem Öffnen verwendbar bis: / /

**7. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE****8. NAME DES ZULASSUNGSINHABERS**

Bimeda Animal Health Limited

**9. CHARGENBEZEICHNUNG**

Lot

**MINDESTANGABEN AUF KLEINEN BEHÄLTNISSEN**

**Durchstechflasche (50 ml)**

**1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Macrosyn 100 mg/ml Injektionslösung für Rinder, Schweine und Schafe

**2. MENGENANGABEN ZU DEN WIRKSTOFFEN**

Tulathromycin 100 mg/ml

**3. CHARGENBEZEICHNUNG**

Lot

**4. VERFALLDATUM**

Exp.

Nach erstmaligem Öffnen verwendbar bis: \_\_/\_\_/\_\_