

BIJSLUITER

1. Naam van het diergeneesmiddel

CATMINTH, pasta voor oraal gebruik bij katten

2. Samenstelling

Pyranteli embonas 115,3 mg (= pyrantelium 40 mg) - Natr. alginas - Sorbitol. 70 % non cristallisabile - Silica colloidalis anhydrica - Methyl. parahydroxybenzoas - Propyl. parahydroxybenzoas - Aqua purificata ad 1 g.

3. Doeldiersoort(en)

Katten.

4. Indicaties voor gebruik

Het diergeneesmiddel is bedoeld voor de behandeling van gastro-intestinale verminoses bij katten veroorzaakt door de volgende nematoden:

Toxocara spp.

- *Toxocara cati*

Toxascaris spp.

- *Toxascaris leonina*

Ancylostoma spp.

- *Ancylostoma tubaeforme*
- *Uncinaria stenocephala*

5. Contra-indicaties

Geen.

6. Speciale waarschuwingen

Speciale waarschuwingen:

Geen.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor veilig gebruik bij de doeldiersoort(en):

Zoals bij alle anthelmintica kunnen er resistente stammen ontstaan bij de doelparasieten.

Speciale voorzorgsmaatregelen te nemen door de persoon die het diergeneesmiddel aan de dieren toedient:

Er moeten geen bijzondere veiligheidsmaatregelen genomen worden door de persoon die het diergeneesmiddel toedient.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor de bescherming van het milieu:

Niet van toepassing

Dracht en lactatie:

Het diergeneesmiddel mag in alle veiligheid toegediend worden aan drachtige of zogende kattinnen.

Interactie met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie:

Omdat pyrantel hetzelfde werkingsmechanisme heeft als levamisol, mogen deze stoffen niet gelijktijdig gebruikt worden. Er kan zich ook een interactie voordoen met de organofosfaten en de carbamaten die een gerelateerd werkingsmechanisme hebben. Pyrantel mag niet gebruikt worden met piperazine omdat de werkingsmechanismen van de twee stoffen tegengesteld is.

Overdosering:

Het diergeneesmiddel heeft een groot veiligheidsmarge. Een overdosering zal dus met geen enkel secundair effect gepaard gaan, noch bij jonge katjes, noch bij volwassen katten.

In geval van overdosering kunnen tekenen van de cholinergische werking van pyrantel vastgesteld worden.

Belangrijke onverenigbaarheden:

Geen bekend.

7. Bijwerkingen

Geen.

Het melden van bijwerkingen is belangrijk. Op deze manier kan de veiligheid van een diergeneesmiddel voortdurend worden bewaakt. Indien u bijwerkingen vaststelt, zelfs wanneer die niet in deze bijsluiter worden vermeld, of u vermoedt dat het geneesmiddel niet heeft gewerkt, neem dan in eerste instantie contact op met uw dierenarts. U kunt bijwerkingen ook melden aan de houder van de vergunning voor het in de handel brengen of de lokale vertegenwoordiger van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen met behulp van de contactgegevens aan het einde van deze bijsluiter of via uw nationale meldsysteem.

8. Dosering voor elke diersoort, toedieningswijzen en toedieningswegen

De posologie bedraagt 20 mg pyrantelbasis per kg levend gewicht (zijnde 0,25 g pasta per halve kg gewicht).

Dosering

Jonge katjes. eerste behandeling op de leeftijd van 2-3 weken, vervolgens met intervallen van 2 weken tot 2 weken na het spenen, en vervolgens iedere maand tot de leeftijd van 6 maanden.

Volwassen katten: 4 keer per jaar

Zogende katten: tegelijk met de eerste behandeling van de jonge katjes

Toedieningswijze en toedieningsweg

Het diergeneesmiddel wordt toegediend door eenmalige inname langs orale weg.

Het diergeneesmiddel wordt aangeboden in de vorm van een spuit (die 2 g of 3 g pasta bevat) gegradeerd in 0,25 g. Het pastavolume tussen 2 gradaties is geschikt voor de behandeling van 0,5 kg lichaamsgewicht van het dier. De totale inhoud van de spuit is geschikt voor de behandeling van een kat van 4 kg, resp. 6 kg.

Om de juiste dosering te verzekeren, moet de zuiger voor toediening op nul worden ingesteld. Vóór de toediening, verwijder de dop, druk de zuiger voorzichtig tot de rubberen afdichting het nulmerk bereikt en verwijder eventuele pasta die wordt verdreven.

9. Aanwijzingen voor een juiste toediening

De nodige hoeveelheid pasta voor de behandeling kan toegediend worden:

- door de spuit die het product bevat rechtstreeks in de bek van het dier te spuiten,
- of door de pasta te mengen met een deel van de dagelijkse portie eten.

Het is niet nodig om bijzondere diëtistische voorzorgen te nemen voor of na de behandeling.

10. Wachtijd(en)

Niet van toepassing.

11. Bijzondere bewaarvoorschriften

Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.

De spuit buiten invloed van licht bewaren.

Houdbaarheid van het diergeneesmiddel in de verkoopverpakking: 3 jaar.

12. Speciale voorzorgsmaatregelen voor het verwijderen

Geneesmiddelen mogen niet verwijderd worden via afvalwater of huishoudelijk afval.

Maak gebruik van terugnameregelingen voor de verwijdering van ongebruikte diergeneesmiddelen of uit het gebruik van dergelijke middelen voortvloeiend afvalmateriaal in overeenstemming met de lokale voorschriften en nationale inzamelingssystemen die van toepassing zijn. Deze maatregelen dragen bij aan de bescherming van het milieu.

Vraag aan uw dierenarts of apotheker wat u met overtollige diergeneesmiddelen dient te doen.

13. Indeling van het diergeneesmiddel

Diergeneesmiddel vrij van voorschrift.

14. Nummers van de vergunningen voor het in de handel brengen en verpakkingsgrootten

BE-V115053

Het diergeneesmiddel wordt aangeboden in de vorm van een spuit die 2 g of 3 g pasta bevat en gegradeerd is in 0,25 g. De spuiten zijn individueel verpakt.

Het kan voorkomen dat niet alle verpakkingsgrootten in de handel worden gebracht.

15. Datum waarop de bijsluiter voor het laatst is herzien

Februari 2023

Gedetailleerde informatie over dit diergeneesmiddel is beschikbaar in de diergeneesmiddelendatabank van de Unie (<https://medicines.health.europa.eu/veterinary>).

16. Contactgegevens

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:
Zoetis Belgium

Rue Laid Burniat, 1
B-1348 Louvain-La-Neuve

Lokale vertegenwoordigers en contactgegevens voor het melden van vermoedelijke bijwerkingen:

Zoetis Belgium SA
Mercuriusstraat 20
1930 Zaventem
België
Tel: +32 (0) 800 99 189