

VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS

1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Pestigon 50 mg, užlašinamasis tirpalas katėms

2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS

Vienoje 0,5 ml pipetėje yra:

veikliosios (-ių) medžiagos (-ų):

fipronilo 50 mg;

pagalbinės (-ių) medžiagos (-ų):

butilhidroksianizolo (E 320) 0,1 mg,

butilhidroksitolueno (E 321) 0,05 mg.

Išsamų pagalbinių medžiagų sąrašą žr. 6.1 p.

3. VAISTO FORMA

Užlašinamasis tirpalas.

Skaidrus bespalvis arba gelsvas tirpalas.

4. KLINIKINIAI DUOMENYS

4.1. Paskirties gyvūnų rūšis (-ys)

Katės.

4.2. Naudojimo indikacijos, nurodant paskirties gyvūnų rūšis

Blusomis (*Ctenocephalides felis*) užsikrėtusioms katėms gydyti. Vaistas greitai veikia insekticidiškai ir apsaugo nuo pakartotinio užsikrėtimo suaugusiomis blusomis iki 5 savaičių.

Vaistas veikia akaricidiškai ir kraujasiurbės erkės (*Ixodes ricinus*) žūva per 48 val.

4.3. Kontraindikacijos

Nesant duomenų, vaisto negalima naudoti jaunesniems nei 8 sav. amžiaus ir (arba) sveriantiems mažiau kaip 1 kg kačiukams.

Negalima naudoti sergantiems (sisteminėmis ligomis, karščiuojantiems ir t.t.) ar sveikstantiems gyvūnams.

Negalima naudoti triušiams, nes gali pasireikšti nepalankios reakcijos ar netgi mirtis.

Negalima naudoti, – esant padidėjusiam jautrumui veikliajai (-iosioms) medžiagai (-oms) ar bet kuriai iš pagalbinių medžiagų.

4.4. Specialieji įspėjimai, naudojant atskirų rūšių paskirties gyvūnams

Vaistas neapsaugo gyvūno nuo erkių įsisiurbimo. Dauguma erkių žūva per 24–48 val., jei gyvūnas prieš tai buvo gydytas nuo erkių. Tai dažniausiai įvyksta joms nespėjus iki galo įsisiurbti, todėl yra mažesnė tikimybė susirgti erkių platinamomis ligomis. Negyvos erkės paprastai atsikabina nuo gyvūno ir iškrinta. Jei vis dėlto dalis erkių lieka, jas galima pašalinti švelniai ištraukiant.

Siekiant optimaliai kontroliuoti blusas namuose, kuriuose laikomi keli gyvūnai, registruotas insekticidines priemones reikia naudoti visiems šunims ir katėms.

Reikia vengti kates dažnai maudyti ar prausti šampūnu, nes šio veterinarinio vaisto veiksmingumas dažnai maudomoms katėms tirtas nebuvo.

Blusos dažnai veisiasi gyvūnų krepšiuose, guoliuose bei įprastose poilsio vietose, pvz., kilimuose ar minkštuose balduose, todėl gausaus užsikrėtimo atveju ir prieš imantis kontrolės priemonių šias vietas reikia apdoroti tinkamu insekticidiniu preparatu ir reguliariai siurbti.

4.5. Specialiosios naudojimo atsargumo priemonės

Specialiosios atsargumo priemonės, naudojant vaistą gyvūnams

Vengti vaisto patekimo į gyvūno akis. Veterinariniam vaistui patekus į akį, reikia nedelsiant kruopščiai praplauti vandeniu.

Svarbu veterinarinį vaistą užlašinti tokioje vietoje, kur gyvūnas negalėtų jo nulaižyti ir negalima leisti gydomiems gyvūnams laižyti vieniems kitus.

Vaistas neapsaugo gyvūnų nuo erkių įsisiurbimo. Dėl to negalima visiškai atmesti infekcinių ligų perdavimo tikimybės (jei sąlygos yra tam nepalankios).

Veterinarinio vaisto negalima lašinti ant žaizdų ar pažeistos odos.

Specialiosios atsargumo priemonės asmenims, naudojantiems vaistą gyvūnams

Vaistas gali dirginti gleivines ir akis, todėl būtina stengtis, kad jo nepatektų į burną ar akis.

Atsitiktinai patekus į akį, reikia tuoj pat kruopščiai plauti vandeniu. Akių sudirgimui išliekant, nedelsiant reikia kreiptis į gydytoją ir parodyti šio vaisto informacinį lapelį.

Reikia saugotis, kad vaisto nepatektų ant pirštų odos. Patekus ant odos, reikia plauti vandeniu ir muilu.

Naudojus vaistą, būtina nusiplauti rankas.

Naudojant vaistą, negalima rūkyti, gerti ar valgyti.

Žmonės ir gyvūnai, kuriems nustatytas padidėjęs jautrumas fipronilui arba kuriai nors pagalbinių medžiagų (žr. 6.1 p.), turi vengti sąlyčio su veterinariniu vaistu.

Negalima liesti gydytų gyvūnų ir leisti vaikams su jais žaisti, kol neišdžiūvo vaisto užlašinimo vieta. Todėl rekomenduojama gyvūnus gydyti ne dienos metu, o anksti vakare ir tuoj po gydymo negalima leisti gyvūnams miegoti su šeimininkais, ypač vaikais.

Pipetes laikyti originalioje pakuotėje, o panaudotas pipetes nedelsiant išmesti.

Kitos atsargumo priemonės

Vaisto sudėtyje yra alkoholinio nešiklio, kuris gali pažeisti dažytus, lakuotus ar kitus buitinius paviršius bei baldus.

Vaistas degus. Laikyti toliau nuo viryklės, kibirkščiujančių daiktų, atviros liepsnos ar kitų ugnies šaltinių.

4.6. Nepalankios reakcijos (dažnumas ir sunkumas)

Vaisto palaižęs gyvūnas gali trumpą laiką seilėtis, daugiausiai dėl nešiklio savybių.

Ypač retai užlašinimo vietoje pasireiškia trumpalaikės odos reakcijos (atsiranda pleiskaną, toje vietoje išslenka plaukai, atsiranda niežulys, paraudimas), bendras niežulys ar kailio plikimas.

Išimtiniais atvejais naudojus vaistą pastebėtas padidėjęs seilėtekis, grįžtami neurologiniai reiškiniai (padidėjęs jautrumas, depresija, nerviniai reiškiniai) ar vėmimas.

Nepalankių reakcijų dažnumas nustatytas vadovaujantis tokia konvencija:

- labai dažna (nepalanki (-ios) reakcija (-os) pasireiškė daugiau nei 1 iš 10 gydytų gyvūnų),
- dažna (daugiau nei 1, bet mažiau nei 10 iš 100 gydytų gyvūnų),
- nedažna (daugiau nei 1, bet mažiau nei 10 iš 1 000 gydytų gyvūnų),
- reta (daugiau nei 1, bet mažiau nei 10 iš 10 000 gydytų gyvūnų),
- labai reta (mažiau nei 1 iš 10 000 gydytų gyvūnų, skaičiuojant ir atskirus pranešimus).

4.7. Naudojimas vaikingumo, laktacijos ar kiaušinių dėjimo metu

Laboratorinių tyrimų metu naudojant fipronilą teratogeninis ar embriotoksinis poveikis nebuvo nustatytas. Vaisto tyrimai gyvūnams vaikingumo bei laktacijos metu atlikti nebuvo. Vaistą vaikingumo ar laktacijos metu naudoti galima tik atsakingam veterinarijos gydytojui įvertinus naudos ir rizikos santykį.

4.8. Sąveika su kitais vaistais ir kitos sąveikos formos

Nežinoma.

4.9. Dozės ir naudojimo būdas

Tik išoriniam naudojimui.

Prieš gydymą gyvūnus būtina tiksliai pasverti.

Naudojimo būdas: lašinti ant odos.


Vienos 0,5 ml pipetės pakanka vienai katei gydyti (atitinka 7,5–15 mg fipronilo 1 kg kūno svorio).

Naudojimo nurodymai

Pipetę laikyti vertikaliai. Švelniai pastuksenti, kad visas skystis nutekėtų į plačiąją pipetės dalį. Norint atidaryti pipetę, reikia nulaužti jos galiuką išilgai pažymėtos linijos.

Praskirti kailį tarp menčių, kad matytųsi oda. Priglausti pipetės galą prie odos ir, kelis kartus spustelint, dviejose vietose ant odos išspausti visą pipetės turinį: vieną kartą spustelėti ties kaukolės pagrindu, antrą – 2–3 cm toliau link nugaros.

Norint išimti pipetę iš paketėlio, jį reikia prakirpti žirkklėmis arba



1. Sulenkti ties įstriža linija, kad pasimatytų įraiža.
2. Nuplėšti ties įraiža.
3. Norint atidaryti, pasukti viršūnėlę.
4. Praskleisti plaukus ir užlašinti ant odos.

Vaistą patartina lašinti ten, kur gyvūnas negali pasiekti jį nulaužyti. Svarbu užtikrinti, kad gyvūnai nelaižytų vaisto vieni nuo kitų.

Stengtis per daug nesuslapinti kailio vaistu, nes gydymo vietoje gali sulipti plaukai. Taip nutikus, sulipimas išnyksta per 24 val.

Siekiant optimaliai kontroliuoti blusas ir kraujasiurbes erkes, gydymo schemą reikia parinkti pagal vietos epidemiologinę situaciją.

Mažiausias intervalas tarp dviejų gydymų turi būti ne trumpesnis nei 4 savaitės.

4.10. Perdozavimas (simptomai, pirmosios pagalbos priemonės, priešnuodžiai), jei būtina

Ant odos naudojamo veterinarinio vaisto toksiškumas yra labai mažas. Tačiau perdozavus gali didėti nepalankių reakcijų pasireiškimo rizika (žr. 4.6 p.), dėl to gyvūną visada reikia gydyti tinkamo dydžio pipete, parenkant ją pagal kūno svorį.

4.11. Išlauka

Netaikytina.

5. FARMAKOLOGINĖS SAVYBĖS

Farmakoterapinė grupė: ektoparaziticidinės medžiagos išoriniam naudojimui.

ATCvet kodas: QP53AX15.

5.1. Farmakodinaminės savybės

Fipronilas yra insekticidinė (akaricidinė) medžiaga, priklausanti fenilpirazolų grupei. Jis veikia parazitų ląstelių chloridų kanalėlius, susijusius su gama-amino sviesto rūgštimi (GASR). Blokuodamas jos išsiskyrimą, vaistas sutrikdo chloridų jonų perdavimą per priešsinapsines ir posinapsines membranas, sukelia nekontroliuojamą centrinės nervų sistemos aktyvumą ir vabzdžių bei voragyvių žūtį.

Fipronilas insekticidiškai veikia kačių blusas (*Ctenocephalides felis*) ir akaricidiškai – kraujasiurbes erkes (*Ixodes ricinus*). Naujai į kailį patenkančios blusos žūva per 24 val.

Veterinarinis vaistas efektyviai veikia blusas iki 5 sav. ir per 48 val. žudančiai paveikia kraujasiurbes erkes (*Ixodes ricinus*), priklausomai nuo užsikrėtimo laipsnio.

5.2. Farmakokinetinės savybės

Pagrindinis fipronilo skilimo produktas yra sulfono darinys (RM1602), kuris taip pat veikia insekticidiškai ir akaricidiškai.

Naudoto ant odos fipronilo absorbcija kačių organizme yra nežymi.

Fipronilo koncentracija kailyje laikui bėgant mažėja.

6. FARMACINIAI DUOMENYS

6.1. Pagalbinių medžiagų sąrašas

Butilhidroksianizolas (E320),
butilhidroksitoluenas (E321),
povidonas K12,
polisorbatas 80,
butilo alkoholis,
dietileno glikolio monoetilo eteris.

6.2. Pagrindiniai nesuderinamumai

Nežinoma.

6.3. Tinkamumo laikas

Veterinarinio vaisto tinkamumo laikas, nepažeidus originalios pakuotės, – 3 metai.

6.4. Specialieji laikymo nurodymai

Šiam veterinariniam vaistui specialių laikymo temperatūros sąlygų nereikia.
Laikyti originalioje pakuotėje, kad vaistas būtų apsaugotas nuo šviesos ir drėgmės.

6.5. Pirminės pakuotės pobūdis ir sudedamosios dalys

Pipetės po 0,5 ml, pagamintos iš trisluoksnės plėvelės: polipropileno/COC/polipropileno, lako laminato be tirpiklio ir polietileno/EVOH/polietileno kopolimero. Pipetės supakuotos į vaikams neatplėšiamus 4 sluoksnių folijos paketėlius iš MTPE, nailono, aliuminio folijos ir poliesterio plėvelės ir sudėtos į kartoninę dėžutę.

Dėžutės po 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24, 30, 60, 90, 120 arba 150 pipetčių.

Gali būti tiekiamos ne visų dydžių pakuotės.

6.6. Specialiosios nesunaudoto veterinarinio vaisto ar su jo naudojimu susijusių atliekų naikinimo nuostatos

Nesunaudotas veterinarinis vaistas ar su juo susijusios atliekos turi būti sunaikintos pagal šalies reikalavimus.

Fipronilas gali būti kenksmingas vandens organizmams, todėl vaistas ar jo pakuotės negali patekti į tvenkinius, vandens telkinius ir griovius.

7. REGISTRUOTOJAS

Norbrook Laboratories (Ireland) Limited
Rossmore Industrial Estate
Monaghan
Airija

8. REGISTRACIJOS NUMERIS (-IAI)

LT/2/12/2127/001-013

9. REGISTRAVIMO / PERREGISTRAVIMO DATA

Registravimo data 2012-04-27
Perregistravimo data 2017-06-24

10. TEKSTO PERŽIŪROS DATA

2021-09-13

DRAUDIMAS PREKIAUTI, TIEKTI IR (ARBA) NAUDOTI

Nėra.

ŽENKLINIMAS

DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT ANTRINĖS PAKUOTĖS

Kartoninė dėžutė su 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24, 30, 60, 90, 120 ar 150 pipėčių po 0,5 ml

1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Pestigon 50 mg, užlašinamasis tirpalas katėms
Fipronilas

2. VEIKLIOJI (-IOSIOS) MEDŽIAGA (-OS)

Vienoje 0,5 ml pipetėje yra:
50 mg fipronilo,
0,1 mg butilhidroksianizolo (E 320),
0,05 mg butilhidroksitolueno (E 321).

3. VAISTO FORMA

Užlašinamasis tirpalas.

4. PAKUOTĖS DYDIS

1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24, 30, 60, 90, 120 ar 150 pipėčių po 0,5 ml.

5. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠIS (-YS)

Katėms.

6. INDIKACIJA (-OS)

Erkės ir blusos.

Blusomis (*Ctenocephalides felis*) užsikrėtusioms katėms gydyti. Vaistas greitai veikia insekticidiškai ir apsaugo nuo pakartotinio užsikrėtimo suaugusiomis blusomis iki 5 savaičių.

Vaistas veikia akaricidiškai ir kraujasiurbės erkės (*Ixodes ricinus*) žūva per 48 val.

7. NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS

Katėms sveriančioms daugiau nei 1 kg.
Pipetę iš paketėlio išimti galima tik prieš pat naudojimą.
Tik išoriniam naudojimui.
Prieš naudojant būtina perskaityti informacinį lapelį.

8. IŠLAUKA

Netaikytina.

9. SPECIALIEJI ĮSPĖJIMAI, JEI REIKIA

Prieš naudojant būtina perskaityti informacinį lapelį.

10. TINKAMUMO DATA

Tinka iki {mėnuo/metai}

11. SPECIALIOSIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Šiam veterinariniam vaistui specialių laikymo temperatūros sąlygų nereikia.

Laikyti originalioje pakuotėje, kad vaistas būtų apsaugotas nuo šviesos ir drėgmės.

**12. SPECIALIOSIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ
NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA**

Naikinimas: skaityti informacinį lapelį.

**13. NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“ IR TIEKIMO BEI NAUDOJIMO
SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI, JEI TAIKYTINA**

Tik veterinariniam naudojimui.

14. NUORODA „SAUGOTI NUO VAIKŲ“

Saugoti nuo vaikų.

15. REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Norbrook Laboratories (Ireland) Limited
Rossmore Industrial Estate
Monaghan
Airija

16. REGISTRACIJOS NUMERIS (-IAI)

LT/2/12/2127/001

LT/2/12/2127/002

LT/2/12/2127/003

LT/2/12/2127/004

LT/2/12/2127/005

LT/2/12/2127/006

LT/2/12/2127/007

LT/2/12/2127/008

LT/2/12/2127/009
LT/2/12/2127/010
LT/2/12/2127/011
LT/2/12/2127/012
LT/2/12/2127/013

17. GAMINTOJO SERIJOS NUMERIS

Serijs

MINIMALŪS DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT MAŽŲ PIRMINIŲ PAKUOČIŲ**Paketėlis 0,5 ml pipetei/ lizdinei plokštei****1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS**

Pestigon 50 mg, užlašinamasis tirpalas katėms

2. VEIKLIOSIOS (-IŲJŲ) MEDŽIAGOS (-Ų) KIEKIS

Vienoje 0,5 ml pipetėje yra 50 mg fipronilo.

3. KIEKIS (SVORIS, TŪRIS AR DOZIŲ SKAIČIUS)

0,5 ml

4. NAUDOJIMO BŪDAS (-AI)

Užlašinti ant odos.

5. IŠLAUKA

Netaikytina.

6. SERIJOS NUMERIS

Lot {numeris}

7. TINKAMUMO DATA

EXP {mėnuo/metai}

8. NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“

Tik veterinariniam naudojimui.

9. REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS

Norbrook Laboratories (Ireland) Limited

MINIMALŪS DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT LIZDINIŲ PLOKŠTELIŲ AR JUOSTELIŲ

0,5 ml pipetė/ lizdinė plokštelė

1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Pestigon

2. STIPRUMAS

50 mg

3. REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS

Norbrook

4. TINKAMUMO DATA

EXP

5. SERIJOS NUMERIS

Lot

6. NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“

<Katės piktograma>

7. VAISTO FORMA

<Užlašinamojo tirpalo pipetės piktograma>

8. VAISTO KIEKIS

0,5 ml



INFORMACINIS LAPELIS
Pestigon 50 mg, užlašinamasis tirpalas katėms

1. REGISTRUOTOJO IR UŽ VAISTO SERIJOS IŠLEIDIMĄ EEE ŠALYSE ATSAKINGO GAMINTOJO, JEI JIE SKIRTINGI, PAVADINIMAS IR ADRESAS

Registruotojas

Norbrook Laboratories (Ireland) Limited
Rossmore Industrial Estate
Monaghan
Airija

Gamintojas, atsakingas už vaisto serijos išleidimą
(JK)

Norbrook Laboratories Limited
Station Works
Newry
Co. Down
BT35 6JP
Northern Ireland

(ES)

Norbrook Manufacturing Ltd.
Rossmore Industrial Estate
Monaghan
Airija

2. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Pestigon 50 mg, užlašinamasis tirpalas katėms
Fipronilas

3. VEIKLIOJI (-IOSIOS) IR KITOS MEDŽIAGOS

Vienoje 0,5 ml pipetėje yra:
50 mg fipronilo,
0,1 mg butilhidroksianizolo (E 320),
0,05 mg butilhidroksitolueno (E 321).

Skaidrus bespalvis arba gelsvas tirpalas.

4. INDIKACIJA (-OS)

Blusomis (*Ctenocephalides felis*) užsikrėtusioms katėms gydyti. Vaistas greitai veikia insekticidiškai ir apsaugo nuo pakartotinio užsikrėtimo suaugusiomis blusomis iki 5 savaičių.

Vaistas veikia akaricidiškai ir kraujasiurbės erkės (*Ixodes ricinus*) žūva per 48 val.

5. KONTRAINDIKACIJOS

Nesant duomenų, vaisto negalima naudoti jaunesniems nei 8 sav. amžiaus ir (arba) sveriantiems mažiau kaip 1 kg kačiukams.

Negalima naudoti sergantiems (sisteminėmis ligomis, karščiuojantiems ir t.t.) ar sveikstantiems gyvūnams. Negalima naudoti triušiams, nes gali pasireikšti nepalankios reakcijos ar netgi mirtis. Negalima naudoti, – esant padidėjusiam jautrumui veikliajai (-iosioms) medžiagai (-oms) ar bet kuriai iš pagalbinių medžiagų.

6. NEPALANKIOS REAKCIJOS

Nepalankių reakcijų dažnumas nustatytas vadovaujantis tokia konvencija:

- labai dažna (nepalanki (-ios) reakcija (-os) pasireiškė daugiau nei 1 iš 10 gydytų gyvūnų),
- dažna (daugiau nei 1, bet mažiau nei 10 iš 100 gydytų gyvūnų),
- nedažna (daugiau nei 1, bet mažiau nei 10 iš 1 000 gydytų gyvūnų),
- reta (daugiau nei 1, bet mažiau nei 10 iš 10 000 gydytų gyvūnų),
- labai reta (mažiau nei 1 iš 10 000 gydytų gyvūnų, skaičiuojant ir atskirus pranešimus).

Vaisto palaižęs gyvūnas gali trumpą laiką seilėtis, daugiausiai dėl nešiklio savybių.

Ypač retai užlašinimo vietoje pasireiškia trumpalaikės odos reakcijos (atsiranda pleiskanų, toje vietoje išslenka plaukai, atsiranda niežulys, paraudimas), bendras niežulys ar kailio plikimas. Išimtiniais atvejais naudojus vaistą pastebėtas padidėjęs seilėtekis, grįžtami neurologiniai reiškiniai (padidėjęs jautrumas, depresija, nerviniai reiškiniai) ar vėmimas.

Pastebėjus bet kokią šalutinį poveikį, net ir nepaminėtą šiame informaciniame lapelyje, arba manant, kad vaistas neveikė, būtina informuoti veterinarijos gydytoją.

7. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠIS (-YS)

Katės.

8. DOZĖS, NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS KIEKVIENAI RŪŠIAI

Tik išoriniam naudojimui.

Naudojimo būdas: lašinti ant odos.

Pipetę iš maišelio išimti galima tik prieš pat naudojimą.


Vienos 0,5 ml pipetės pakanka vienai katei gydyti (atitinka 7,5–15 mg fipronilo 1 kg kūno svorio).

Naudojimo nurodymai

Pipetę laikyti vertikaliai. Švelniai pastuksenti, kad visas skystis nutekėtų į plačiąją pipetės dalį. Norint atidaryti pipetę, reikia nulaužti jos galiuką išilgai pažymėtos linijos.

Praskirti kailį tarp menčių, kad matytųsi oda. Priglausti pipetės galą prie odos ir, kelis kartus spustelint, dviejose vietose ant odos išspausti visą pipetės turinį: vieną kartą spustelėti ties kaukolės pagrindu, antrą – 2–3 cm toliau link nugaros.

Norint išimti pipetę iš paketėlio, jį reikia prakirpti žirkklėmis arba



1. Sulenkti ties įstrižą liniją, kad pasimatytų įraiža.
2. Nuplėšti ties įraiža.
3. Norint atidaryti, pasukti viršūnėlę.
4. Praskleisti plaukus ir užlašinti ant odos.

9. NUORODOS DĖL TINKAMO NAUDOJIMO

Vaistą patartina lašinti ten, kur gyvūnas negali pasiekti jį nulaižyti. Svarbu užtikrinti, kad gyvūnai nelaižytų vaisto vieni nuo kitų.

Stengtis per daug nesuslapinti kailio vaistu, nes gydymo vietoje gali sulipti plaukai. Taip nutikus, sulipimas išnyksta per 24 val.

Siekiant optimaliai kontroliuoti blusas ir (arba) kraujasiurbes erkes, gydymo schemą reikia parinkti pagal vietos epidemiologinę situaciją.

Mažiausias intervalas tarp dviejų gydymų turi būti ne trumpesnis nei 4 savaitės.

Prieš gydymą gyvūnus būtina tiksliai pasverti.

10. IŠLAUKA

Netaikytina.

11. SPECIALIEJI LAIKYMO NURODYMAI

Saugoti nuo vaikų.

Šiam veterinariniam vaistui specialių laikymo temperatūros sąlygų nereikia.

Laikyti originalioje pakuotėje, kad vaistas būtų apsaugotas nuo šviesos ir drėgmės.

Negalima naudoti pasibaigus tinkamumo laikui, nurodytam ant etiketės.

12. SPECIALIEJI ĮSPĖJIMAI

Vaistas neapsaugo gyvūno nuo erkių įsisiurbimo. Dauguma erkių žūva per 24-48 val., jei gyvūnas prieš tai buvo gydytas nuo erkių. Tai dažniausiai įvyksta joms nespėjus iki galo įsisiurbti, todėl yra mažesnė tikimybė susirgti erkių platinamomis ligomis. Negyvos erkės paprastai atsikabina nuo gyvūno ir iškrinta. Jei vis dėlto dalis erkių lieka, jas galima pašalinti švelniai ištraukiant.

Siekiant optimaliai kontroliuoti blusas namuose, kuriuose laikomi keli gyvūnai, registruotas insekticidines priemones reikia naudoti visiems šunims ir katėms.

Reikia vengti kates dažnai maudyti ar prausti šampūnu, nes šio veterinarinio vaisto veiksmingumas dažnai maudomoms katėms tirtas nebuvo.

Blusos dažnai veisiasi gyvūnų krepšiuose, guoliuose bei įprastose poilsio vietose, pvz., kilimuose ar minkštuose balduose, todėl gausaus užsikrėtimo atveju ir prieš imantis kontrolės priemonių šias vietas reikia apdoroti tinkamu insekticidiniu preparatu ir reguliariai siurbti.

Specialiosios atsargumo priemonės, naudojant vaistą gyvūnams

Vengti vaisto patekimo į gyvūno akis. Veterinariniam vaistui patekus į akį, reikia nedelsiant kruopščiai praplauti vandeniu.

Tik išoriniam naudojimui.

Prieš gydymą gyvūnus būtina tiksliai pasverti.

Vaistas neapsaugo gyvūnų nuo erkių įsisiurbimo. Dėl to negalima visiškai atmesti infekcinių ligų pernešimo tikimybės (jei sąlygos yra tam nepalankios).

Svarbu veterinarinį vaistą užlašinti tokioje vietoje, kur gyvūnas negalėtų jo nulaižyti ir negalima leisti gydomiems gyvūnams laižyti vieniems kitus.

Veterinarinio vaisto negalima lašinti ant žaizdų ar pažeistos odos.

Specialiosios atsargumo priemonės asmenims, naudojantiems vaistą gyvūnams

Vaistas gali dirginti gleivines ir akis, todėl būtina stengtis, kad jo nepatektų į burną ar akis.

Atsitiktinai patekus į akį, reikia tuoj pat kruopščiai plauti vandeniu. Akių sudirgimui išliekant, nedelsiant reikia kreiptis į gydytoją ir parodyti šio vaisto informacinę lapelį.

Reikia saugotis, kad vaisto nepatektų ant pirštų odos. Patekus ant odos, reikia plauti vandeniu ir muilu.

Naudojus vaistą, būtina nusiplauti rankas.

Naudojant vaistą negalima rūkyti, gerti ar valgyti.

Žmonės ir gyvūnai, kuriems nustatytas jautrumas fipronilui arba kuriai nors pagalbinių medžiagų, turi vengti sąlyčio su veterinariniu vaistu.

Negalima liesti gydytų gyvūnų ir leisti vaikams su jais žaisti, kol neišdžiūvo vaisto užlašinimo vieta. Todėl rekomenduojama gyvūnus gydyti ne dienos metu, o anksti vakare ir tuoj po gydymo negalima leisti gyvūnams miegoti su šeimininkais, ypač vaikais.

Pipetes laikyti originalioje pakuotėje, o panaudotas pipetes nedelsiant išmesti.

Naudojimas vaikingumo, laktacijos ar kiaušinių dėjimo metu:

Laboratorinių tyrimų metu naudojant fipronilą teratogeninis ar embriotoksinis poveikis nebuvo nustatytas.

Vaisto tyrimai gyvūnams vaikingumo bei laktacijos metu atlikti nebuvo. Vaistą vaikingumo ar laktacijos metu naudoti galima tik atsakingam veterinarijos gydytojui įvertinus naudos ir rizikos santykį.

Kitos atsargumo priemonės

Vaisto sudėtyje yra alkoholinio nešiklio, kuris gali pažeisti dažytus, lakuotus ar kitus buitinius paviršius bei baldus.

Ant odos naudojamo veterinarinio vaisto toksiškumas yra labai mažas. Tačiau perdozavus gali didėti nepalankių reakcijų pasireiškimo rizika, dėl to gyvūną visada reikia gydyti tinkamo dydžio pipete, parenkant ją pagal kūno svorį.

Vaistas degus. Laikyti toliau nuo viryklės, kibirkščiujančių daiktų, atviros liepsnos ar kitų ugnies šaltinių.

Tik veterinariniam naudojimui.

13. SPECIALIOSIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA

Nesunaudotas veterinarinis vaistas ar su juo susijusios atliekos turi būti sunaikintos pagal šalies reikalavimus.

Fipronilas gali būti kenksmingas vandens organizmams, todėl vaistas ar jo pakuotės negali patekti į tvenkinius, vandens telkinius ir griovius.

14. INFORMACINIO LAPELIO PASKUTINIO PATVIRTINIMO DATA

2021-09-13

15. KITA INFORMACIJA

Parduodama be recepto.

LT/2/12/2127/001-013

Veikimas

Fipronilas yra insekticidinė (akaricidinė) medžiaga, priklausanti fenilpirazolų grupei. Jis veikia parazitų ląstelių chloridų kanalėlius, susijusius su gama-amino sviesto rūgštimi (GASR).

Blokuodamas jos išsiskyrimą, vaistas sutrikdo chloridų jonų perdavimą per priešsinapsines ir posinapsines membranas, sukelia nekontroliuojamą centrinės nervų sistemos aktyvumą ir vabzdžių bei voragyvių žūtį.

Pakuotė

Pipetės po 0,5 ml, pagamintos iš trisluoksnės plėvelės: polipropileno/COC/polipropileno, lako laminato be tirpiklio ir polietileno/EVOH/polietileno kopolimero. Pipetės supakuotos į vaikams neatplėšiamus 4 sluoksnių folijos paketėlius iš MTPE, nailono, aliuminio folijos ir poliesterio plėvelės ir sudėtos į kartoninę dėžutę.

Dėžutės po 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24, 30, 60, 90, 120 arba 150 pipetčių.

Gali būti tiekiamos ne visų dydžių pakuotės.

Norint gauti informacijos apie šį veterinarinį vaistą, reikia susisiekti su registruotojo vietiniu atstovu.

Magnum Veterinarija, UAB
Martinavos g. 8, Martinavos k.,
LT-54463 Kauno r., Lietuva
Tel. +370 688 96944
info@magnumvet.lt