

ЛИСТОВКА :

ORATIL-100, tylosin base activity 100 g, перорален прах за птици и свине

1. ИМЕ И ПОСТОЯНЕН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА ТЪРГОВИЯ И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ

Притежател на разрешението за търговия :

ФАРМА СИС ООД,

гр. Пловдив, ул. „Подофицер Георги Котов“ №1, ет.3 ап.5.

Телефон: 058 604 266

Факс: 058 604 266

E-mail: farmasys@abv.bg

Производител, отговорен за освобождаване на партидата:

S.P. Veterinaria S.A., Ctra. Reus Vinyols Km 4.1. Riudoms 43330, Spain

Cenavisa S.L., Prolongación Camino San Jaime, s/n. Almazora 12250, Spain

2. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ

ORATIL-100

3. СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНАТА СУБСТАНЦИЯ И ЕКСЦИПИЕНТИТЕ

Tylosin base.....100 g

(еквивалентно на 108.18 g tylosin tartrate)

4. ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ

Кокошки: -респираторна микоплазмоза

-аеросакулит.

Пуйки: -инфекциозен синусит.

Свине: -диария, причинена от чувствителни микроорганизми

-илеит, причинен от *Lawsonia intracellularis*.

5. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Няма.

6. НЕБЛАГОПРИЯТНИ РЕАКЦИИ

При някои прасета може да се наблюдава оток на ректалната мукоза и вулвата, ректален пролапс, диария, зачервяване и сърбеж на кожата. В някои случаи могат да се наблюдават петехии на кожата и серозните мембрани, особено при затлъстели животни.

Честотата на неблагоприятните реакции се определя чрез следната класификация:

- много чести (повече от 1 на 10 третирани животни проявяващи неблагоприятни реакции по време на курса на едно лечение)

- чести (повече от 1, но по-малко от 10 третиран животни на 100 животни)
- не чести (повече от 1, но по-малко от 10 третиран животни на 1,000 животни)
- редки (повече от 1, но по-малко от 10 третиран животни на 10,000 животни)
- много редки (по-малко от 1 животно на 10,000 третиран животни, включително изолирани съобщения).

Ако забележите някакви неблагоприятни реакции, включително и такива, които не са описани в тази листовка или мислите, че ветеринарномедицинския продукт не работи, моля да уведомите Вашия ветеринарен лекар.

7. ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП

Кокошки, пуйки и свине.

8. ДОЗИРОВКА ЗА ВСЕКИ ВИД ЖИВОТНО, МЕТОД И НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ

Перорално приложение.

Кокошки и пуйки: 0.5 g/L вода за пиене.

Свине: 0.25 g/L вода за пиене.

9. СЪВЕТ ЗА ПРАВИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ

Да не се прилага едновременно с бактерицидни антибиотици.

10. КАРЕНТЕН СРОК

Кокошки, пуйки и свине

Месо и вътрешни органи: 2 дни.

Не се разрешава употребата при птици, които произвеждат или са предназначени да произвеждат яйца за консумация от хора.

11. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ПРОДУКТА

Да се съхранява далеч от погледа и на недостъпни за деца места.

Да се съхранява при температура под 25 °C.

Да се съхранява в оригиналната опаковка

Срок на годност след първото отваряне на опаковката: 3 месеца.

Срок на годност след разтваряне, съгласно указанията: разтворът трябва да се подменя на 24 часа.

12. СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Специални предпазни мерки при употреба:

Медикаментозната вода трябва да бъде единствения източник на вода.

Винаги водата трябва да бъде прибавяна към праха.

Разтворът трябва да се подменя на 24 часа.

Да не се прилага при здрави животни.

Специални предпазни мерки за животните при употребата на продукта:

Не се разрешава за употреба при птици, които произвеждат или са предназначени да произвеждат яйца за консумация от хора

Специални предпазни мерки за лицата, прилагащи ветеринарномедицинския продукт на животните:

Избягвайте директния контакт с кожата и мукозата. Избягвайте вдишване на продукта.

Бременност и лактация:

Може да се прилага по време на бременност и лактация.

Взаимодействие с други ветеринарномедицински продукти и други форми на взаимодействие:
Да не се прилага едновременно с бактерицидни антибиотици.

Предозиране (симптоми, спешни мерки, антидоти):

Тилозинът притежава широка граница на безопасност при всички животни.

При прасета, определената перорална LD₅₀ е 5 g/kg телесна маса. При младите прасета могат да се наблюдават неблагоприятни реакции, включително шок и смърт.

При плъхове, дози от 100 mg/kg телесна маса, приложени перорално за период от 1 месец не водят до промяна в общото състояние на животните или растежа. Причинява временна диария.

13. СПЕЦИАЛНИ МЕРКИ ЗА УНИЩОЖАВАНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАН ПРОДУКТ ИЛИ ОСТАТЪЦИ ОТ НЕГО, АКО ИМА ТАКИВА

ВМП не трябва да бъдат изхвърляни чрез битови отпадъци или отпадни води.

Попитайте Вашия ветеринарен лекар какво да правите с ненужните ВМП. Тези мерки ще помогнат за опазване на околната среда.

14. ДАТАТА НА ПОСЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ НА ТЕКСТА

01/2025

15. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Не всички размери на опаковката могат да бъдат предлагани на пазара.



Recoverable Signature

X

Д-Р КРАСИМИР ЗЛАТКОВ

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ КВЛП

Signed by: KRASIMIR YANKOV ZLATKOV