

ETIKETERING

<GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD>
<GEGEVENS DIE OP DE PRIMAIRE VERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD>

Flacons bruin glas van 50 en 100 ml.

1. BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL

OXYTOCINE PRODIVET 10 IE/ml, inspuitbare oplossing.

2. GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) EN OVERIGE BESTANDDE(E)L(EN)

Oxytocinum 10.U.I – chlorobutanolum hemihydricum – excip. q.s. ad 1 ml

3. FARMACEUTISCHE VORM

Inspuitbare oplossing

4. VERPAKKINGSGROOTTE

50 en 100 ml

5. DIERSOORT(EN) WAARVOOR HET DIERGENEESMIDDEL BESTEMD IS

Paarden, runderen, varkens, schapen, geiten, honden, katten.

6. INDICATIE(S)

Lees vóór gebruik de bijsluiter.

7. WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

Langzaam IV of IM inspuiten

8. WACHTTIJD

(*Orgaan*) vlees, Melk: 0 dagen.

9. SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

Accidentele injectie is gevaarlijk – Lees vóór gebruik de bijsluiter

Mag niet door zwangere of voedende vrouwen aangewend worden.

10. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP : MM/AAAA.

Na eerste opening binnen 28 dagen te gebruiken en te bewaren onder 25°C.

11. SPECIALE VOORZORGSMATREGELEN BIJ BEWAREN

Koel bewaren tussen 2 – 8 °C

**12. SPECIALE VOORZORGSMATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-
GEBRUIKTE DIERGENEESMIDDELEN OF EVENTUELE RESTANTEN HIERVAN**

Lees vóór gebruik de bijsluiter.

**13. VERMELDING “UITSLUITEND VOOR DIERGENEESKUNDIG GEBRUIK” EN
VOORWAARDEN OF BEPERKINGEN TEN AANZIEN VAN DE LEVERING EN HET
GEBRUIK, indien van toepassing**

Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik

Op diergeneeskundig voorschrift

14. VERMELDING “BUITEN HET BEREIK EN ZICHT VAN KINDEREN BEWAREN”

Buiten het bereik en het zicht van kinderen bewaren.

**15. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE
HANDEL BRENGEN**

PRODIVET pharmaceuticals sa/nv Hagbenden 39c B - 4731 EYNATTEN.

16. NUMMER(S) IN HET COMMUNAUTAIRE GENEESMIDDELENREGISTER

BE-V106881

17. PARTIJNUMMER FABRIKANT

Lot

GEGEVENS DIE TEN MINSTE OP KLEINE VERPAKKINGSEENHEDEN MOETEN WORDEN VERMELD

Flacons bruin glas van 10 en 20 ml

1. BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL

OXYTOCINE PRODIVET 10IE/ml, inspuitbare oplossing.

2. GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) BESTANDDE(E)L(EN)

Oxytocine, 10 IE/ml

3. SAMENSTELLING PER GEWICHT, PER VOLUME OF AANTAL EENHEDEN

10, 20 ml

4. TOEDIENINGSWEG(EN):

IV langzaam of IM

5. WACHTTIJD

(*Orgaan*) vlees, Melk: 0 dagen.

6. PARTIJNUMMER

Lot

7. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP: MM/JJJJ

Na eerste opening binnen 28 dagen te gebruiken en te bewaren onder 25°C.

8. VERMELDING “UITSLUITEND VOOR DIERGENEESKUNDIG GEBRUIK”

Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik

Op diergeneeskundig voorschrift

OXYTOCINE_ETIQ_NL_V1_20121003